

khác

1) Viêm tụy cấp không có triệu chứng nào sau đây:

- a. Khối u sờ thấy ở thượng vị
- b. Bụng chướng
- c. Âm ruột tăng Giảm hoặc mất
- d. Dấu Cullen
- e. Nôn ói

trĩ

2) Khám bằng tay hậu môn trực tràng trong trĩ nhằm:

Khám HMTT thường khó đánh giá Trĩ, chủ yếu dùng để tìm biến chứng như Trĩ tắc mạch, K ống hậu môn trực tràng...

- a) Phân biệt trĩ nội, trĩ ngoại
- b) Sờ xem có bao nhiêu búi trĩ

c) tìm u trực tràng

K dạ dày

3) phương tiện chẩn đoán xâm lấn trong u thư dạ dày: CT Scan Hoặc Siêu âm qua ngă nội soi (EUS)

K gan

4) Phương pháp khám gan đúng:

- a) đứng bên trái bệnh nhân
- b) gan ở dưới cơ hoành nên gan sẽ di động theo nhịp thở bệnh nhân
- c) Bờ trên gan là đường ngang qua 2 núm vú (đường thẳng ngang ngay dưới 2 núm vú mới đúng)
- d) Dấu hiệu bờ sắc, lổn nhổn gập trong xơ gan (K gan)
- e) Rung gan + gập trong ung thư gan (áp xe gan)

đường mật

5) Bệnh nhân điển hình sỏi ống mật chủ cận lâm sàng nào sau đây được sử dụng: chọn câu sai

- a) Amylase máu
- b) Bil, AST, ALT
- c) CT scan
- d) X quang bụng đứng không sửa soạn
- e) CTM, CRP

VT bụng
sốc CT

6) Dấu hiệu Kehr gập trong vỡ lách

7) Dấu hiệu nào cần quan tâm ở BN giảm tưới máu: chọn câu sai

- a) Mạch
- b) Huyết áp
- c) Nước tiểu
- d) Tri giác.

e) Nhịp thở

shock CT
khác

8) BN nào shock mà không giảm thể tích tuần hoàn: Shock do tim.

9) viêm tắc động mạch chi dưới thường do

- a) Bẩm sinh
- b) Dò động tĩnh mạch
- c) Bệnh bueger hoặc xơ vữa
- d) Đái tháo đường

VT bụng

10) vết thương vùng hông lưng thì chẩn đoán bằng: nội soi ổ bụng chẩn đoán chứ?

- a) mở bụng thám sát
- b) siêu âm bụng
- c) ct scan
- d) chọc dò ổ bụng
- e) x quang bụng

chẩn đoán tính chất thẩu bụng:

- **hình ảnh học:** ko có giá trị nhiều
- **thăm sát vết thương:** hữu ích với vết thương thành bụng trước
- **vết thương hông lưng:** nội soi ổ bụng hoặc mở bụng thăm sát

11) CIs nào thường sử dụng để **chẩn đoán xác định có dịch trong ổ bụng:**

- a) **siêu âm bụng**
- b) chọc dò màng bụng
- c) ct scan
- d) xquang bụng

12) **Khám gan đúng:** gan nằm dưới cơ hoành nên **gan sẽ di động theo nhịp thở**

13) **Biến chứng của ERCP:** **Nhiễm trùng đường mật ngược dòng** và **viêm tụy cấp**

14) **Biến chứng của lấy sỏi xuyên gan qua da:** **rò mật** và **chảy máu đường mật**

15) Triệu chứng nào của **sỏi túi mật mức độ trung bình grade II:** **đau hạ sườn phải.**

16) 1 bn mới mổ thoát vị bẹn, 1 tháng nay ăn uống bt, khoảng 1 2 ngày gần đây có khối **ngay chỗ mổ cũ to lên, ấn ko xẹp:** **ngờ nhiều đến thoát vị tái phát.**

17) Case ls của thoát vị bẹn

18) Case ls của tắc ruột do sỏi mật

19) **Ung thư dạ dày xâm lấn vô lớp cơ, phân giai đoạn theo TNM:** **T2**

20) **Ung thư dạ dày cls đánh giá mức độ xâm lấn tốt nhất dựa vào:** **CT Scan.**

21) **Ung thư đại tràng chọn câu sai:** **Polyp > 1cm có nguy cơ ung thư hóa cao. (>2cm mới có nguy cơ ung thư hóa cao)**

22) **Rò hậu môn nguyên nhân không đặc hiệu là:** **trĩ** wtf? nhiễm trùng ống tuyến hm Nguyên nhân không đặc hiệu có: Viêm khe và nhú; hoại tử Fournier

23) **Yếu tố nguy cơ của thoát vị bẹn** chọn câu **sai:** **viêm đại tràng mạn.**

24) **Hẹp môn vị triệu chứng** nào sau đây **không đặc hiệu:** **bụng ậm ạch khó tiêu.**

- a. **Bụng ậm ạch khó tiêu**
- b. Nôn xon giảm đau, nôn thức ăn cũ
- c. Hình ảnh tuyết rơi, song nhu động dạ dày
- d. Dạ dày giãn lớn hình cái chậu
- e. Dấu bouveret.

25) **Tiên lượng ung thư dạ dày** phụ thuộc vào, chọn câu **sai:** **giới**

26) 1 bệnh nhân 55 tuổi khám bt hết, da xanh, nên làm cls nào để tầm soát

- a. **Nội soi** dạ dày

27) **Vi khuẩn kỵ khí gặp trong nhiễm trùng đường mật** là **Bacteroides fragilis** (và **Clostridium**)

28) **Viêm phúc mạc hỏi vị trí đau đầu tiên gợi ý nguyên nhân.**

29) Khi thăm khám, **triệu chứng có giá trị nhất để chẩn đoán liệt ruột** là:

- a. Bụng chướng, gõ vang
- b. Quai ruột nổi
- c. Dầu rắn bò
- d. **Mất nhu động ruột**
- e. Thăm trực tràng thấy bóng trực tràng rỗng

30) **Yếu tố gây K tụy ngoại trừ:** **Nang giả tụy**