


THƯ: GẠCH CHÉO ĐỎ

Uyên: khoanh tròn xanh

ĐỀ THI LÝ THUYẾT Y5 NĂM HỌC 2017 – 2018
THỜI GIAN 40 phút
Mã đề: 001





trước + 2/3 trước thân đốt

ân đốt sống + DC dọc sau)

sau và phức hợp DC sau)

trụ là tổn thương mất vững

Mất vững cơ học

Mất vững TK

hối hợp

là tổn thương cơ bản

nh


ây đeo an toàn)




Based on
radiographic
review of 412
cases

SA 1969)

ong
uối tổn thương
ơ lực chỉ 2/5- 3/5)
(cơ lực chỉ 4/5)





tiềm

▪

Có hút thuốc lá

Loại bỏ tuổi phình hoàn toàn cũng sớm càng tốt

37. Bệnh nhân vào viện tại ban giao thông, thăm khám ghi nhận như sau: hôn mê; đã được đặt nội khí quản; kích thích đau không đủ mức, đáp ứng đau không chính xác ở 1/2 người trái và không đáp ứng ở 1/2 người phải có thành viên trên cơ thể.

- A. 7 điểm
- B. 8 điểm
- ☒ C. 6 điểm
- D. 5 điểm
- E. 9 điểm

Evm max 456

38. Những dấu hiệu nguy cơ thấp của tổn thương trong sọ sau chấn thương sọ não, chọn câu đúng:

- A. Cơ giắt
- B. Nôn ói
- ☒ C. Đau đầu
- D. Lơ mơ
- E. Mắt trợn

39. Tổn thương nguyên phát trong chấn thương sọ não, chọn câu sai:

- ☒ A. Máu tụ ngoài màng cứng
- B. Dập não
- C. Nứt sọ
- D. Tổn thương sợi trục tủy
- E. Dập thân não

40. Những dấu hiệu nguy cơ trung bình của tổn thương trong sọ sau chấn thương sọ não, chọn câu sai:

- A. Đau đầu tăng dần
- ☒ B. Hôn mê
- C. Ói
- D. Có dấu hiệu vỡ sản sọ
- E. Đa chấn thương

Đau đầu tăng dần, ói, sản sọ vỡ, đa cthg

41. Bệnh nhân nữ 45 tuổi được đưa vào bệnh viện sau khi bị té tại nhà. Khám lâm sàng ghi nhận: hôn mê GCS=4 điểm, đã đặt nội khí quản và đang bóp bóng qua nội khí quản, đồng tử hai bên 4 mm, phản xạ ánh sáng (-). Mạch: 60 lần/phút, HA: 140/90 mmHg, sưng nề vùng trán 2 bên. CT sọ não: dập não kèm máu tụ trong não trán hai bên, phù não lan tỏa, xóa các bể dịch não tủy trước cầu não.

Phương pháp điều trị đúng nhất:

- ☒ A. Phẫu thuật cấp cứu mở sọ trán hai bên lấy máu tụ và giải ép
- ☒ B. Điều trị tại khoa hồi sức, cho thở máy, chống phù não, theo dõi tình trạng tri giác, dấu hiệu sinh tồn và dấu thần kinh khu trú
- C. Theo dõi, chụp lại CT-Scanner sau 24 giờ.
- D. Phẫu thuật sau 24 giờ.

42. Những dấu hiệu nguy cơ trung bình của tổn thương trong sọ sau chấn thương sọ não, chọn câu đúng:

- A. Đau đầu
- B. Chóng mặt
- C. Không có triệu chứng
- ☒ D. Cơ giắt
- E. Sưng bầm vùng đầu

E. Hiện nay, tỉ lệ khối u di căn ở não đang gia tăng do các bệnh nhân ung thư có thời gian sống còn lâu hơn

44. Tổn thương nguyên phát trong chấn thương sọ não, chọn câu đúng:

A. Máu tụ trong não

B. Phù não

C. Thiếu máu não

D. Tụt não

☒ E. Nứt sọ

Dập thân não, dập não, nứt sọ, tổn thương sọ trục lan toả

45. Triệu chứng lâm sàng thường gặp của khối u não dưới lâu, chọn câu đúng:

46. Theo thang điểm Glasgow, chấn thương sọ não được xem là trung bình khi số điểm là, chọn câu đúng:

A. 12-14

B. 13-15

☒ C. 9-12

D. 3-8

E. 9-14

Trung bình là 9-12 điểm

47. Tình huống lâm sàng: Bệnh nhân nữ, 60 tuổi, nhập viện vì tai nạn giao thông. Lâm sàng: bệnh nhân tỉnh và tiếp xúc chậm chạp, GCS=14 điểm, sưng to vùng thái dương phải.

Kết quả cận lâm sàng của bệnh nhân này ghi nhận máu tụ dưới màng cứng bán cầu trái bề dày khoảng 6 mm, đường giữa di lệch sang phải 5mm.

Chỉ định điều trị đúng nhất:

☒ A. Phẫu thuật cấp cứu: mở sọ lấy máu tụ dưới màng cứng bán cầu trái.

B. Điều trị tại khoa hồi sức, cho thở máy, chống phù não, theo dõi tri giác và dấu thần kinh khu trú.

☒ C. Nhập viện theo dõi tình trạng tri giác và các dấu hiệu thần kinh khu trú.

D. Phẫu thuật cấp cứu: mở sọ lấy máu tụ ngoài màng cứng bên phải và máu tụ dưới màng cứng bên trái.

E. Phẫu thuật sau 24 giờ.

48. Những dấu hiệu nguy cơ cao của tổn thương trong sọ sau chấn thương sọ não, chọn câu đúng:

A. Co giật

B. Đau đầu tăng dần

C. Chóng mặt

D. Dấu hiệu vỡ sán sọ

☒ E. Dấu thần kinh khu trú

49. Những tiêu chí cho việc theo dõi tại nhà đối với người bệnh sau chấn thương sọ não, chọn câu sai:

A. Chóng mặt

B. GCS 15 điểm

☒ C. Đói

D. Bệnh nhân có khả năng trở lại bệnh viện ngay khi cần thiết

E. CT sọ não bình thường

52. Những tiêu chí cho việc theo dõi tại nhà đối với người bệnh sau chấn thương sọ não, chọn câu đúng:

- A. Sưng bầm da đầu nghiêm trọng
- B. Nói lúc đúng, lúc sai
- ☒ C. Chóng mặt, CT-Scan sọ não bình thường
- D. Bệnh nhân có nhà ở gần bệnh viện
- E. Có tình trạng say rượu

53. Máu tụ ngoài màng cứng cấp tính sau chấn thương, chọn câu sai:

- A. Nằm giữa bản trong xương sọ và màng cứng
- B. Thường do nứt xương sọ
- ☒ C. Nguyên nhân thường do rách động mạch não giữa
- D. Hầu như phải mổ nếu thể tích máu tụ >30 cm³
- E. Rách động mạch màng não giữa thường là nguyên nhân của máu tụ vùng thái dương

54. Những dấu hiệu nguy cơ trung bình của tổn thương trong sọ sau chấn thương sọ não, chọn câu đúng:

- ☒ A. Đau đầu tăng dần
- B. Hôn mê
- C. Liệt nửa người
- D. Chóng mặt
- E. Tri giác giảm dần

55. Những dấu hiệu nguy cơ cao của tổn thương trong sọ sau chấn thương sọ não, chọn câu sai:

- A. Liệt nửa người
- B. Tri giác giảm dần
- ☒ C. Đa chấn thương
- D. Chấn thương sọ xuyên thấu
- E. Dấu thần kinh khu trú

56. Chỉ định chụp CT-Scan sọ não trong CTSN, chọn câu sai:

- A. Bệnh nhân lơ mơ, nói nhảm
- ☒ B. Chảy máu mũi
- C. Co giật
- D. Chảy dịch trong ra mũi
- E. Đau đầu nhiều và liên tục

57. Đau nước. Chọn câu sai:

☒ A. Đau tăng dần, thường không đặc hiệu và khó chẩn đoán

Những dấu hiệu nguy cơ cao của thương tổn trong sọ

- Mức ý thức giảm không rõ do ngộ độc rượu, thuốc phiện, rối loạn chuyển hoá
- Dấu thần kinh khu trú
- Mức độ ý thức giảm dần
- Chấn thương sọ xuyên thấu hoặc lún sọ



Hết

