



SẢN KHOA (OBSTETRICS)

Dashboard ► My courses ► SK ► CHUYÊN ĐỀ 5: QUẢN LÝ CUỘC CHUYỂN DẠ ►
PRETEST chuyên đề 5 quản lý cuộc chuyển dạ

Started on Monday, 23 September 2019, 6:15 PM

State Finished

Completed on Monday, 23 September 2019, 6:26 PM

Time taken 11 mins 8 secs

Grade 20.00 out of 20.00 (100%)

Question 1

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Khám một chuyển dạ ngôi chỏm, dấu hiệu nào xác định ngôi đã bình chỉnh tốt, và sẵn sàng để lọt qua eo trên?

Select one:

- ☒ a. Chỉ sờ thấy thóp sau khi khám âm đạo
- ☐ b. Không thấy dấu hiệu chống xương sọ
- ☐ c. Kiểu thể của ngôi là kiểu thể trước
- ☐ d. Phải thấy đủ cả ba dấu hiệu trên

Question 2

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Khám một chuyển dạ ngôi chỏm, dấu hiệu nào gợi ý ngôi có thể đã gặp khó khăn khi nỗ lực để lọt qua eo trên?

Select one:

- ☐ a. Ngôi trình ở kiểu thể sau
- ☐ b. Ngôi cao, chưa cố định
- ☐ c. Ngôi cúi không tốt
- ☒ d. Lọt bất đối xứng hoặc hiện tượng uốn khuôn

Question 3

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Khám một chuyển dạ ngôi chỏm, vì sao việc đầu thai bị uốn khuôn, chồng xương lại dễ dẫn đến xác định sai độ lọt?

Select one: **xác định độ lọt bằng khám âm đạo**

- ☒ a. Vì khoảng cách từ điểm thấp nhất của ngôi đến ụ đỉnh bị dài ra
- ☐ b. Vì khoảng cách từ điểm thấp nhất của ngôi đến ụ chằm bị dài ra
- ☐ c. Vì khoảng cách từ điểm thấp nhất của ngôi đến ụ đỉnh bị ngắn lại
- ☐ d. Vì khoảng cách từ điểm thấp nhất của ngôi đến ụ chằm bị ngắn lại

Question 4

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Đánh giá một chuyển dạ ngôi chỏm, dữ kiện nào cho phép xác định sự tương thích giữa khung chậu và ngôi thai?

Select one:

- ☐ a. Kiểu thể của ngôi là các kiểu thể trước
- ☐ b. Phù hợp về số đo giữa khung chậu và thai
- ☒ c. Tiến trình xuống của ngôi diễn ra đều đặn
- ☐ d. Sản đồ nằm ở bên trái của đường báo động

Question 5

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Trong cuộc sanh ngôi chỏm, khi nào thì tổng lượng giác của hai góc [xoay trong + xoay ngoài thì 1st] là 0° ?

Select one:

- ☐ a. Chỉ xảy ra khi ngôi lọt ở các kiểu thể chằm trước, số kiểu chằm vệt
- ☐ b. Chỉ xảy ra khi ngôi lọt ở các kiểu thể chằm sau, số kiểu chằm cùng
- ☒ c. Trong mọi trường hợp, tổng lượng giác của hai góc này luôn bằng 0° **sau khi ngôi thai ra ngoài sẽ xoay lại về vị trí trước khi xoay trong**
- ☐ d. Trong mọi trường hợp, tổng lượng giác của hai góc này luôn khác 0°

Question 6

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Trong cuộc sanh ngôi chỏm, nếu ngôi lọt ở kiểu thể chéo, thì trị tuyệt đối của góc xoay ngoài thì 2nd là bao nhiêu?

Select one:

- ☐ a. Kết quả tùy kiểu thể sau hoàn tất xoay ngoài thì 1st
- ☒ b. Trị tuyệt đối của góc xoay ngoài thì 2nd luôn là 45° ?
- ☐ c. Trị tuyệt đối của góc xoay ngoài thì 2nd luôn là 90°
- ☐ d. Trị tuyệt đối của góc xoay ngoài thì 2nd luôn là 135°

Question 7

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Trong các dấu hiệu sau, dấu hiệu nào gợi ý mạnh nhất một chuyển dạ đang bị tắc nghẽn?

Select one:

- ☒ a. Ngôi không lọt hay lọt không đối xứng hay không xuống
- ☐ b. Đường biểu diễn mở cổ tử cung đã chạm đường hành động
- ☐ c. Cơ co tử cung tăng về tần số, cường độ và trương lực căn bản
- ☐ d. Có bất thường kích thước khung chậu trên lâm sàng hay quang kích

Question 8

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Trong cuộc sanh ngôi chỏm, khi nào đầu sẽ ở kiểu thể ngang sau khi đã hoàn tất xoay ngoài thì 2nd?

Select one:

- ☐ a. Ngôi lọt ở kiểu thể trước
- ☐ b. Ngôi lọt ở kiểu thể sau
- ☐ c. Ngôi lọt ở kiểu thể ngang
- ☒ d. Trong mọi trường hợp

Question 9

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Trong chuyển dạ, khi nào cần thực hiện phá ối?

Select one:

- ☒ a. Khi lợi ích của nó là vượt trội so với nguy cơ mà nó có thể gây ra
- ☐ b. Khi đường biểu diễn mở cổ tử cung ở bên phải đường báo động
- ☐ c. Khi muốn rút ngắn thời gian của giai đoạn xóa mở cổ tử cung
- ☐ d. Khi dự định sẽ dùng oxytocin ngoại sinh để thúc đẩy chuyển dạ

Question 10

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Nguyên nhân của tình trạng tachysystole (cơn co cường tính) là gì?

Select one:

- ☐ a. Rối loạn nút dẫn nhịp cơ co
- ☐ b. Hệ quả của các oxytocic ngoại lai
- ☐ c. Chuyển dạ tắc nghẽn và vượt trở ngại
- ☒ d. Cả ba yếu tố trên đều có thể là nguyên nhân

Question 11

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Gây tê ngoài màng cứng giảm đau sản khoa có thể ảnh hưởng bất lợi lên chuyển dạ ra sao?

Select one:

- ☐ a. Giai đoạn sổ nhau bị kéo dài đi kèm bong nhau không hoàn toàn
- ☒ b. Giai đoạn sổ thai bị kéo dài với ngôi bị ngưng xoay bất thường
- ☐ c. Thời kỳ hoạt động của giai đoạn xóa mở cổ tử cung bị kéo dài
- ☐ d. Thời kỳ tiềm thời của giai đoạn xóa mở cổ tử cung bị kéo dài

Question 12

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Sản đồ vừa chạm và cắt đường hành động, nhưng cổ tử cung chưa mở trọn, thái độ nào là phù hợp nhất?

Select one:

- ☐ a. Nhận định rằng chuyển dạ đang kéo dài
- ☐ b. Nhận định rằng đang có bất xứng đầu chậu
- ☐ c. Nhận định rằng đang có hội chứng vượt trở ngại
- ☒ d. Đi tìm nguyên nhân làm chuyển dạ tiến triển chậm

Question 13

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Cầm máu trong băng huyết sau sanh, khi nào thì “đặt bóng chèn” có ưu thế vượt trội so với thuốc gò tử cung?

Select one:

- ☐ a. Chảy máu do bất thường của các con đường đông cầm máu
- ☐ b. Băng huyết sau sanh đa thai, thai to, chuyển dạ dài
- ☒ c. Chảy máu từ diện nhau bám ở đoạn dưới tử cung
- ☐ d. Chảy máu từ diện nhau bám ở thân-đáy tử cung

Question 14

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Chuyển dạ giai đoạn I, nếu bắt đầu truyền trở lại oxytocin sau một khoảng phải tạm ngưng, cần lưu ý gì?

Select one:

- ☒ a. Bắt đầu lại với tốc độ truyền chậm nhất mà bạn có thể thực hiện được
- ☐ b. Bắt đầu lại với tốc độ truyền nhanh hơn tốc độ trước khi tạm ngưng
- ☐ c. Bắt đầu lại với tốc độ truyền chậm hơn tốc độ trước khi tạm ngưng
- ☐ d. Bắt đầu lại với tốc độ truyền bằng với tốc độ trước khi tạm ngưng

Question 15

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Trong quá trình chuyển đổi từ tuần hoàn bào thai sang tuần hoàn sơ sinh, hiện tượng nào xảy ra trước tiên?

Select one:

- ☐ a. Máu từ tĩnh mạch phổi đổ về tâm nhĩ trái
- ☐ b. Hiện tượng đóng shunt phải-trái qua lỗ Botal
- ☒ c. Kích hoạt trung tâm hô hấp tại hành não của thai
- ☐ d. Hiện tượng đóng shunt phải-trái qua ống động mạch

Question 16

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Hãy xác định mục đích của việc thực hiện thông khí áp lực dương trong hồi sức sơ sinh ngạt?

Select one:

- ☒ a. Thiết lập tiểu tuần hoàn chức năng
- ☐ b. Phát khởi cử động hô hấp ở sơ sinh
- ☐ c. Đảm bảo bão hòa oxygen máu thai
- ☐ d. Làm giảm sức căng bề mặt phế nang

Question 17

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Trong các hành động sau, hành động nào gây nguy hiểm cho một sơ sinh đang bị ngạt?

Select one:

- ☐ a. Kích thích trẻ thở bằng cách xoa cồn lên lưng bé
- ☐ b. Dùng NaHCO_3 trước khi đạt mục tiêu hô hấp tuần hoàn
- ☐ c. Thông khí áp lực dương bằng bóng không có van điều áp
- ☒ d. Cả ba động thái trên đều nguy hiểm cho sơ sinh đang ngạt

Question 18

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Thông khí áp lực dương được hiểu một cách chính xác ra sao?

Select one:

- ☐ a. Dùng hỗn hợp khí có thành phần oxygen lớn hơn thành phần oxygen trong khí trời
- ☒ b. Thể hiện thao tác tạo ra một áp suất khí thẳng được sức căng bề mặt của phế nang
- ☐ c. Qua nội khí quản, loại bỏ khoảng chết ở hầu họng, trực tiếp đưa khí vào đường thở
- ☐ d. Cả ba cùng là các thành tố bắt buộc của định nghĩa thao tác thông khí áp lực dương

Question 19

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Nếu được thực hiện đúng kĩ thuật, đủ điều kiện và đúng chỉ định thì bệnh suất và tử suất sơ sinh sẽ cao nhất trong trường hợp nào?

Select one:

- ☐ a. Sanh giác hút
- ☐ b. Sanh forceps
- ☐ c. Sanh mổ
- ☒ d. Như nhau

Question 20

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Ngay sau sinh buộc phải hút qua đèn nội khí quản cho bé càng sớm càng tốt trong trường hợp nào sau đây?

Select one:

- ☐ a. Thường qui, nếu trẻ sơ sinh không khóc ngay
- ☒ b. Cho trẻ không khoẻ với nước ối có phân su
- ☐ c. Trước thực hiện thông khí áp lực dương
- ☐ d. Cho trẻ có Apgar 1 phút xấu, từ 0 đến 4

