

CHẨN THƯƠNG CHỈNH HÌNH (ORTHOPEDICS)

Dashboard ► My courses ► CTCH ► LÝ THUYẾT ► Pretest 3: Rối loạn liền xương

Started on Wednesday, 23 October 2019, 6:00 PM

State Finished

Completed on Wednesday, 23 October 2019, 6:04 PM

Time taken 4 mins 29 secs

Grade 10.00 out of 10.00 (**100**%)

Question 1

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Bệnh nhân nam 30 tuổi bị gãy hở nát nhiều mảnh ở 1/3 giữa hai xương cẳng chân đã được phẫu thuật cắt lọc, xếp lại đầy đủ các mảnh xương và đặt cố định ngoài 6 tháng. Hiện tại các vết thương lành nhưng xương chưa lành và được chẩn đoán là không liền xương. Hướng điều trị tiếp theo nào là phù hợp nhất với trường hợp này?

- a. Tháo khung cố định ngoài chuyển sang bó bột
- b. Mổ kết hợp xương kèm theo là ghép xương
- c. Mổ kết hợp xương không kèm theo ghép xương
- d. Tiếp tục giữ khung cố định ngoài

Question 2

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Bệnh nhân nam 30 tuổi bị gãy hở nát nhiều mảnh ở 1/3 giữa hai xương cẳng chân đã được phẫu thuật cắt lọc, xếp lại đầy đủ các mảnh xương và đặt cố định ngoài 6 tháng. Hiện tại các vết thương lành nhưng xương chưa lành và được chẩn đoán là không liền xương. Thể không liền xương nào là phù hợp nhất với trường hợp này?

Select one:

- a. Không liền xương thể phì đại
- b. Không liền xương thể mất xương
- c. Không liền xương thể vô mạch
- d. Khớp giả

Question 3

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Năm 2006, trong nghiên cứu 57 trường hợp không liền xương của thân xương cánh tay đến phẫu thuật tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh, số bệnh nhân đã có mổ kết hợp xương cánh tay chiếm bao nhiêu?

Select one:

- a. Không đáng kể
- b. Khoảng 50%
- c. Gần 70%
- d. Khoảng 1/3

Question 4

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Khớp giả là một dạng của tình trạng không liền xương, đặc điểm nào sau đây chỉ thấy ở khớp giả mà không có ở các loại không liền xương khác?

- a. Có cử động bất thường không kèm đau tại ổ gãy
- b. Có cử động bất thường và có hoạt dịch tại ổ gãy
- o. Không thấy rõ cử động bất thường vì hay ở gần khớp
- d. Không thấy rõ cử động bất thường và không đau tại ổ gãy

Question **5**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Đặc điểm nào sau đây phù hợp với không liền xương ở hành xương?

Select one:

- a. Dễ dàng tìm thấy cử động bất thường để xác định không liền xương
- b. Điều trị cần phải phẫu thuật và chú ý vận động khớp kế cận
- c. Biên độ vận động của khớp không bị giới hạn vì mặt khớp vẫn tốt
- od. Nếu không phạm khớp thì không ảnh hưởng đến khớp kế cận

Question **6**

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Khớp giả là một dạng đặc biệt của tình trạng không liền xương, được phân biệt với các dạng khác vì có đặc điểm nào sau đây?

Select one:

- a. Hai đầu xương tại ổ gãy phì đại
- b. Hai đầu xương có sụn khớp bao bọc
- c. Hai đầu xương tại ổ gãy teo nhỏ
- d. Hai đầu xương có sụn sợi bao bọc

Question 7

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Trong nghiên cứu 108 trường hợp đã mổ kết hợp xương đùi tại nhiều bệnh viện nhưng không liền xương, tác giả Nguyễn Ngọc Long báo cáo tỉ lệ không liền xương thể ít phì đại gặp nhiều nhất, chiếm bao nhiêu phần trăm?

- a. 77.8 %
- b. 66.7 %
- c. 78 %
- d. 64.8 %

Question 8

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Trên thực tế lâm sàng tại Việt Nam, những trường hợp không liền xương ở thân xương cánh tay, đa số bệnh nhân có yếu tố nào sau đây trong bệnh sử?

Select one:

- a. Điều trị bằng bó bột nhưng tự cắt bỏ phần bột ở bàn tay
- b. Điều trị bằng mổ kết hợp xương cánh tay
- c. Điều trị bằng băng bó thuốc đông y
- d. Điều trị bằng bó bột và tuân thủ tái khám đầy đủ

Question 9

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Phân tích 108 trường hợp đã mổ kết hợp xương đùi tại nhiều bệnh viện nhưng không liền xương, tác giả Nguyễn Ngọc Long nhận thấy tỉ lệ cố định ổ gãy không vững chiếm bao nhiêu phần trăm?

Select one:

- a. 38 %
- b. 33.3 %
- c. 66.7 %
- d. 64.8 %

Question 10

Complete

Mark 1.00 out of

1.00

Đặc điểm nào sau đây phù hợp với không liền xương thể phì đại?

- a. Thường là hậu quả của gãy đơn giản thiếu bất động
- b. Điều trị cần phải phẫu thuật và luôn cần ghép xương
- c. Thường là hậu quả của xương gãy hở nát nhiều mảnh
- d. Thường gặp ở hành xương của các xương dài

