

Pretest CBL số 11/1

...

Xin chào, Lưu Tuyết. Khi bạn gửi biểu mẫu này, chủ sở hữu sẽ thấy tên và địa chỉ email của bạn.

* Bắt buộc

1. Họ và tên

*

Nhập câu trả lời của bạn

2. Tổ - lớp

*

Nhập câu trả lời của bạn

3. Bệnh nhi sốc phản vệ, vận mạch đầu tay là gì? *

(1 Điểm)

- ☒ A. Adrenalin
- ☐ B. Noradrenaline
- ☐ C. Dopamin
- ☐ D. Dobutamin

4. Bệnh nhi bị sốc nhiễm trùng - tiêu chảy cấp, loại dịch chống sốc trong giờ đầu nào tối ưu? *

(1 Điểm)

- ☒ A. Lactate Ringer
- ☐ B. Natriclorua 3%
- ☐ C. Albumin
- ☐ D. Dextrose 5% in saline

5. Trong các trẻ sau, trẻ nào nên được nhập cấp cứu?

*

(1 Điểm)

- ☐ Trẻ 2 tuổi sốt co giật cách 1h, hiện hết giật còn sốt, ba trẻ lo lắng vì tiền căn có sốt co giật
- ☐ Trẻ bị bỏng ở bàn tay (P)
- ☐ Trẻ bị gãy xương
- ☒ Trẻ bị khó thở, tím

6. Phân giai đoạn sốc dựa vào triệu chứng nào? *

(1 Điểm)

- ☐ A. Mạch nhanh
- ☒ B. Huyết áp tâm thu
- ☐ C. Huyết áp tâm trương
- ☐ D. Huyết áp trung bình

7. Triệu chứng lâm sàng nào là quan trọng nhất trong chẩn đoán sốc? *

(1 Điểm)

- ☐ A. Mạch tăng
- ☐ B. Huyết áp giảm
- ☒ C. Giảm tưới máu
- ☐ D. Chi mát

8. Điều trị chính yếu ở bệnh nhi **sốc giảm thể tích** là gì? *

(1 Điểm)

- ☒ A. Dịch chống sốc
- ☐ B. Tăng co bóp cơ tim
- ☐ C. Tăng co mạch
- ☐ D. Thở oxy

9. Trong chẩn đoán **sốc ở trẻ em**, yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất? *

(1 Điểm)

- ☐ A. Mạch tăng
- ☒ B. Huyết áp giảm
- ☐ C. CRT kéo dài
- ☒ D. Lactate tăng

10. Tại sao bệnh nhi sốc cần thở oxy? *

(1 Điểm)

- ☐ A. Bệnh nhân sốc có suy hô hấp kèm

- ☐ B. Tăng liên kết của hồng cầu với oxy
- ☐ C. Tăng tưới máu
- ☒ D. Tăng oxy hoà tan

11. Triệu chứng nào sau đây cần nhập cấp cứu? *
(1 Điểm)

- ☐ A. Thở nhanh
- ☐ B. Thở co lõm
- ☒ C. Mạch không bắt được
- ☐ D. Ói nhiều không uống được

12. Bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng – nhọt da vùng cẳng chân (P), nhiễm từ cộng đồng, kháng sinh đầu tay thích hợp là gì? *
(1 Điểm)

- ☐ A. Ceftriaxone
- ☒ B. Vancomycin
- ☐ C. Meropenem
- ☐ D. Ceftazidim

13. Bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng, xét nghiệm nào cần theo dõi sát để đánh giá tình trạng tưới máu? *
(1 Điểm)

- ☐ A. Công thức máu
- ☐ B. Ure, creatinin
- ☐ C. AST, ALT

☒ D. Khí máu động mạch

14. Bệnh nhi bị sốc nhiễm trùng, nồng độ hemoglobin cần duy trì tối thiểu bao nhiêu?

*

(1 Điểm)

☒ A. 10 g/dL

☐ B. 9 g/dL

☐ C. 8 g/dL

☐ D. 7 g/dL

15. Điều trị chính yếu ở bệnh nhi sốc nhiễm trùng là gì? *

(1 Điểm)

☐ A. Đặt nội khí quản sớm

☐ B. Tăng co bóp cơ tim

☒ C. Tăng co mạch

☐ D. Thở oxy

16. Trong các xét nghiệm sau, xét nghiệm nào giúp chẩn đoán sốc? *

(1 Điểm)

☐ A. Công thức máu có bạch cầu tăng

☐ B. CRP tăng

☒ C. Lactate tăng

☐ D. Cấy máu có vi khuẩn

17. Điều trị chính yếu ở bệnh nhi sốc tim là gì? *

(1 Điểm)

- ☐ A. Dịch chống sốc
- ☒ B. Tăng co bóp cơ tim
- ☐ C. Tăng co mạch
- ☐ D. Thở oxy

18. Bệnh nhi bị sốc nhiễm trùng - tiêu chảy cấp, loại dịch chống sốc trong giờ đầu nào tối ưu? *

(1 Điểm)

- ☒ A. Natriclorua 0,9%
- ☐ B. Natriclorua 3%
- ☐ C. Albumin
- ☐ D. Dextrose 5% in lactate

19. Ở bệnh nhi sốc, mục tiêu ScvO₂ cần đạt được là bao nhiêu? *

(1 Điểm)

- ☐ A. 90% - 100%
- ☐ B. 80% - 90%
- ☒ C. 70% - 80%
- ☐ D. 60% - 70%

20. Điều trị chính yếu ở bệnh nhi sốc phản vệ là gì? *

(1 Điểm)


(

- ☐ A. Dịch chống sốc
- ☐ B. Tăng co bóp cơ tim
- ☒ C. Tăng co mạch
- ☐ D. Thở oxy

21. Bệnh nhi bị sốc xuất huyết, nồng độ hemoglobin cần duy trì tối thiểu bao nhiêu? *

(1 Điểm)

- ☒ A. 10 g/dL
- ☐ B. 9 g/dL
- ☐ C. 8 g/dL
- ☐ D. 7 g/dL

22. Ở bệnh nhi sốc, khí máu động mạch có bất thường sau là phù hợp tình trạng giảm tưới máu? * 

(1 Điểm)

- ☐ A. Toan chuyển hoá, anion gap bình thường
- ☒ B. Toan chuyển hoá, anion gap tăng
- ☐ C. Toan hô hấp
- ☐ D. Kiềm chuyển hoá

Gửi

của chủ sở hữu biểu mẫu này. Không bao giờ đưa ra mật khẩu của bạn.

Hoạt động trên nền tảng Microsoft Forms | [Quyền riêng tư và cookie](#) | [Điều khoản sử dụng](#)