

## **Liệt ruột :**

- Trừ trường hợp liệt ruột thứ phát sau tắc ruột cơ học và 1 số ít nguyên nhân gây liệt ruột liên quan ngoại khoa (abcess ổ bụng , nhồi máu mạc treo...), còn lại phần lớn các TH liệt ruột khác không có CĐ phẫu thuật.

## **Bán tắc ruột :**

- Chủ yếu là điều trị nội khoa bảo tồn .
- Theo nghiên cứu của Fleshner và cs , 66% BN bán tắc ruột thành công với điều trị bảo tồn , tỉ lệ tử vong là 0% .

- CĐ phẫu thuật trên BN bán tắc ruột :

1/ BN không đáp ứng với điều trị bảo tồn , tiến triển sang tắc ruột hoàn toàn.

2/ Thời gian thuốc cản quang xuống đến manh tràng > 8h. (\*)

3/ CĐ liên quan đến chất lượng cuộc sống BN.  
(\*\*)

(\*) : + BN được uống Gastrografin . Sau đó được chụp nhiều phim cách nhau 1-2 tiếng. Nếu thời gian để thuốc xuống được manh tràng > 8h □ có CĐ PT

+ Mốc 8h có được do nghiên cứu thống kê rằng , với những BN giảm lưu thông ruột dưới mức độ này , 93% sẽ thành công với điều trị nội khoa bảo tồn . Với những BN trên mức độ này , chỉ có 19% đáp ứng với điều trị bảo tồn.

(\*\*) : + vẫn đang được bàn cãi .

+ CĐ này được lựa chọn trên những BN bán tắc ruột nhiều lần , NV nhiều lần , triệu chứng ảnh hưởng cuộc sống hàng ngày hoặc gây nên 1 tâm lý luôn luôn lo lắng .