

Question 1

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

Mục tiêu của bác sĩ lâm sàng khi đánh giá sinh thiết một sang thương vú nghi ngờ ác tính, chọn câu chưa chính xác:

- ☐ a. Phải đạt được mẫu mô đủ để đánh giá sinh học trên bướu.
- ☐ b. Phải đạt được mẫu mô đủ chẩn đoán giải phẫu bệnh.
- ☐ c. Phải là phương pháp ít xâm lấn nhất nhưng không được chẩn đoán dưới mức của bệnh (underestimated).
- ☒ d. Nếu nghi trên lâm sàng thì không nên sinh thiết dù có khoảng 10-15% ung thư không thấy trên nhũ ảnh.

Next Page

Question 2

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

Bệnh nhân nào sau đây là nguy cơ cao nhất tái phát tại chỗ sau phẫu thuật bảo tồn vú

- ☐ a. Nữ 35 tuổi, T = 2cm, grad 2, ER (-), diện cắt gân nhĩ 6mm, được xạ trị toàn bộ vú + xạ khu trú nền bướu và có hóa trị hỗ trợ
- ☐ b. Nữ 65 tuổi, T = 4cm, grad 1, ER (+), diện cắt gân nhĩ 4mm, được xạ trị toàn bộ vú + xạ khu trú nền bướu và dùng AI hỗ trợ
- ☐ c. Nữ 65 tuổi, T = 2cm, grad 1, ER (+), diện cắt gân nhĩ 3mm, được xạ trị toàn bộ vú (WBRT) không xạ trị khu trú và không dùng AI hỗ trợ
- ☒ d. Nữ 25 tuổi, T = 2cm, grad 3, ER (-), diện cắt gân nhĩ < 1mm, điều trị bảo tồn có xạ trị toàn bộ vú + khu trú nền bướu và không điều trị toàn thân

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows

Next Page

Question 3

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

Một bệnh nhân nữ, 55 tuổi, mãn kinh 4 năm, khám bệnh vì tiết dịch núm vú từ một lỗ, dịch đỏ, bên vú trái. Siêu âm màu tuyến vú không phát hiện tổn thương vú 2 bên. Nhũ ảnh của bệnh nhân này cho thấy đám vi vôi hóa 1,5 cm dưới núm vú trái. Bước tiếp theo trong đánh giá bệnh nhân này?

- ☐ a. Chụp MRI vú và vùng hạch nách
- ☒ b. Sinh thiết qua da dưới định vị của nhũ ảnh
- ☐ c. FNA dưới chẩn hướng dẫn của nhũ ảnh
- ☐ d. FNA dưới chẩn hướng dẫn của siêu âm

Next Page

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows

Question 4

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

Nhũ ảnh nghi ngờ **ung thư vú** chủ yếu gồm 2 nhóm sang thương dạng khối mô mềm và dạng vi vôi hóa. chọn câu phát biểu sau đây chưa chính xác về sang thương vi vôi hóa trên nhũ ảnh:

- ☐ a. Vi vôi hóa dạng nhánh hầu hết có liên quan mô học dạng trứng cá có giá trị tiên đoán ác tính cao hơn vôi hóa dạng hạt, đặc biệt trong DCIS grad cao.
- ☐ b. Khoảng 1/3 ung thư xâm lấn có liên quan đến vi vôi hóa, có hay không có mô mềm và 10% ung thư trong ống biểu hiện bằng khối mô mềm mà không có vi vôi hóa.
- ☐ c. Đám vi vôi hóa là tinh thể nhỏ canxi với nhiều kích cỡ và hình dạng khác nhau đường kính từ 0,1-1 mm và số lượng là 4-5 trong một đơn vị cm³
- ☒ d. Vi vôi hóa chiếm 40% **ung thư vú** phát hiện qua nhũ ảnh.

Next Page

Question 5

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

Phát biểu sau đây đúng khi nói về biến chứng sau mổ của đoạn nhũ tiết kiệm da, ngoại trừ:

- ☒ a. **Hoại tử vật da là biến chứng ít gặp nhất.**
- ☐ b. Tiên căn xạ trị và hút thuốc lá nhiều cũng tăng nguy cơ hoại tử vật da
- ☐ c. Tỷ lệ tụ máu và nhiễm trùng sau ĐNTKD và đoạn nhũ không tiết kiệm da giống nhau.
- ☐ d. Nguy cơ hoại tử vật da có liên quan đến các yếu tố nguy cơ là béo phì, tiểu đường.

Next Page

Question 6

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

Chọn câu trả lời đúng qua các nghiên cứu đánh giá xuynh hướng phẫu thuật **ung thư vú** hiện nay:

- ☒ a. **Xuynh hướng gia tăng phẫu thuật bảo tồn vú trong **ung thư vú** giai đoạn sớm**
- ☐ b. Xuynh hướng gia tăng phẫu thuật tái tạo vú trí hoãn hơn tái tạo vú tức thì
- ☐ c. Xuynh hướng tăng chọn lựa phẫu thuật phòng ngừa vú đối bên của **ung thư vú** xâm lấn tại Mỹ
- ☐ d. Xuynh hướng gia tăng phẫu thuật đoạn nhũ tiết kiệm da nhưng bỏ quăng vú núm vú.

Next Page

Question 7

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

Chọn câu phát biểu chưa chính xác về tái tạo vú bằng túi độn hay túi dẫn mô:

- ☐ a. Túi độn có thể kết hợp dùng với vật tự thân
- ☐ b. Túi dẫn mô tái tạo vú khắc phục tình trạng thiếu da và cải thiện độ xệ vú tái tạo.
- ☐ c. Túi độn tái tạo vú với nhiều cải tiến về chất liệu, hình dạng để giảm thiểu các biến chứng trong tái tạo vú.
- ☒ d. Túi dẫn mô không thể kết hợp với vật tự thân trong tái tạo vú tức thì.

Next Page

Question 8

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

Các tình huống sau đây trên bệnh nhân nữ 45 tuổi, tiền mãn kinh, được nghĩ nhiều nhất đến **ung thư vú**:

- ☐ a. Bệnh nhân có tiết dịch núm vú một lỗ, một bên vú, dịch màu đỏ
- ☐ b. Bệnh nhân đến vì có bướu vú to, sưng và đau vú cùng bên
- ☐ c. Gãy đầu trên xương cánh tay do chấn thương sau té kèm theo có bướu vú cùng bên
- ☒ d. Bệnh nhân có bướu vú cứng, giới hạn không rõ, di động kém, co kéo núm vú và da bên trên

Next Page

Question 9

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

Phát biểu sau đây là đúng khi nói về yếu tố nguy cơ của ung thư vú:

- ☐ a. Tiền căn gia đình mắc ung thư vú (mẹ, chị, em gái) cũng không là yếu tố nguy cơ ung thư vú.
- ☐ b. Xạ trị vùng ngực, sang thương tiền ung thư (DCIS) và đột biến gen BRCA1-2 là yếu tố nguy cơ cao ung thư vú.
- ☐ c. Uống rượu, dùng nội tiết thay thế hậu mãn kinh không làm tăng nguy cơ ung thư vú.
- ☒ d. Tuổi là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất của ung thư vú.

Next Page

Activate Windows

Question 8

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Flag question

Các chọn lựa sau đây cho bệnh nhân tái tạo vú bằng vat da cơ lưng rộng, chọn câu đúng:

- ☐ a. Bệnh nhân có vú tương đối nhỏ hay vú to mà không đủ mô ở vùng bụng để tái tạo vú có thể kết hợp với dùng túi đòn vú.
- ☐ b. Không dùng cho bệnh nhân có tiền căn mổ mở lồng ngực sau (có cắt mạch máu cung cấp cho cơ lưng rộng)
- ☐ c. Không dùng cho bệnh nhân không nằm nghiêng được hoặc có bệnh lý nội khoa nặng
- ☒ d. Tất cả các câu trên đều đúng

Next Page