

⑥ Bé trai, 6 tháng, đến khám vì sốt và tiêu chảy N_1 , đến cơ
thần có triệu chứng (T) đến sốt, sau đó khám lại lúc 15 tháng tuổi

- SA 1,5 ms: (T) > (P)

↓ AP (T) 20 mm

Chức năng (T) còn đầy

NQ 2 bên có dấu

BQ

Làm gì tiếp tại PK: \Rightarrow cho SA lại.

KQ SA:

(T) có triệu chứng IV

dAP = 35 mm

Chức năng tốt

NQ có dấu, BQ còn tốt.

Nên NQ (-) \rightarrow

\swarrow K' dấu thực

Có dấu ở BQ này

Thập phân B?

\hookrightarrow Sốt, tiêu chảy tại thời, bất thường tiêu hóa, 6 tháng tuổi

\Rightarrow NPT trên phim X.

Sau khi ở NĐT, cần CLS nào VD thêm? (CM, CRP đã làm...)

- Xét hình thức.

- VCLG

⇒ VCLG cần cân nhắc do các

ý kiến (NĐT tập pháp, xem lại...).

(Hạn chế địa X ở như như với số thuế).

⇒ LTV là còn đưa vào XN. cần thêm.



- Loại + ở ①, ②.

- ③: NQ là dân số có thể

địa thấy, có thể là môi

trường ⇒ ③ có thể là môi trường.

Có chỉ tiêu PT là? ⇒ Có.

- Phân tích môi trường có thêm chi phí

③ Chỉ tiêu VCLG : $\left\{ \begin{array}{l} \text{Có thêm} \\ K^0 \text{ thêm} + NQ (+) \end{array} \right.$