


TƯ VẤN TẦM SOÁT LỆCH BỘI: THAI PHỤ Ở DÂN SỐ CHUNG

Ngô Thị Bình Lụa, Trần Nhật Thăng, Âu Nhật Luân

Mục tiêu học tập:

1. Nhận diện được nguy cơ nền tảng mắc lệch bội của một thai phụ là ở mức cao hay thấp, để chọn hướng tiếp cận thích hợp.
2. Tư vấn được cho thai phụ về lựa chọn một phương pháp tầm soát lệch bội thích hợp.
3. Tư vấn được cho thai phụ về kết quả của test tầm soát lệch bội và đạt đồng thuận về hướng quản lý thích hợp.

Tư vấn cho thai phụ về thực hiện và về kết quả sàng lọc lệch bội: dân số chung



Sơ đồ: Các mục tiêu và tác vụ khi tư vấn lựa chọn thực hiện test tầm soát lệch bội và kết quả của tầm soát. Dân số chung.

Trước tiên, cần tìm hiểu ý nguyện thực hiện test tầm soát lệch bội, và lý do từ chối (nếu có). Cần nhận diện các thai phụ thuộc dân số nguy cơ rất cao, vì họ cần được tầm soát theo một chiến lược riêng. Tầm soát cho dân số chung được dựa trên nền tảng của Combined test. Các kết quả nguy cơ tính toán "thấp" cho phép thoát khỏi chương trình tầm soát. Thai phụ thuộc vùng đen cần được tiếp tục thực hiện test (có thể là test chẩn đoán trực tiếp, hay thông qua NIPT). Có hai giải pháp thoát xám khác nhau, một dựa trên cơ sở của NIPS, và một dựa trên cơ sở của các soft-markers và Triple test. Nếu kết quả của NIPT/NIPS là "no call", thì phải chuyển sang thực hiện test chẩn đoán, mà không quay lại test tầm soát.

Nguồn: Bộ môn Phụ Sản ĐHYD TP.HCM. 2020

TÀI LIỆU ĐỌC THÊM

1. Đỗ Thị Ngọc Mỹ, Ngô Thị Bình Lụa, Trần Nhật Thăng. *Các bài giảng liên quan đến chiến lược và công cụ tầm soát lệch bội*. Bài giảng Sản khoa, bộ môn Phụ Sản Đại học Y Dược TP. HCM. 1st Ed. 2020. Nhà Xuất bản Y học. p81-95.