


Đề cuối kì ngoại niệu

- 
2. Câu nào đúng về PDE 5 : y như pre test
 3. Bn đã được phẫu thuật cắt đốt tlt, sau đó bị rl cương dương, tk nào bị ảnh hưởng
 - a. Thần kinh thể hang
 - b. Thần kinh thẹn chậu (k nhớ rõ mà hình như là v thần kinh thẹn trong
 - c. Hạch tk giao cảm
 4. Nhiễm khuẩn đường tiết niệu nào thường cần phải điều trị
 - a. Người già
 - b. Phụ nữ mang thai ???
 - c. Mãn kinh
 5. Yếu tố nào k phải là yếu tố phức tạp của NKDTN: giống pre test
 6. Viêm bàng quang cấp đơn thuần điều trị bao lâu
 - a. 1 ngày
 - ☒ b. 3
 - c. 7
 - d. 9
 7. Bệnh nhân tiểu gắt buốt , DRE: tlt to, ấn đau, nóng , cls nào nên làm tiếp theo
 - a. Sa bọng
 - ☒ b. Sa qua trực tràng TPTNT?
 - c. Psa
 - d. Cấy nt
 8. Thể tích của TLT trong tăng sinh lành tính TLT liên quan chặt chẽ với
 - a. Tr. Chứng đường tiết niệu dưới
 - b. Thang dieierm IPSS
 - ☒ c. PSA
 9. Bệnh nhân nữ, bị nhiễm khuẩn đường tiết niệu trên 3 lần dưới 5 lần trong 2 năm, nguyên nhân có thể
 - ☒ a. Ngược dòng BQ-NQ
 - b. Động lực VK
 10. Yếu tố bảo vệ đầu tiên của BQ
 - ☒ a. Đi tiểu
 - b. Ph thấp của nước tiểu
 - c. Pro tamm hostfam
 - d. Độ bão hòa thấp của nước tiểu
 11. Bàng quang tăng hoạt, tr chung quan trọng nhất
 - a. Tiểu đêm
 - b. Tiểu gấp
 - c. Tiểu k kiểm soát
 - ☒ d. Tiểu nhiều

12. Bn tăng sinh lành tính tít, được đtr với ức chế alpha nhưng thất bại, có tr, ch tổng xuất và bàng quang tăng hoạt, điều trị tiếp theo

- a. Phẫu thuật
- b. Kết hợp thêm muscaric
- ☒ c. Kết hợp thêm ức chế 5 alpha
- d. Kết hợp PDE 5

13. TH nào k được mổ cấp cứu ngoại khoa (để ghi rõ là KHÔNG ĐƯỢC)

- a. Sỏi niệu quản 2 bên
- b. Sỏi niệu quản trên thận độc nhất
- ☒ c. Sỏi niệu quản- Viêm thận bể thận cấp- NKH
- d. Cơ đau quặn thận- sỏi niệu quản

14. Bệnh nhân có sỏi đài bể thận 3cm, hẹp khúc nối bể thận niệu quản, đtr

- a. Mổ mở
- ☒ b. PCNL
- c. URS
- d. ESWL

15. Cis nào tốt nhất trong chẩn đoán áp xe thận

- a. Siêu âm
- b. CT scan (để k nghi có cản quang hay k)
- c. Xạ hình với Galium
- d. KUB

17. Mức độ trong bình cầu thang điểm IPSS là bn

- ☒ a. 8-19
- b. 0-7
- c. ...

18. Dấu hiệu lâm sàng đáng tin cậy nhất trong các dấu hiệu lâm sàng sớm của sepsis

- a. Sốt
- b. Tnawg thông khí
- c. Lạnh run
- d. Rối loạn tri giác

19. Điều k phải là chống chỉ định URS, PNCL

- a. NK đường niệu chưa điều trị
- b. Rối loạn đông máu
- c. Có thai
- ☒ d. Thận móng ngựa

20. Ung thư bàng quang, chưa phát hiện hạch, di căn xa GPB: carcinom tế bào chuyển tiếp, chưa xâm lấn cơ (a cho từ góc tiếng anh, mà t k nhớ) phân giai đoạn

- ☒ a. cT1N0M0
- b. cT2aN0M0
- c. cT2bN0M0
- d. cT3aN0M0

21. điều trị UT bằng quang cT3N0M0: trước dieiefu trị soi thấy khối u trong lòng BQ, sau khi tân hóa trị bổ trợ với ... (cái gì t cũng k nhớ mà co trong phát đồ) sau đó soi bằng quang k thấy khốiU nữa
- a. Phẫu thuật cắt BQ tận gốc
 - b. Theo dõi mỗi 3 tháng
 - c. Tiếp tục hóa trị với gì đó
 - d.
22. Vỡ bàng quang câu nào k đúng
- a. Có thể mổ cấp cứu trong trường hợp tổn thương các cơ quan khác
 - b. Mổ cấp cứu càng sớm càng tốt
 - c. Kháng sinh giảm đau
 - d. Theo dõi nếu sinh hiệu ổn
23. Bệnh nhân chấn thương thận
- a. Mổ cấp cứu nếu huyết động không ổn định
 - b. Mổ nếu đa chấn thương tạng
 - c. Theo dõi nếu sinh hiệu ổn
 - d. Mổ nếu chấn thương vùng hông lưng
24. BN nam 24t, sỏi niệu quản 5mm, khám vì đau hông lưng, BC máu: 8k , (k cho tptnt), đtr
- a. Nội khoa
 - b. Tán sỏi
 - c. Ks
 - ☒ d. Uống nhiều nước
25. NN gây nk đường tiết niệu thường gặp nhất ở phụ nữ mang thai
- a. Ecoli
 - b. Entertococus GBS
 - c. Klepsiella
26. Kháng sinh dự phòng:
- a. Điều trị trước 12h
 - b. Điều trị trước 6h
 - c. Điều trị trước 3h
 - ☒ d. Điều trị đmar bảo thời gian tác dụng từ lúc uống đến suốt thời gian phẫu thuật
27. Bn đau hông lưng, tiểu gắt buốt, khám bụng ấn đau hông P, k bất thường khác, chẩn đoán có thể nhất
- ☒ a. Cơ đau quặn thận
 - b. Cơ đau quặn mật
 - c. Viêm ruột thừa
 - d. Viêm bàng quang
28. Xn nào nên làm đầu tiên khi nghĩ nk đường tiết niệu
- ☒ a. Tptnt
 - b. Siêu âm bụng
 - c. Cây nt
29. Tr, ch gọi ý nk đường tiết niệu dưới
30. Tr. Chứ thuộc nhóm chứa đựng, tống xuất (cho y như bài à)
31. Nước tiểu tồn lưu nheiefu k gây ra
- a. Sỏi

- b. Nk
- ☒ c. Bàng quang hỗn loạn thần kinh
- d. Thận ứ nước

32. Câu nào đúng về tptnt (y như pre)

T nhớ nhiều đó à!!!!