

Tp. HCM, ngày 26 tháng 09 năm 2022

**TRẢ LỜI THẮC MẮC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP
BÀI THI TÍCH HỢP 1 – NGÀY 19/09/2022
KHỐI Y2016**

Kính gửi: Ban Đào Tạo Khoa Y

Bộ môn Nội thần kinh đã xem xét các thắc mắc của sinh viên và thống nhất trả lời như sau:

- Câu 144. Đáp án được giữ nguyên không thay đổi

Cụ thể nội dung thắc mắc và phần trả lời của bộ môn như sau:

Nội dung câu hỏi	Câu 144: Bệnh nhân nam, 57 tuổi, nhập viện vì có một cơn co giật tay chân trái, kéo dài 1 phút, vẫn tỉnh trong cơn. Tiền căn mổ tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải do tai nạn giao thông 3 năm trước, chưa từng co giật trước đây. CT scan não cho thấy tổn thương não cũ vùng trán phải. Thuốc chống động kinh nào được ưu tiên lựa chọn? A. Valproate B. Carbamazepine C. Phenobarbital D. Chưa cần điều trị
Ý kiến Sinh viên	Ca này em thấy BN co giật mới 1 cơn chưa đủ tiêu chuẩn chẩn đoán động kinh nên theo em chưa có chỉ định dùng thuốc ạ?
Trả lời của BMTK	Theo định nghĩa bệnh động kinh, tình huống này là tình huống phù hợp với ý thứ hai trong định nghĩa: “2. Một cơn động kinh tự phát (hay phản xạ) và có khả năng tái phát cơn tiếp theo tương đương nguy cơ tái phát chung (> 60%), trong vòng 10 năm kế tiếp.” (Giáo trình Thần kinh học của BM Thần kinh ĐHYD TPHCM – 2020, trang 149) Bệnh nhân có cơn động kinh lần đầu tiên, nhưng xảy ra trên người có tiền căn chấn thương sọ não là một loại tổn thương có nguy cơ tái phát động kinh cao, bên tổn thương phù hợp với cơn động kinh (tổn thương cũ trán phải, cơn động kinh cục bộ tay chân trái) nên được coi là bệnh động kinh. Như vậy dù là cơn đầu tiên nhưng đã có chỉ định điều trị, và lựa chọn đầu tay cho cơn cục bộ là lựa chọn B. Carbamazepine.

Trân trọng.

**TL. Trưởng Bộ môn
Phó Trưởng Bộ môn**



TS. Trần Công Thắng