

Câu hỏi

Thời gian còn lại

0:26:8



Số báo danh

20170116_18290

SUBMIT

1 TÌNH HUỐNG 1: VỘI VÃ

Bà Y., 22 tuổi, PARA 0010, đến để tái khám vì rong huyết kéo dài sau phá thai nội khoa.

Chu kỳ kinh của bà Y. trước nay không đều. Cách nay 1 tuần, bà Y. có đến khám một cơ sở y tế tuyến dưới vì trễ kinh 1 tuần, test nhanh hCG nước tiểu dương tính. Bà được chẩn đoán là có thai, và đã yêu cầu được phá thai nội khoa.

Bà được thực hiện siêu âm, tuy nhiên không thấy có hình ảnh túi thai trong tử cung. Do test định tính hCG dương tính nên bà Y. vẫn được cho uống mifepristone và ngậm misoprostol theo phác đồ chuẩn dành cho tuổi thai dưới 49 ngày vô kinh.

Sau khi hoàn tất các thuốc, bà Y. bắt đầu đau bụng, kèm theo đó là rong huyết từng ít một, nhưng không thấy tổng xuất sản phẩm thụ thai. Tình trạng đau bụng khi nhiều, khi ít, kèm theo ra huyết đen rỉ rả từng ít một ở âm đạo.

Đặt mỏ vịt thấy có ít huyết sậm đen, loãng từ cổ tử cung. Khám âm đạo không thấy bất thường ở hai phần phụ.

Định lượng hCG hiện tại cho kết quả β -hCG = 1200 mIU/mL. Siêu âm ghi nhận nội mạc tử cung dày 12 mm. Trong lòng tử cung có hình ảnh một khoảng echo trống, d = 3 mm X 3 mm X 6 mm, nằm lệch khỏi đường giữa, có dấu hiệu vòng đôi. Phần phụ trái không thấy bất thường. Có một khối phản âm hỗn hợp thuộc về buồng trứng phải, d = 23 mm. Không thấy hiện diện dịch cùng đồ.

Hãy nhận định về tình hình của bà Y. và ra quyết định. Chọn hai câu đúng

- A.** ☐ Sẩy thai không trọn với hình ảnh của sốt nhau
- B.** ☐ Phá thai thất bại, còn túi thai trong buồng tử cung
- C.** ☐ Thai ngoài tử cung với túi giả trong buồng tử cung
- D.** ☐ Can thiệp ngoại khoa bằng hút chân không Karman
- E.** ☐ Dùng lại nội khoa với mifepristone và misoprostol
- F.** ☐ Chỉ tiếp tục bằng misoprostol đơn thuần, với liều cao
- G.** ☐

2 TÌNH HUỐNG 2: THAI SAU TRÁNH THAI KHẨN CẤP

Cô B., 24 tuổi, PARA 0010, chưa lập gia đình, đến khám vì ra huyết âm đạo kéo

IF AT								
C1	A	B	C	D	E	F	G	0
C2	A	B	C	D	E	F	G	0
SCORE: 0								

- A.** ☐ Sốt sản phẩm thụ thai trong buồng tử cung sau phá thai
- B.** ☐ Xuất huyết liên quan đến thuốc sau phá thai nội khoa
- C.** ☐ Thai không xác định vị trí (PUL) (Pregnancy of Unknown Location)
- D.** ☐ Dùng thêm thuốc gò tử cung nhóm misoprostol
- E.** ☐ Hút buồng tử cung bằng ống hút Karman
- F.** ☐ Chưa có chỉ định can thiệp gì ở thời điểm hiện tại
- G.** ☐

IF AT								
C1	A	B	C	D	E	F	G	0
C2	A	B	C	D	E	F	G	0
SCORE: 0								