

# Pretest Suy tim (Đợt 1 - Ngày 19/09/2022)

Tổng điểm 8/10 ?

✗ Họ và tên \*

.../1

PHẠM THỊ THẢO

✗

✗ Tổ \*

.../1

11

✗

✓ Câu 1: Thuốc ức chế beta nào sau đây chứng minh được hiệu quả trong cải thiện triệu chứng, huyết động và giảm tỉ lệ tử vong ở bệnh nhân suy tim? \*1/1

- ☐ Atenolol
- ☐ Propanolol
- ☒ Metoprolol
- ☐ Labetalol

✓



✓ Câu 2: Thuốc nào sau đây giúp cải thiện tiên lượng tử vong và giảm tỉ lệ nhập viện ở bệnh nhân suy tim, được xem là thuốc nền tảng trong điều trị suy tim? \*1/1

☒Ức chế men chuyển



☐Digoxin

☐Nitrate

☐Lợi tiểu

✓ Câu 3: Bệnh nhân suy tim mạn, có phân suất tống máu là 20%. Khi đo ECG ghi nhận có QRS rộng  $\geq 120$  ms và có dạng rối loạn dẫn truyền nội thất. Điều trị thích hợp cho bệnh nhân là gì? \*1/1

☐Đặt máy khử rung tự động

☒Đặt máy tái đồng bộ thất



☐Chụp mạch vành

☐Thêm ivabradine

✓ Câu 4: Cần lưu ý xét nghiệm nào khi sử dụng nhóm thuốc ARNI? \* 1/1

☐Glucose máu

☒Kali máu



☐Tổng phân tích nước tiểu

☐TSH



✓ Câu 5: Bệnh nhân bị suy tim sung huyết đang khó thở nhiều, không nên dùng loại thuốc nào sau đây? \*1/1

- ☐Ức chế men chuyển
- ☒Chẹn beta
- ☐Lợi tiểu furosemide
- ☐Spironolactone



✓ Câu 6: Bệnh nhân nam 60 tuổi, suy tim 2 năm nay do bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ, đã được đặt stent vào LAD. Đang dùng thuốc Enalapril 10 mg 1 viên x 2 uống, Bisoprolol 5 mg 1 viên uống, Aspirin 81 mg 1 viên uống, Atovastatin 20 mg 1 viên uống. Bệnh nhân vẫn còn mệt khi đi bộ khoảng 100 mét, nằm ngủ một gối thì không bị khó thở. Khám mạch 70 lần/phút, huyết áp 120/80 mmHg, Tim T1 - T2 đều, không gallop, phổi không ran. Bụng mềm, gan không to. Không phù. Siêu âm tim gần nhất ghi nhận phân suất tống máu (EF) là 30%. Chiến lược điều trị nào sau đây là thích hợp cho bệnh nhân? \*1/1

- ☒Thêm spironolactone
- ☐Thêm digoxin
- ☐Thêm ivabradine
- ☐Thêm sacubitril



✓ Câu 7: Bệnh nhân nam 58 tuổi, suy tim do bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ, \*1/1 đang điều trị hàng ngày: Enalapril 20 mg, Bisoprolol 2,5 mg; Clopidogrel 75 mg; Rosuvastatin 10 mg, Furosemide 40 mg. EF 40%. Huyết áp 120/70 mmHg. Tần số tim 92 lần/phút. Nhiệt độ 37 °C. Bệnh nhân than còn mệt và hồi hộp khi sinh hoạt hàng ngày, không phù chân, không khó thở khi nằm đầu thấp. Thay đổi điều trị phù hợp ở thời điểm này là gì?

☐ Tăng liều enalapril

☐ Đổi Enalapril sang Losartan

☒ Tăng liều Bisoprolol



☐ Tăng liều Furosemide

✓ Câu 8: Bệnh nhân nữ 25 tuổi, bị bệnh cơ tim giãn nở. Bệnh nhân vừa phát \*1/1 hiện mang thai tuần thứ 4. Siêu âm tim ghi nhận dẫn bốn buồng tim và phân suất tống máu là 32%. Loại thuốc nào sau đây được lựa chọn phù hợp cho bệnh nhân?

☐ Perindopril

☐ Verospirone

☒ Hydralazine và isosorbite dinitrate



☐ Sacubitril/valsartan

Nội dung này không phải do Google tạo ra hay xác nhận. - [Điều khoản Dịch vụ](#) - [Chính sách quyền riêng tư](#)

Google Biểu mẫu

