

## ĐỀ THI LÝ THUYẾT Y6 – ĐỀ 1

1. Bệnh nhân bị tai nạn giao thông vào viện với tình trạng đau ngực, khó thở dữ dội, xay xát da nhiều vùng ngực, đã được bệnh viện tuyến trước xử trí đặt dẫn lưu màng phổi. Tình trạng khó thở có cải thiện, chụp lại X quang phổi vẫn còn hình ảnh tràn khí màng phổi và dẫn lưu màng phổi còn xì khí liên tục. Chẩn đoán nào cần được nghĩ đến:

- a. Dập phổi
- b. Xẹp phổi
- c. Tổn thương khí quản – chắc là khó thở sẽ ko cải thiện
- ☒ d. Tổn thương phế quản
- e. Chỉ đơn thuần là tràn khí màng phổi do tổn thương nhu mô phổi

2. BN bị tai nạn sinh hoạt, đi bộ trượt chân ngã xuống nền nhà, vào viện ngay sau chấn thương với tình trạng đau từ gối đến bàn chân, chân sưng nề quanh gối. Khám lâm sàng: giới hạn vận động khớp gối, lạnh từ cổ chân đến bàn chân, không tím, mạch khoeo khó bắt, vận động và cảm giác bàn chân tốt. XQ khớp gối và 2 xương cẳng chân không phát hiện tổn thương. Thái độ xử trí tiếp theo được lựa chọn:

- ☒ a. Siêu âm mạch máu chi dưới.
- b. Chụp MRI khớp gối.
- c. Chụp MRI mạch máu chi dưới
- d. Chụp CT mạch máu chi dưới.
- e. Chụp DSA mạch máu chi dưới.

4. Phát biểu nào sau đây **đúng** về u trung thất

- a. U trung thất luôn là khối u ác tính nằm trong lồng ngực
  - ☒ b. Triệu chứng của u trung thất thường không đặc hiệu như: ho khan, tức ngực, cảm giác khó thở...
  - c. Phù áo khoát là hội chứng gây ra do khối u trung thất chèn ép tĩnh mạch chủ dưới
  - d. U trung thất trước gần như 100% là u có nguồn gốc xuất phát từ mô thần kinh
  - e. U trung thất thường phải phẫu thuật khẩn cấp vì khối u nằm cạnh các CQ sinh tồn như tim phổi
5. Nhân viên nam 57 tuổi khi khám sức khỏe định kỳ ở công ty chụp X quang ngực phát hiện nốt thùy trên phổi phải khoảng 15mm, cận lâm sàng tiếp theo để khảo sát bản chất nốt phổi cho ông là:
- ☒ a. Chụp cắt lớp điện toán.
  - b. Sinh thiết nốt phổi.
  - c. Nội soi phế quản.
  - d. Chụp PET-CT.
  - e. Xét nghiệm Cyfra-21.1, CEA ...

6. Chọn câu đúng (bệnh tim bẩm sinh):

- a. Bệnh tứ chứng Fallot là hay gặp nhất
- b. Trong quá trình tiến triển của bệnh thông liên thất, sẽ không có tím
- c. Tổn thương thông liên nhĩ ***tiền phát*** thường điều trị bằng can thiệp thông tim bất đủ.
- ☒ d. Tiến triển của bệnh thông liên nhĩ sẽ có giai đoạn bệnh nhân bị tím
- e. Phần lớn bệnh thông liên thất được điều trị bằng can thiệp thông tim bất đủ

ĐÁP ÁN: 1D, 2A, 3E, 4B, 5A, 6D

Trưởng Bộ Môn