

**Question 1**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question

Yếu tố nào sau đây được xem là yếu tố thuận lợi của ung thư cổ tử cung?

- ☐ a. Dùng thuốc ngừa thai uống
- ☐ b. Tiền căn xạ trị vùng chậu
- ☐ c. Có kinh đầu sớm
- ☒ d. Quan hệ tình dục sớm

**Question 2**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question

Bà D., 35 tuổi, đã có 2 con đến khám phụ khoa định kỳ và **tầm soát ung thư cổ tử cung**. Công việc của bà rất bận rộn, không có thời gian lui tới bệnh viện nhiều. Phương pháp tầm soát nào sau đây là phù hợp nhất cho bà D.?

- ☒ a. Xét nghiệm HPV DNA
- ☐ b. Xét nghiệm Pap
- ☐ c. Khám lâm sàng trực tiếp
- ☐ d. Soi cổ tử cung

**Question 3**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question

Bà T. sau đó được chẩn đoán là ung thư cổ tử cung xâm lấn. Xét nghiệm nào sau đây giúp đánh giá tốt nhất sự xâm lấn tại chỗ tại vùng của tổn thương?

- ☐ a. Soi bằng quang, soi trực tràng
- ☒ b. MRI vùng chậu có cản từ
- ☐ c. PET.CT toàn thân
- ☐ d. CT scan bụng chậu có cản quang

**Question 4**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question

Triệu chứng thường gặp nhất của ung thư cổ tử cung xâm lấn là?

- ☒ a. Xuất huyết âm đạo bất thường
- ☐ b. Ra dịch âm đạo bất thường
- ☐ c. Đau vùng hạ vị
- ☐ d. Tiểu gắt, tiểu buốt

**Question 5**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question

Bà H., 47 tuổi đến khám vì xuất huyết âm đạo sau giao hợp. Cách 3 tháng bà H. bắt đầu có triệu chứng xuất huyết âm đạo sau giao hợp. Sau đó triệu chứng này xuất hiện thỉnh thoảng, không kèm triệu chứng khác. Bà H. đến khám với tổng trạng tốt, sinh hiệu ổn. Xử trí ban đầu phù hợp nhất cho bà H. là?

- ☐ a. Xét nghiệm công thức máu
- ☒ b. Khám phụ khoa
- ☐ c. Siêu âm bụng chậu
- ☐ d. Xét nghiệm chức năng đông máu

**Question 6**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question

Thời gian trung bình để tổn thương tiền ung thư diễn tiến thành ung thư cổ tử cung xâm lấn là?

- ☐ a. 1-3 năm
- ☐ b. 5-7 năm
- ☐ c. 3-5 năm
- ☒ d. Hơn 7 năm

**Question 7**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question

Bà L. 55 tuổi có triệu chứng ra dịch âm đạo nhiều, hôi từ 2 tháng nay. Khám lâm sàng phát hiện có tổn thương sùi kích thước 2cm ở mép trước cổ tử cung. Xử trí thích hợp nhất đối với tổn thương này là?

- ☐ a. Làm xét nghiệm Pap
- ☐ b. Soi cổ tử cung
- ☐ c. Làm xét nghiệm HPV DNA
- ☒ d. Bấm sinh thiết tổn thương

**Question 8**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question

Xét nghiệm nào sau đây được dùng làm **tầm soát** đầu tay ung thư cổ tử cung?

- ☒ a. Nhìn trực tiếp cổ tử cung dưới acid acetic VIA
- ☐ b. Sinh thiết cổ tử cung
- ☐ c. Soi cổ tử cung
- ☐ d. Xét nghiệm mRNA của HPV nguy cơ cao

**Question 9**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question

Bà T. 65 tuổi có triệu chứng xuất huyết âm đạo sau mãn kinh. Khám lâm sàng có tổn thương sùi cổ tử cung kích thước 3cm nghi ngờ ung thư nhưng kết quả giải phẫu bệnh sau bấm sinh thiết là mô viêm hoại tử. Xử trí tiếp theo nào là phù hợp nhất với bà T.?

- ☐ a. Điều trị viêm cổ tử cung trong 1 tháng
- ☐ b. Khoét chóp lấy trọn tổn thương cổ tử cung.
- ☒ c. Bấm sinh thiết lại tổn thương cổ tử cung
- ☐ d. Hội chẩn lame giải phẫu bệnh

**Question 10**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Flag question

Ung thư cổ tử cung xâm lấn theo hướng nào là có nguy cơ cao nhất đe dọa tính mạng người bệnh?

- ☐ a. Xuống dưới
- ☐ b. Ra trước
- ☐ c. Lên trên
- ☒ d. Qua hai bên