

Question 1

Not yet

answered

Marked out of

1.00

 Flag question

1. Siêu âm buồng trứng của trẻ ở tuổi dậy thì đang bị xuất huyết tử cung cơ năng, hình ảnh nào được thấy rất thường xuyên?

- ☐ a. Nang xuất huyết giống hoàng thể, tồn tại kéo dài
- ☐ b. Đếm thấy có ít nang hốc nhỏ hơn trẻ bình thường
- ☒ c. Nang echo trống, vách mỏng, đường kính ≤ 6 cm
- ☐ d. Hiện diện cùng lúc nhiều nang noãn vượt trội

Question 2

Not yet

answered

Marked out of

1.00

 Flag question

2. Hãy lý giải nguyên nhân gây ra xuất huyết tử cung cơ năng ở tuổi dậy thì?

- ☐ a. Do buồng trứng không sản xuất đủ E2, nên không tạo được phản hồi [+] của E2
- ☐ b. Do buồng trứng không sản xuất đủ P4, nên không tạo được phản hồi của P4
- ☐ c. Buồng trứng không sản xuất đủ E2, nên không tạo được phản hồi [-] của E2
- ☒ d. Do tần số các xung GnRH hạ đôi không đủ để tạo ra đỉnh LH đủ cao để gây phóng noãn


Question 3

Not yet

answered

Marked out of

1.00

 Flag question

3. Hãy xác định mục tiêu của can thiệp điều trị một trường hợp xuất huyết tử cung cơ năng ở tuổi dậy thì?

- ☐ a. Phục hồi được tình trạng phóng noãn hằng định
- ☐ b. Thiết lập được tình trạng phóng noãn hằng định
- ☐ c. Khắc phục chảy máu bằng điều trị không hormone
- ☒ d. Khắc phục chảy máu bằng progestin ngoại sinh


Question 4

Not yet

answered

Marked out of

1.00

 Flag question

4. Khi tìm nguyên nhân vô kinh thứ phát ở người nữ trong độ tuổi sinh sản, test nào là ưu tiên, khi đã có β -hCG âm tính?

- ☐ a. Khảo sát hình ảnh
- ☐ b. Định lượng nội tiết
- ☒ c. Bệnh sử, lâm sàng
- ☐ d. Khảo sát di truyền

Question 5

Not yet

answered

Marked out of

1.00

 Flag question

5. Microadenoma tuyến yên (prolactinoma) thường có liên quan đến kiểu xuất huyết tử cung bất thường nào?

- ☐ a. Cường kinh
- ☐ b. Rong kinh
- ☐ c. Rong huyết
- ☒ d. Vô kinh

Question 6

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Flag question

6.Ở người có AUB và có hội chứng buồng trứng đa nang, khi nào phải chỉ định dùng các thuốc gây phóng noãn?

- ☒ a. Khi đang mong muốn có con
- ☐ b. Khi chu kỳ kinh quá dài
- ☐ c. Khi đã xác định là AUB-O
- ☐ d. Trong cả ba trường hợp trên

Question 7

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Flag question

7.Yếu tố nào là quan trọng nhất cho phép xác lập chẩn đoán AUB-O tiền mãn kinh?

- ☒ a. Phải chắc chắn là không có các nguyên nhân thực thể
- ☐ b. Các khảo sát hình ảnh học siêu âm / cộng hưởng từ
- ☐ c. Đặc điểm thay đổi tính chất của chu kỳ kinh gần đây
- ☐ d. Phải có kết quả khảo sát mô bệnh học loại trừ ác tính

chọn A

Question 8

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Flag question

8.Để điều trị triệu chứng chảy máu của xuất huyết tử cung bất thường ở phụ nữ hậu mãn kinh, hiện không đang dùng steroids ngoại sinh, nếu đã loại trừ được một cách chắc chắn nguyên nhân thực thể ác tính ở nội mạc tử cung, thì bạn sẽ ưu tiên chọn được chất nào là được chất đầu tay?

- ☐ a. Progesterone
- ☐ b. Nhóm estrogen
- ☐ c. Nhóm progestin
- ☒ d. Acid tranexamic

Activista MindSpace

Question 9

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Flag question

9.Một cách tổng quát, việc chọn progestin cho điều trị xuất huyết tử cung bất thường phải được căn cứ trên tiêu chí nào?

- ☐ a. Ưu tiên dùng các chế phẩm có tính đối kháng genomic mạnh nhất với estrogen
- ☐ b. Ưu tiên dùng các chế phẩm có các đặc điểm giống progesterone tự nhiên nhất
- ☐ c. Ưu tiên dùng các chế phẩm có hoạt tính genomic của progesterone mạnh nhất
- ☒ d. Ưu tiên dùng chế phẩm progestin nào thỏa đặc điểm dược lực học mong muốn

Question 10

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Flag question

10.Trong các cách dùng nội tiết ngoại sinh kể sau, cách dùng nào hiếm khi dẫn đến AUB-I?

- ☒ a. Thuốc tránh thai nội tiết phối hợp liều thấp
- ☐ b. Thuốc tránh thai uống chứa progestin đơn độc
- ☐ c. Các hệ thống phóng thích steroids tác dụng dài
- ☐ d. Thuốc tránh thai nội tiết phối hợp liều cực thấp