

Pretest TH - đề 2



Phần trắc nghiệm

Bé trai 3 tháng tuổi, khoảng 3 ngày nay bị nôn ói nhiều, nôn vọt, bú vào là nôn ra. Khi bé đến khám, điều gì quan trọng cần phải đánh giá?

- ☐ Trẻ có kèm theo sốt không
- ☐ Trẻ có chướng bụng đầy đủ không
- ☐ Trẻ có được bú mẹ hoàn toàn không
- ☒ Trẻ có mất nước không

Bé nữ 4 tuổi, bị đau bụng quanh rốn ngày thứ nhất kèm sốt 38°C, không ói, tiêu sệt 1 lần. Khám ghi nhận em tỉnh, mạch 100l/ph, nhịp thở 30l/ph, HA 90/60mmHg, tim đều, phổi không ran, bụng mềm, không điểm đau khu trú, không dấu mất nước. Hướng xử trí ban đầu là gì?

- ☐ Cho bé điều trị ngoại trú và hẹn tái khám.
- ☐ Cho xét nghiệm X quang bụng không sửa soạn.
- ☒ Cho bé nhập viện theo dõi.
- ☐ Cho bé khám thêm tại phòng khám Ngoại.



Bé An, 2 tuổi, bị tiêu chảy ngày 2. Khám thấy em bứt rứt, uống háo hức, mắt trũng, dấu véo da mất chậm. Xử trí nào là phù hợp cho bé?

- ☐ Bé không mất nước, cần bù dịch theo phác đồ A đường uống
- ☐ Bé có mất nước, cần bù dịch theo phác đồ B đường uống
- ☐ Bên cạnh bù dịch, cần phối hợp thêm kẽm, probiotics, racecadotril và diosmectite để nhanh hết bệnh
- ☐ Bé mất nước nặng, cần bù dịch theo phác đồ C đường tĩnh mạch

Triệu chứng nào sau đây giúp chẩn đoán nguyên nhân tiêu chảy hướng đến vi khuẩn?

- ☐ Sốt cao liên tục 40 độ C
- ☐ Phân lỏng nhày
- ☐ Kèm theo ho, sổ mũi
- ☐ Kèm nôn ói

Ở trẻ bị tiêu chảy cấp có mất nước, cần bù nước cho trẻ bằng loại dịch gì là tốt nhất?

- ☐ Nước chín
- ☐ Sữa mẹ
- ☐ Oresol tiêu chuẩn
- ☐ Oresol áp lực thẩm thấu thấp



Bé An 3 tuổi bị bệnh 3 ngày nay, ngày 1 bé ói 10 lần/ngày, ngày 2-3 ói giảm còn 2-3 lần/ngày nhưng xuất hiện tiêu chảy 5 lần/ngày, phân vàng lỏng không máu, kèm đau bụng nhẹ quanh rốn và sốt 38 độ C. Nguyên nhân phù hợp nhất gây ói ở bé An là gì?

- ☐ Viêm tụy cấp
- ☐ Viêm ruột thừa
- ☒ Viêm dạ dày ruột cấp
- ☐ Lỏng ruột

Bé An, 13 tháng tuổi, 10kg, đến khám vì tiêu chảy ngày 3. Bạn khám thấy bé tỉnh, mắt không trũng, uống nước được và không uống háo hức, dấu véo da mất nhanh. Bạn sẽ bù dịch như thế nào cho bé An?

- ☐ Uống nhiều nước chín
- ☒ Uống Oresol 50-100ml sau mỗi lần tiêu lỏng hoặc nôn ói
- ☐ Truyền Lactate Ringer hoặc Normal Saline
- ☐ Uống Oresol 75ml/kg trong 4 giờ

Bé 2 tháng, đến khám vì ói nhiều ngày nay, tiêu đàm máu, quấy khóc, không sốt. Khám em tỉnh, sinh hiệu ổn, không dấu mất nước, tim đều, phổi trong, bụng mềm, thóp phẳng, da niêm hồng. Cận lâm sàng nào nên làm bước đầu?

- ☐ Siêu âm bụng.
- ☐ Chưa cần làm xét nghiệm.
- ☐ Chức năng đông máu.
- ☒ Soi phân.



Trẻ tiêu chảy cấp kèm ói nhiều cần khám lại ngay khi có dấu hiệu gì?

- ☐ Ói không cải thiện sau 4 giờ
- ☐ Sốt >38 độ C
- ☐ Ăn uống kém hoặc bỏ bú
- ☐ Ói giảm nhưng tiêu chảy tăng lên

Bé 5 tháng được chẩn đoán lỵ trực trùng không mất nước. Loại thuốc nào được dùng để điều trị?

- ☐ Ciprofloxacin, zinc, ORS.
- ☐ Zinc, diosmectite, probiotics.
- ☐ Metronidazole, zinc, ORS.
- ☐ ORS, probiotics, racecadotril.

Bé 6 tháng bị tiêu chảy cấp, khám em vật vã kích thích, uống háo hức, mắt không trũng, dấu véo da mất nhanh, cân nặng trước bệnh 8kg. Lượng ORS bù cho bé là bao nhiêu?

- ☐ 1000ml
- ☐ 400 ml
- ☐ 800 ml
- ☐ 600 ml



Bệnh nhân được xem là vàng da ứ mật khi bilirubin trực tiếp là bao nhiêu nếu bilirubin toàn phần 40mg/l?

- ☐ 10 mg/l
- ☐ 12 mg/l
- ☒ 8 mg/l
- ☐ 14 mg/l

Nguyên nhân nào sau đây thường gây tiêu chảy xuất tiết?

- ☐ Uống lượng lớn sữa chứa nhiều lactose cùng một lúc trên người bị bất dung nạp lactose
- ☐ Uống thuốc xổ
- ☐ Tiêu chảy sau khi ăn nhiều dầu mỡ ở bệnh nhân viêm tụy mạn
- ☒ Tiêu chảy do tả

Dấu hiệu nào là dấu hiệu cảnh báo ở bệnh nhi đau bụng mạn?

- ☐ Đau bụng kém táo bón
- ☐ Đau bụng khi hành kinh
- ☐ Đau quanh rốn
- ☒ Đau gây thức giấc ban đêm



Triệu chứng nào sau đây được xem là có nguy cơ thất bại đường uống?

- ☒ Tiêu lỏng >2 lần trong 1 giờ
- ☐ Đau bụng
- ☐ Ho nhiều
- ☐ Sốt cao liên tục

Bé nam 8 tuổi, đau bụng thượng vị 3 tháng nay. Bé luôn cảm thấy mau no và đầy bụng sau ăn, không ói, tiêu phân bình thường, siêu âm bụng và nội soi dạ dày tá tràng bình thường. Nguyên nhân nào gây đau bụng?

- ☐ Hội chứng ruột kích thích.
- ☒ Khó tiêu chức năng.
- ☐ Trào ngược dạ dày thực quản.
- ☐ Đau bụng migraine.

Tiêu chảy do vibrio cholerae sẽ có kết quả soi phân như thế nào?

- ☐ BC (++), HC (++)
- ☒ BC (++)
- ☐ HC (++)
- ☐ BC (-), HC (-)



Vàng da tăng bilirubin gián tiếp nghi do sữa mẹ kéo dài bao lâu thì cần nhập viện?

- ☐ 8 tuần.
- ☐ 6 tuần.
- ☐ 4 tuần.
- ☒ 10 tuần.

Tiêu chảy tốc độ thải phân cao khi lượng phân bao nhiêu?

- ☐ ≥ 10 ml/kg/giờ.
- ☐ ≥ 200 ml/kg/ngày.
- ☒ ≥ 20 ml/kg/giờ.
- ☐ ≥ 100 ml/kg/ngày.

Triệu chứng quan trọng nào sau đây hướng đến bé 30 ngày tuổi bị teo đường mật bẩm sinh?

- ☐ Bú kém
- ☐ Tiểu sậm màu
- ☐ Vàng da
- ☒ Phân bạc màu

Trang 2 trong tổng số 2

[Quay lại](#)

[Gửi](#)

[Xóa hết câu trả lời](#)

Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.

Nội dung này không phải do Google tạo ra hay xác nhận. [Báo cáo lạm dụng](#) - [Điều khoản Dịch vụ](#) - [Chính sách quyền riêng tư](#)



Google Biểu mẫu

