

# ĐỀ THI LÝ THUYẾT SẢN PHỤ KHOA Y<sub>4</sub>

Lần 1, Học kỳ II, Niên khóa 2010-2011, Ngày 12.06.2011. 60 câu, thời gian làm bài 60 phút

**PHẦN I: Câu hỏi chọn một trả lời** (Thời lượng gợi ý: 15 phút)

**Từ câu 1 đến câu 20, chọn một câu đúng**

1. Về cấu tạo của ống sanh, **chọn một câu đúng nhất**
  - a. Có khẩu kính đều đặn ✗
  - b. Có hình dạng cong
  - c. Cấu tạo bằng xương
  - d. Có nhiều điểm tựa
2. So sánh chất nhầy CTC ở ngày 12<sup>th</sup> và ở ngày 16<sup>th</sup> của chu kỳ có phóng noãn ở ngày 14<sup>th</sup>, **chọn một câu đúng**
  - a. Giống nhau về tính trong suốt
  - b. Giống nhau về tính dai
  - c. Giống nhau về số lượng
  - d. Giống nhau về độ đặc
3. Cả hai steroids sinh dục là estrogen và progesterone đều có các feed-back lên tầng trên của trục, **chọn một câu đúng**
  - a. Cả hai loại steroids sinh dục đều có thể gây feed-back dương ✗
  - b. Các feed-back là hệ quả của sự giảm nồng độ steroid sinh dục lưu hành
  - c. Mọi feed-back của steroid sinh dục đều có sự tham gia của tuyến Yên
  - d. Mọi feed-back của steroid sinh dục đều có sự tham gia của Hạ đồi
4. Quan sát một trứng người 18 giờ sau khi đã xảy ra hiện tượng thụ tinh, **chọn một câu đúng**
  - a. Có thể tìm thấy 1 cực cầu trong khoảng dưới màng trong suốt ✗
  - b. Có thể tìm thấy 3 tiền nhân trong noãn bào
  - c. Có thể tìm thấy xác tinh trùng trong khoảng dưới màng trong suốt ✗
  - d. Không còn thấy tinh trùng trong bề dày của màng trong suốt ✗
5. Một thiếu nữ 14 tuổi, bắt đầu hành kinh gần 1 năm nay, thường bị trễ kinh, nguyên nhân là ..., **chọn một câu đúng**
  - a. Hoạt động chưa ổn định buồng trứng ✗
  - b. Hoạt động chưa ổn định của hạ đồi-yên
  - c. Hoạt động chưa ổn định của tử cung ✗
  - d. Hoạt động chưa ổn định của vỏ não ✗
6. So sánh hai hormon FSH và LH, **chọn một câu đúng**
  - a. Cùng là hormon được sản xuất bởi hạ đồi
  - b. Cùng được phóng thích dưới dạng xung ✗
  - c. Cùng có chung một cơ quan đích
  - d. Chuỗi beta của chúng có cấu trúc như nhau ✗
7. Liên quan đến cấu tạo và sự phát triển của phôi ở giai đoạn sớm của thai kỳ, **chọn một câu đúng**
  - a. Túi noãn hoàng là một cấu trúc ngoài phôi
  - b. Ngoại sản mạc ngăn cách xoang ngoài phôi và xoang ối
  - c. Trung sản mạc là nguồn gốc của màng ối
  - d. Nội sản mạc còn được gọi là màng đệm
8. Siêu âm sinh trắc trong 12 tuần đầu thai kỳ, diễn biến của thông số nào có dạng gần tuyến tính? **chọn một câu đúng**
  - a. Đường kính túi thai ✗
  - b. Chiều dài đầu-mông
  - c. Kích thước túi noãn hoàng ✗
  - d. Đường kính lưỡng đỉnh
9. Trong TCN I của thai kỳ, khảo sát độ dày khoảng thấu âm sau gáy (NT) là bất thường khi giá trị đo được của trị số NT  $\geq 95^{\text{th}}$  percentile, đối chiếu với ..., **chọn một câu đúng**
  - a. Số đo CRL
  - b. Số đo BPD
  - c. Tuổi thai
  - d. Tuổi mẹ
10. Trong tầm soát lệch bội, khi đọc kết quả Triple test, người ta chọn ngưỡng cắt nguy cơ tính toán là 1/250 để quyết định thực hiện thủ thuật chẩn đoán xâm lấn vì muốn làm .... **chọn một câu đúng**
  - a. Giảm bớt số thủ thuật xâm lấn phải làm
  - b. Giảm tỉ lệ âm giả của triple test
  - c. Giảm bớt số trường hợp mất thai
  - d. Giảm gánh nặng chi phí nuôi cấy tế bào



**BỘ MÔN PHỤ SẢN**

11. Khi phân tích biểu đồ theo dõi chuyển dạ (Sân đồ), model của WHO, **chọn một câu đúng**
- Một biểu đồ ở bên trái đường báo động xác định một cuộc chuyển dạ bình thường
  - Một biểu đồ ở bên phải đường báo động dự báo một cuộc chuyển dạ bất thường
  - Một biểu đồ chạm đường hành động thể hiện một cuộc chuyển dạ kéo dài
  - ☒ Một biểu đồ vượt sang bên Phải đường hành động đòi hỏi phải có một quyết định
12. Ở tuyến huyện. Một sản phụ có sản đồ ở bên phải đường báo động. Cần thực hiện ... **chọn một hành động đúng**
- Đánh giá lại cơn co tử cung. Tăng co oxytocin nếu cần
  - Đánh giá lại tình trạng đầu ối. Tia hoặc phá ối nếu cần
  - Đánh giá lại diễn tiến của cổ tử cung và ngôi sau 2 giờ
  - ☒ Chuyển ngay sản phụ lên tuyến có khả năng phẫu thuật
13. Về cơ chế của hiện tượng xóa mờ cổ tử cung và thành lập đoạn dưới, **chọn một câu đúng nhất**
- Cổ tử cung trở nên mỏng dần dưới tác động nong cổ tử cung của ngôi thai
  - ☒ Các thành phần của kênh tử cung sẽ chuyển thành thành phần của đoạn dưới
  - Cổ tử cung mờ dần do tác động của sự co của các thớ cơ dọc thân tử cung
  - Hiện tượng thành lập đoạn dưới hoàn tất vào cuối giai đoạn Hai của chuyển dạ
14. Một thai phụ đang ở trong giai đoạn Hai của chuyển dạ, cần phải ... **chỉ ra một hành động đúng**
- Theo dõi tim thai liên tục, ít nhất là phải nghe lại tim thai sau mỗi cơn co
  - Hướng dẫn và chỉ huy thai phụ rặn tích cực kể từ khi cổ tử cung mở trọn
  - Khi cần, người đỡ đẻ có thể hỗ trợ bằng một lực tác động lên đáy tử cung
  - ☒ Có thể kích thích cảm giác mát rịn bằng cách dùng tay đè vào trực tràng
15. Khi thực hiện phết mỏng cổ tử cung (PMCTC), phải lấy được tế bào tuyến cổ trong vì .... **chọn một câu đúng**
- Ung thư cổ tử cung có thể xuất phát từ cổ tử cung ngoài hoặc từ kênh cổ tử cung
  - Soi cổ tử cung, nếu được thực hiện sau đó, không thể quan sát được kênh cổ tử cung
  - ☒ Lấy được tế bào cổ trong cũng có nghĩa là đã lấy được tế bào của vùng chuyển tiếp
  - Thường gặp bất thường của tế bào tuyến hơn là bất thường của tế bào biểu mô lát
16. Đọc kết quả PMCTC theo hệ thống Bethesda. Kết quả nào trong các kết quả sau là bất thường? **chọn một câu đúng**
- Tế bào biến đổi viêm
  - Tế bào chuyển sản
  - ☒ Tế bào gai không điển hình
  - Tế bào biến đổi lành tính
17. Ethinyl Estradiol trong thuốc tránh thai, có thể làm tăng nguy cơ ... so với không dùng thuốc, **chọn một câu đúng**
- Mắc ung thư cổ tử cung
  - ☒ Thuyên tắc mạch
  - Tiểu đường type II
  - Ung thư buồng trứng
18. Khi kê toa tránh thai khẩn cấp bằng progestogen, cần tư vấn cho người dùng về nguy cơ.... **chọn một câu đúng**
- Đễ gây thai ngoài tử cung hơn phương pháp khác
  - Có thai ngoài ý muốn cao hơn phương pháp khác
  - Khả năng thai bị dị tật cao hơn phương pháp khác
  - Tác dụng phụ thường thấy hơn phương pháp khác
19. Khi thực hiện tư vấn tránh thai bằng dụng cụ tử cung chứa đồng, cần lưu ý đến .... **chọn một câu đúng**
- ☒ Rong huyết và đau bụng là hai tác dụng phụ thường gặp nhất khi tránh thai bằng DCTC chứa đồng
  - Tần suất bị thai ngoài tử cung khi đang mang DCTC tăng cao hơn so với tần suất này trong dân số chung
  - Tần suất bị vô sinh thứ phát sau khi đã tháo DCTC tăng cao hơn so với tần suất này trong dân số chung
  - Tần suất có Pap test bất thường khi đang mang DCTC tăng cao hơn so với tần suất này trong dân số chung
20. Thanh cây phóng thích chậm progestogen tránh thai có thể làm giảm nguy cơ ... so với dân số không dùng thanh cây, **chọn một câu đúng**
- Tân sinh trong biểu mô cổ tử cung
  - Tiểu đường không lệ thuộc insulin
  - Tân sinh của nội mạc tử cung
  - ☒ Đột quỵ và thuyên tắc mạch máu

**Từ câu 21 đến câu 26, chọn một câu sai**

21. Ở tuần thứ 12 vô kinh của một thai kỳ bình thường, cần thực hiện .... **chọn một hành động sai**
- Tổng soát lại các vấn đề nội khoa của thai phụ
  - Tổng soát lại tình trạng huyết thanh về các bệnh nhiễm trùng
  - ☒ Thực hiện tiêm phòng cho thai phụ chưa có miễn dịch
  - Đánh giá nguy cơ lệch bội của bào thai



BỘ MÔN PHỤ SAN

22. Ở tuần thứ 22 vô kinh của một thai kỳ bình thường, cần thực hiện ..., *chọn một hành động sai*
- Test dung nạp đường huyết với 50<sup>gr</sup> hoặc 75<sup>gr</sup> Glucose
  - Siêu âm hình thái học thai với máy 2D, 3D hoặc 4D
  - Ghi biểu đồ tim thai-con co bằng máy (CTG / EFM)
  - Tiêm phòng VAT nếu thai phụ chưa được tiêm đầy đủ
23. Ở tuần thứ 32 vô kinh của một thai kỳ bình thường, cần thực hiện việc đánh giá ..., *chọn một hành động sai*
- ... diễn biến các trị số sinh trắc bằng cách đánh dấu chúng lên biểu đồ tăng trưởng
  - ... toàn diện tình trạng của bánh nhau gồm vị trí bám, độ trưởng thành, cấu trúc
  - ... tình trạng nước ối bằng chỉ số (AFI) hoặc độ sâu xoang ối lớn nhất (SDP)
  - ... tình trạng thai bằng siêu âm Doppler khảo sát trở kháng ĐMR và ĐMNG
24. Ở tuần thứ 42 vô kinh của một thai kỳ có diễn tiến cho đến nay bình thường, cần làm ..., *chọn một hành động sai*
- Hướng dẫn cách đếm cử động thai, khuyên nhập viện nếu có bất thường như giảm cử động thai
  - Thực hiện Non-stress test lượng giá sức khỏe thai và test khác nếu non-stress test bất thường
  - Siêu âm khảo sát sinh trắc, thể tích nước ối bằng chỉ số ối hoặc độ sâu xoang ối lớn nhất
  - Xem lại các tư liệu khám thai, các căn cứ xác định tuổi thai, các dữ kiện xác định tuổi thai
25. Khi tư vấn thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ, nên khuyên sản phụ ..., *chọn một hành động sai*
- Đề da trẻ tiếp xúc với da mẹ sớm
  - Cho trẻ ngậm bắt vú sớm
  - Vắt bỏ sữa thừa còn lại trong vú sau bữa bú
  - Không nên cho trẻ bú ở tư thế nằm
26. Trong trường hợp sản phụ buộc phải thực hiện việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa công thức, có nghĩa là bà ta có chống chỉ định nuôi con bằng sữa mẹ, nên khuyên bà ta ..., *chọn một hành động sai hoặc không hợp lý*
- Cho trẻ ăn bằng cốc và thìa (ly và muỗng)
  - Cho con bú theo giờ
  - Cho con bú theo nhu cầu
  - Không nên pha loãng sữa

**PHẦN 2: Câu hỏi chọn nhiều trả lời (Thời lượng gợi ý: 15 phút)**

Từ câu 27 đến câu 40,

Đánh dấu vào A nếu bạn chọn (1) và (2)

Đánh dấu vào B nếu bạn chọn (1) và (3)

Đánh dấu vào C nếu bạn chọn (2) và (3)

Đánh dấu vào D nếu bạn chọn cả (1), (2) và (3)

Đánh dấu vào E nếu bạn không chọn bất cứ phương án nào

27. Trong các yếu tố sau đây, những yếu tố nào có thể gây trở ngại cho hiện tượng lọt của ngôi, *chọn các câu đúng*
- Vòm vệt thấp
  - Góc vệt hẹp
  - Đầu thai ngửa
28. Hiện tượng bình chính của ngôi chòm có thể bị ảnh hưởng trong các trường hợp ..., *chọn các câu đúng*
- Khung chậu hẹp
  - Thai to
  - Không phá ối
29. Ngôi chòm có thể lọt ở kiểu thể chằm chậu phải sau trong các trường hợp ..., *chọn các câu đúng*
- Khung chậu dạng nam
  - Khung chậu dạng hầu
  - Khung chậu dạng bẹt
30. Trong các yếu tố sau đây, những yếu tố nào đã gây nên hiện tượng xoay trong của ngôi, *chọn các câu đúng*
- Cấu trúc của ống sanh
  - Trở kháng của đường sanh
  - Hình dạng của ngôi thai
31. Ngôi chòm có thể sẽ xoay trong 45° ngược chiều kim đồng hồ trong các kiểu thể lọt ..., *chọn các câu đúng*
- Chằm Chậu Trái Trước
  - Chằm Chậu Phải Trước
  - Chằm Chậu Phải Sau



32. Trong các yếu tố sau đây, những yếu tố nào đã gây nên hiện tượng xoay ngoài của ngôi, **chọn các câu đúng**
1. Cấu trúc của ống sanh
  2. Trờ kháng của đường sanh
  3. Hình dạng của ngôi thai
33. Trong TCN II, siêu âm sinh trắc chu vi bụng có giá trị cao hơn đường kính ngang bụng. **Chọn ~~sai~~ giải thích đúng**
1. Vì phép đo đường kính được lặp lại vô số lần
  2. Vì bụng thai nhi không có dạng đường tròn đều
  3. Vì sai số chung là tích của các sai số sẽ rất nhỏ
34. Trong TCN III, siêu âm khảo sát thể tích nước ối ..., **chọn các câu đúng**
1. Đo chỉ số ối thường được dùng kết hợp với Non-stress test để đánh giá sức khỏe thai
  2. Đo chỉ số ối có độ nhạy cao. Đo độ sâu xoang ối lớn nhất có độ chuyên biệt cao
  3. Thể tích nước ối có xu hướng giảm dần trong tháng cuối cùng của thai kỳ
35. Trong chuyển dạ, tình huống nào có khả năng gây nhịp giảm muộn trên băng ghi CTG ..., **chọn các câu đúng**
1. Mẹ đang lên cơn suyễn (hen)
  2. Mẹ có nồng độ Hb% thấp
  3. Có rối loạn cơn co cường tính
36. Định lượng  $\beta$ -hCG máu sẽ giúp chúng ta xác định được ..., **chọn các câu đúng**
1. Vị trí làm tổ của túi thai
  2. Tính sinh tồn của thai
  3. Đa thai hay đơn thai
37. Khi thực hiện khảo sát CA<sub>125</sub>, cần lưu ý ..., **chọn các câu đúng**
1. CA<sub>125</sub> có thể tăng trong nhiều tình trạng sinh lý như đang có kinh, đang có thai, viêm tụy cấp...
  2. CA<sub>125</sub> có thể tăng trong K buồng trứng cũng như tình trạng lành tính như lạc nội mạc tử cung ...
  3. Độ chuyên biệt, độ nhạy cảm, giá trị dự báo dương, giá trị dự báo âm của CA<sub>125</sub> đều không cao
38. So sánh 3 tác nhân gây viêm âm đạo thường gặp - Candida, Trichomonas và Bacterial vaginosis, **chọn các câu đúng**
1. Trong cả 3 loại, chỉ có viêm âm đạo do Candida là được xem như là bệnh lây qua đường tình dục
  2. Trong cả 3 loại, chỉ có viêm âm đạo do vi khuẩn là có triệu chứng ngứa nhiều và đặc trưng nhất
  3. Trong cả 3 loại, chỉ có viêm âm đạo do Trichomonas là không đòi hỏi điều trị cho người phối ngẫu
39. Tình huống nào trong các tình huống sau có thể dẫn đến vỡ kế hoạch khi đang tránh thai ..., **chọn các câu đúng**
1. Uống kháng sinh mạnh, kéo dài khi đang uống thuốc tránh thai nội tiết Estro-Progestatif phối hợp
  2. Dùng kháng viêm khi đang tránh thai với dụng cụ tử cung phóng thích progestogen chậm "Mirena"
  3. Dùng chất bôi trơn nền dầu khi đang tránh thai với bao cao su
40. Bạn nên khuyên người phụ nữ dùng thêm 1 biện pháp tránh thai khẩn cấp trong tình huống ..., **chọn các câu đúng**
1. Vỡ / tuột bao cao su quanh ngày rụng trứng
  2. Quên uống thuốc tránh thai 2 ngày liên tục
  3. Người phụ nữ bị cương bức tình dục

**PHẦN 3: Câu hỏi chọn một trả lời theo tình huống (Thời lượng gợi ý: 20 phút)**

Từ câu 41 đến 52, bạn có 4 tình huống lâm sàng

Tình huống (1) câu 41-42-43

Tình huống (2) câu 44-45-46

Tình huống (3) câu 47-48-49

Tình huống (4) câu 50-51-52


Có 3 câu hỏi cho mỗi tình huống. Tùy theo yêu cầu, mỗi câu hỏi bạn sẽ chọn một hay nhiều lựa chọn để trả lời

**Tình huống 1:**

Một thai phụ 29 tuổi, PARA 0000, thai 39 tuần vô kinh, chuyển dạ sanh. Thai kỳ bình thường. Cao 150<sup>cm</sup>, BCTC 32<sup>cm</sup>, ngôi chòm, ước lượng trọng lượng thai khoảng 3<sup>kg</sup>. Chuyển dạ được ghi chép trên sản đồ.

41. Nghĩ đến khả năng nào trong các khả năng sau? **chọn một câu đúng**

- a. Chuyển dạ kéo dài
- b. Chuyển dạ bị tắc nghẽn
- c. Nguyên nhân không cơ học
- d. Nghiệm pháp lọt thất bại





42. Can thiệp nào là hợp lý trong các can thiệp sau? **chọn một câu đúng**

- a. Tăng co bằng oxytocin
- b. Giúp sanh bằng dụng cụ
- ☒ c. Mổ lấy thai
- d. Chưa can thiệp, chờ thêm

43. Nếu được xử trí đúng, nguy cơ lớn nhất của cuộc sanh là gì? **chọn một câu đúng**

- a. Băng huyết sau sanh do vỡ tử cung
- ☒ b. Băng huyết sau sanh do đờ tử cung
- c. Nhiễm trùng hậu sản và sơ sinh
- d. Đường dò tiết niệu-sinh dục

**Tình huống 2:**

Một phụ nữ 29 tuổi, PARA 0000, đến khám vì trễ kinh 1 tuần, rong huyết từ 2 ngày nay. Chu kỳ kinh không đều 30-35 ngày. Tiền sử nội-ngoại khoa không gì đặc biệt. Không áp dụng biện pháp tránh thai nào.

Khi trễ kinh 1 ngày, thử hCG quick-stick, kết quả âm tính

Ngày ra huyết, thử hCG quick-stick thấy hiện lên 2 vạch đỏ

Ngày hôm nay, thử  $\beta$ -hCG định lượng trong máu = 100 mIU/mL

Siêu âm hôm nay không thấy hình ảnh túi thai trong tử cung cũng như không có hình ảnh gợi ý thai ngoài tử cung

Khám lâm sàng thấy ra huyết từ cổ tử cung rất ít, nâu đen. Tử cung hơi to. Không bất thường ở 2 phần phụ.

44. Bạn nghĩ đến khả năng nào trong các khả năng sau? **chọn một câu đúng**

- a. Thai trong tử cung
- b. Thai ngoài tử cung
- c. Thai chưa xác định vị trí
- d. Thai đã sảy

45. Ngày hôm nay, bạn sẽ đề nghị làm gì cho bệnh nhân? **chọn một giải pháp hợp lý nhất**

- a. Cho bệnh nhân nhập viện để theo dõi thêm
- ☒ b. Không làm gì cả, chỉ theo dõi ngoại trú
- c. Cho thuốc đường thai vì có thai ra huyết âm đạo
- d. Quyết định can thiệp thủ thuật / phẫu thuật

46. Nếu bạn chưa quyết định can thiệp thủ thuật / phẫu thuật, bạn sẽ đề nghị làm gì cho bệnh nhân? **chọn một câu đúng**

- a. Định lượng lại  $\beta$ -hCG máu sau hai ngày
- b. Thực hiện thêm siêu âm Doppler màu
- ☒ c. Hẹn khám đánh giá lại diễn biến lâm sàng
- d. Thực hiện lại siêu âm ngả âm đạo sau 2 ngày



**Tình huống 3:**

Đây là hai trứng [A] và [B] mà người ta đã quan sát ở giờ thứ 18 sau khi thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

Hình ảnh [A] và [B] thu được từ 2 phương pháp khác nhau.

Phương pháp thứ nhất là quá trình thụ tinh tự nhiên bằng cách để tinh trùng tiếp xúc với trứng.

Phương pháp thứ nhì là tiêm trực tiếp 1 tinh trùng vào bào tương trứng.



47. Trứng nào đã có thụ tinh bất thường? **chọn một câu đúng**

- a. Trứng [A] đã xảy ra hiện tượng thụ tinh bất thường
- ☒ b. Trứng [B] đã xảy ra hiện tượng thụ tinh bất thường
- c. Cả hai trứng đều đã xảy ra hiện tượng thụ tinh bất thường
- d. Không trứng nào có biểu hiện thụ tinh bất thường

48. Trứng nào đã được thụ tinh bằng cách tiêm tinh trùng vào bào tương trứng? **chọn một câu đúng**

- ☒ a. Trứng [A] đã được thụ tinh bằng cách tiêm tinh trùng vào bào tương trứng
- b. Trứng [B] đã được thụ tinh bằng cách tiêm tinh trùng vào bào tương trứng
- c. Cả hai trứng đều được thụ tinh bằng cách tiêm tinh trùng vào bào tương trứng
- d. Không trứng nào được thụ tinh bằng cách tiêm tinh trùng vào bào tương trứng

49. Bạn sẽ chuyển trứng đã thụ tinh vào buồng tử cung. Bạn sẽ chuyển phôi từ trứng nào? **chọn một câu đúng**

- ☒ a. Phôi từ trứng [A]
- b. Phôi từ trứng [B]
- c. Cả 2 phôi
- d. Không chuyển phôi nào



**Tình huống 4:**

Một phụ nữ 39 tuổi, PARA 2002, đến khám vì tiết dịch âm đạo bất thường tái phát nhiều lần kèm ngứa âm hộ và giao hợp đau. *Candida*  
Cao huyết áp từ ba năm nay. Hen phế quản kinh niên. Viêm xoang sàng mạn. Chu kỳ kinh thưa, không đều. Bà ta có BMI = 29  
Khám mô vết thấy có huyết trắng đục thành từng mảng bám chặt vào thành âm đạo. Thành âm đạo khô, đỏ rực.  
Khi thực hiện soi và nhuộm gram huyết trắng thấy hình ảnh như hình bên.



50. Bạn nghĩ đến khả năng nào trong các khả năng sau? **chọn một câu đúng**
- ☒ a. Viêm âm đạo do Candida albicans
  - b. Viêm âm đạo do Trichomonas vaginalis
  - c. Viêm âm đạo do Bacterial vaginosis
  - d. Viêm âm đạo do tác nhân không đặc hiệu
51. Bệnh nhân này bị viêm âm đạo tái phát nhiều lần, bạn phải làm gì để tránh tái phát? **chọn các câu đúng**
- ☒ a. Điều trị đợt cấp và điều trị duy trì
  - ☒ b. Xét nghiệm đường huyết
  - ☒ c. Hỏi chi tiết về điều trị hen phế quản
  - ☒ d. Hỏi chi tiết về điều trị viêm xoang
52. Bạn có điều trị cho chồng của bệnh nhân không? **chọn một câu đúng**
- ☒ a. Không cần điều trị cho chồng
  - b. Điều trị cho chồng chỉ trong lần này
  - c. Điều trị cho chồng mỗi khi tái phát
  - d. Điều trị cho chồng mỗi khi điều trị cho vợ

**PHẦN 4: Điền khuyết** (Thời lượng gợi ý: 10 phút)

**Từ câu 53 đến 60, hãy chọn một trong các lựa chọn cho trước để điền vào các khoảng trống. Lưu ý mỗi lựa chọn chỉ được dùng một lần**

**Câu 53-56: Phân đoạn 1:**

- a. Sinh tồn trứng
- b. Bất thường nhiễm sắc thể
- c. Bất thường xâm nhập của nguyên bào nuôi vào thành mạch
- d. Bất thường bệnh học nguyên bào nuôi

hCG là một nội tiết mà việc định lượng nó có nhiều ứng dụng trong sản khoa. Đầu và giữa tam cá nguyệt thứ 1<sup>st</sup>, người ta thường định lượng hCG khi nghi ngờ có ... (53) ... . Cuối tam cá nguyệt thứ 1<sup>st</sup> là thời điểm mà định lượng hCG thường được dùng để khảo sát ... (54) ... . Đầu tam cá nguyệt thứ 2 là thời điểm định lượng hCG có giá trị trong dự báo ... (55) ... . Tuy nhiên, việc định lượng hCG có ý nghĩa rất thấp trong dự báo ... (56) ...

**Câu 57-60: Phân đoạn 2:**

- a. Số đo đường kính lưỡng đỉnh
- b. Số đo chu vi vòng bụng
- c. Số đo đường kính ngang bụng
- d. Số đo chiều dài các xương dài

Một trong các mục tiêu quan trọng của khám thai trong tam cá nguyệt thứ 3<sup>rd</sup> là khảo sát tăng trưởng bào thai. Khảo sát này dựa trên số liệu sinh trắc thai nhi. Trong đó, dữ kiện nhạy cảm nhất khi có bất thường tăng trưởng bào thai là ... (57) .... So với ... (58) ... dữ kiện được nêu đầu tiên này ít phạm phải những sai số của phép đo hơn. Khi có bất thường nhiều hơn trong tăng trưởng thì ... (59) ... sẽ bị ảnh hưởng. ... (60) ... bị ảnh hưởng muộn nhất, và thường quan sát thấy trong tình trạng có chậm tăng trưởng không đối xứng của bào thai.