

THU: green

MCQ Questions

Câu hỏi

- Khi phát hiện có sa dây rốn, yếu tố nào có là điều kiện tiên quyết để định hướng can thiệp?
 - Ngôi thai là ngôi chỏm hay khác ngôi chỏm
 - Các đặc điểm biến động tim thai trên EFM
 - Có thể sanh ngả âm đạo tức thì hay không
 - ☒ Tình trạng thai còn sống hay đã chết
- Một thai phụ có **chuyển dạ kéo dài**. Ngay sau sổ thai, sản phụ rơi ngay vào tình trạng sốc, nhau chưa sổ, không chảy máu ra ngoài. Trước tiên phải nghĩ đến khả năng nào?
 - ☒ Sốc giảm thể tích
 - Sốc nhiễm trùng
 - Sốc thần kinh X
 - Thuyên tắc ối
- Khi thực hiện VBAC, cần tôn trọng tuyệt đối nguyên tắc nào?
 - Việc dùng oxytocin để tăng co trong chuyển dạ bị chống chỉ định tuyệt đối

Thời gian còn lại

0:9:28


 Số báo danh
20190310_77475

SUBMIT

IF AT				
C1	X	X	X	★ 0
C2	★	B	C	D 4
C3	X	★	C	D 2
C4	X	X	★	D 1
C5	X	X	★	D 1
C6	★	B	C	D 4
C7	X	X	★	D 1
C8	X	★	C	D 2
C9	X	X	X	★ 0
C10	X	★	C	D 2
SCORE:17				



☒ B. Chỉ chấp nhận VBAC nếu lần phẫu thuật trên tử cung trước đó là mổ sanh

C. Gây tê ngoài màng cứng giảm đau sản khoa bị chống chỉ định tuyệt đối

D. Phải cố gắng giữ cho sản đồ không vượt qua bên phải của đường báo động

4 Vì sao siêu âm qua đường âm đạo cải thiện độ tin cậy của chẩn đoán nhau tiền đạo?

A. Độ phân giải tín hiệu tốt do dùng sóng âm tần số cao

B. Ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố vật lý cản trở truyền âm

☒ C. Quan sát rõ điểm mốc xác định vị trí tiền đạo của nhau

D. Tránh được việc dùng một yếu tố trung gian là bàng quang

5 Khi có chảy máu trong nhau tiền đạo, yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến quyết định can thiệp?

A. Tuổi thai hiện tại

B. Tình trạng chuyển dạ

☒ C. Mức độ chảy máu

IF AT					
C1	X	X	X	★	0
C2	★	B	C	D	4
C3	X	★	C	D	2
C4	X	X	★	D	1
C5	X	X	★	D	1
C6	★	B	C	D	4
C7	X	X	★	D	1
C8	X	★	C	D	2
C9	X	X	X	★	0
C10	X	★	C	D	2
SCORE:17					

D. ☐ Tình trạng suy thai

6 Nhau bong non với biến chứng rối loạn đông máu, điều trị quan trọng nhất là gì?

- ☒ A. Lấy thai ra
- ☐ B. Heparin
- ☐ C. Tranexamic acid
- ☐ D. ϵ -aminocaproic acid

7 Khi nghi ngờ có nhau bong non nhưng chưa xác lập được chẩn đoán, dữ kiện nào là quan trọng nhất trong theo dõi?

- ☐ A. Theo dõi màu nước ối, ra huyết
- ☐ B. Theo dõi biến đổi sinh hiệu
- ☒ C. Electronic Fetal monitoring
- ☐ D. Siêu âm lặp lại nhiều lần

8 Vì sao WHO khuyến cáo tránh dùng prostaglandin E1 như là biện pháp đầu tay trong điều trị băng huyết sau sanh do đờ tử cung?

- ☐ A. Vì tính hiệu quả thấp
- ☒ B. Vì có nhiều tác dụng phụ
- ☐ C. Vì bị hạn chế về đường dùng

IF AT					
C1	X	X	X	★	0
C2	★	B	C	D	4
C3	X	★	C	D	2
C4	X	X	★	D	1
C5	X	X	★	D	1
C6	★	B	C	D	4
C7	X	X	★	D	1
C8	X	★	C	D	2
C9	X	X	X	★	0
C10	X	★	C	D	2
SCORE:17					

D. ☐ Vì thời gian duy trì tác dụng ngắn

9 Yếu tố nào cho phép đánh giá tính hiệu quả của can thiệp bù thể tích trong bảng huyết sau sanh?

- A.** ☐ Duy trì được áp lực tĩnh mạch trung tâm
B. ☐ Duy trì được dung tích huyết cầu tối thiểu
C. ☐ Duy trì được cung xuất nước tiểu tối thiểu
D. ☒ Khôi phục được trị số mạch và huyết áp

10 Khi buộc phải chỉ định can thiệp phẫu thuật cho một trường hợp băng huyết sau sanh do đờ tử cung thất bại với điều trị nội khoa, biện pháp nào là ưu tiên?

- A.** ☐ Chèn bóng vào buồng tử cung
B. ☒ Phẫu thuật thắt động mạch tử cung
C. ☐ Phẫu thuật may chèn ép theo B-Lynch
D. ☐ Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị

IF AT					
C1	X	X	X	★	0
C2	★	B	C	D	4
C3	X	★	C	D	2
C4	X	X	★	D	1
C5	X	X	★	D	1
C6	★	B	C	D	4
C7	X	X	★	D	1
C8	X	★	C	D	2
C9	X	X	X	★	0
C10	X	★	C	D	2
SCORE:17					