

Câu hỏi

Thời gian còn lại

0:29:11



Số báo danh

20170116_18290

SUBMIT

1 TÌNH HUỐNG 1: TẦM SOÁT

Bà S., 35 tuổi, độc thân, đến khám vì muốn được thực hiện tầm soát ung thư vú. Mẹ ruột của bà S. đã mất vì ung thư vú. Chị ruột của bà S. cũng đã được phẫu thuật ung thư tuyến thanh dịch của buồng trứng.

Bà S. cao 158 cm, nặng 52 kg, mặc áo ngực size nhỏ (cup A). Chu kỳ kinh rất đều. Hiện tại mới vừa sạch kinh.

Bà S. vừa được siêu âm vú, với kết quả âm tính với tổn thương tuyến vú.

Bạn sẽ nói gì với bà S.? Chọn hai câu đúng

- A.** ☐ Đã có chỉ định khảo sát đột biến BRCA
- B.** ☐ Khảo sát đột biến BRCA có thể là cần thiết, nhưng không có ý nghĩa quyết định
- C.** ☐ Khảo sát đột biến BRCA là không cần thiết, nhưng nếu có thực hiện thì cũng có ý nghĩa nhất định
- D.** ☐ Hiện tại chưa có chỉ định thực hiện tầm soát ung thư vú. Khuyến cáo bà S. tự khám vú định kỳ là thích hợp
- E.** ☐ Hiện tại, trong trường hợp cụ thể của bà S., siêu âm là phương tiện sẽ được dùng để thực hiện tầm soát định kỳ
- F.** ☐ Hiện tại, trong trường hợp cụ thể của bà S., MRI / nhũ ảnh là phương tiện sẽ được dùng để thực hiện tầm soát định kỳ
- G.** ☐

2 TÌNH HUỐNG 2: IMPLANON

Bà T., 27 tuổi, PARA 1001, đến khám vì căng đau tuyến vú khi đang tránh thai bằng que cấy implant phóng thích etonogestrel.

Bà T. vừa đặt que cấy được 3 tháng. Cảm thấy đau căng tức vú chỉ mới vài tuần gần đây. Không triệu chứng cơ năng nào khác.

Khám thấy 2 vú bình thường. Siêu âm không phát hiện thấy bất thường ở vú.

Bạn nhận định ra sao và sẽ làm gì cho bà T.? Chọn hai câu đúng

- A.** ☐ Bà T. đang có dấu hiệu của tình trạng cường progesterone
- B.** ☐ Bà T. đang có dấu hiệu của tình trạng cường estrogen
- C.** ☐ Bà T. đang có dấu hiệu của buồng trứng bị ức chế quá mức do que cấy

IF AT								
C1	A	B	C	D	E	F	G	0
C2	A	B	C	D	E	F	G	0
SCORE: 0								

etonogestrel (thiếu cả estrogen lẫn progesterone)

D. ☐ Tư vấn, giải thích rõ cơ chế đau vú để bà T. an tâm và hoặc dùng giảm đau với paracetamol hay NSAIDs.

E. • Dùng progesterone tại chỗ dạng kem bôi vú

F. ● Dùng tamoxifene (SERM) đường uống

G.

IF AT								
C1	A	B	C	D	E	F	G	0
C2	A	B	C	D	E	F	G	0
SCORE: 0								