

### **NHI KHOA 1 (PEDIATRICS 1)**

Dashboard ► My courses ► NK1 ► THẬN NIỆU ► Pretest CBL Thận 11092019

#### Question 1

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Bất thường nào sau đây không phải là tác dụng phụ của corticoide?

#### Select one:

- a. Dễ nhiễm trùng
- b. Chậm phát triển chiều cao
- o. Rối loạn tâm thần
- od. Viêm bàng quang xuất huyết của cyclophosphamide

#### Question 2

Not yet

answered

Marked out of 1.00

Bệnh nhi nam 5 tuổi, cân nặng 26kg, nhập viện vì phù toàn thân 2 ngày nay. Bệnh nhân có HA: 90/60 mmHg, creatinin máu 0,8 mg/dl, tổng phân tích nước tiểu thấy c<mark>ó protein +++, Ery +.</mark> Chẩn đoán nào dưới đây là phù hợp nhất?

- a. Viêm cầu thận cấp hậu nhiễm liên cầu trùng
- b. Nhiễm trùng tiểu trên
- c. Hội chứng thận hư
- d. Viêm cầu thận tiến triển nhanh

## Question 3 Not yet answered Marked out of

Marked out of 1.00

- a. Staphylococus aureus
- b. Staphylococcus coagulase negative
- c. Streptococcus pneumoniae
- d. Pseudomonas aeruginosa

#### Question 4

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Chỉ định sinh thiết thận trong HCTH trẻ em, câu nào sau đây đúng?

Select one:

- AB là sinh thiết của VCTC cấp
- a. Tiểu máu đại thể quá 3 tuần không hết
- b. Tăng huyết áp quá 2 tuần
- c. C3, C4 giảm
- d. Đạm niệu vượt ngưỡng thận hư

#### Question **5**

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Chỉ định sinh thiết thận trong viêm cầu thận cấp là gì? Chọn câu sai:

#### Select one:

- a. Tiểu máu đại thể kéo dài quá 3 tuần
- b. C3 không trở về bình thường sau 8 tuần
- c. Huyết áp cao kéo dài trên 1 tuần tiểu máu đại thể, THA, tiểu ít 1-2w

d. Suy thận cấp

#### Question **6**

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Điều trị cần thiết nhất cho bệnh nhân bị viêm cầu thận cấp hậu nhiễm trùng là gì?

- a. Giảm phù
- b. Kiểm soát huyết áp
- c. Kháng sinh diệt liên cầu
- d. Prednisone

Not yet

answered

Marked out of 1.00

Đinh nghĩa một trường hợp HCTH kháng corticoide là gì?

vàng (âm tính) Select one: xanh -> dương tính

- a. Que nhúng nước tiểu màu xanh sau điều trị corticoide 8 tuần
- b. Tái phát 2 lần khi đang điều tri corticoide hay ngưng thuốc chưa quá 14 ngày lệ thuộc corti
- c. Tái phát 2 lần trong thời gian 6 tháng 6 tháng đầu -> TP thường xuyên
- d. Tái phát khi ngưng corticoide

#### Question 8

Not yet

answered

Marked out of 1.00

Đinh nghĩa một trường hợp HCTH lệ thuộc corticoide là gì?

#### Select one:

- a. Không lui bênh hoàn toàn dù đã điều tri corticoide quá 8 tuần
- b. Tái phát 2 lần khi đang điều trị corticoide hay ngưng thuốc chưa quá 14 ngày
- c. Tái phát 2 lần trong thời gian 6 tháng
- d. Tái phát 4 lần trong một năm

#### Question 9

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Định nghĩa trường hợp HCTH lui bệnh hoàn toàn (complete remission) là gì?

#### Select one:

diptick âm tính or vết => có nghĩa < 1+

- a. Bệnh nhi hết phù và protein niệu trên dipstick < 1+ trong 3 ngày liên tiếp
- b. Bệnh nhi còn phù rất nhẹ và đạm niệu/creatinin niệu > 2mg/mg
- c. Bệnh nhi hết phù và đạm niệu/creatinin niệu >2 (mg/mg) 3 ngày liên tiếp
- d. Bệnh nhi hết phù và que thử nước tiểu chuyển sang màu xanh 3 ngày liên tiếp

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Hội chứng thận hư nguyên phát trẻ em, sang thương xơ hóa cục bộ từng phần chiếm tỉ lệ bao nhiều?

#### Select one:

- a. 15 20%
- b. 10 20%
- o. 5 7%
- o d. 7 10%

#### Question 11

Not yet

answered

1.00

Marked out of

Một bé trai 8 tuổi bị hội chứng thận hư sang thương tối thiểu, nhập viện vì đau bụng, sốt, ấn đau khắp bụng, kèm theo nước tiểu có protein 3+. Xét nghiệm máu: Bạch cầu (BC): 20 000/mm3, đa nhân trung tính chiếm 80%. Bệnh nhi đã được chọc dò dịch ổ bụng, kết quả: BC: 2300/mm3, cấy chưa có kết quả. Tác nhân gây bệnh thường gặp nhất là tác nhân nào sau đây?

#### Select one:

- a. Candida albicans
- b. Streptococcus pneumonia
- c. Escherichia coli
- d. Staphylococcus aureus

#### Question 12

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Một trẻ trai 4 tuổi tiền sử khỏe mạnh, đến khám vì phù toàn thân, xét nghiệm: máu: Albumin: 1.8 g/l, Creatinin: 0.8mg/dl, Nước tiểu: Pro 3+, Blood: +. Nguyên nhân thường gặp nhất gây ra tình trạng này là gì?

- a. Hội chứng thận hư nguyên phát sang thương tối thiểu (Minimal change disease)
- b. Xơ hóa cầu thận cục bộ khu trú từng vùng (FSGS)
- o. Bệnh cầu thận màng (Membranous neuphropathy)
- d. Viêm thận do Lupus (Lupus Nephritis)

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Sang thương cầu thận tối thiểu khi quan sát trên kính hiển vi quang học sẽ thấy hình ảnh nào sau đây?

#### Select one:

- a. Dày nhẹ màng đáy, không có tăng sinh tế bào
- b. Tăng sinh tế bào trung mô
- c. Các tế bào chân bì dẹp xuống



d. Các cầu thận bình thường

#### Question 14

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Tác nhân nào sau đây không phải là nguyên nhân gây ra hội chứng thận hư?

#### Select one:

- o a. Viêm gan siêu vi B, C
- b. Giang mai
- oc. Sởi
- od. HIV

#### Question 15

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Thuốc được ưa chuộng nhất hiện nay trong HCTH kháng corticoid ở trẻ em là gì?

#### Select one:

- a. Cyclophosphamide =>lê thuộc
- b. Levamisole



c. Cyclosporine

d. Methylprednisone

# Question 16 Not yet answered Marked out of 1.00 Ti lệ của triệu chứng tăng huyết áp trong viêm cầu thận cấp hậu nhiễm Select one: a. 30% b. 100% c. 50-90% d. 40-50%

#### Question 17

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Tỉ lệ của triệu chứng tiểu máu đại thể trong viêm cầu thận cấp hậu nhiễm trùng là bao nhiêu?

#### Select one:

- a. <mark>30%</mark>
- o b. 100%
- c. 50-90%
- od. 10-20%

#### Question 18

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Tỉ lệ kháng corticoide trong hội chứng thận hư nguyên phát trẻ em là bao nhiêu?

- a. 5%
- **b.** 10%
- c. 20%
- od. 30%

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Tiên lượng của một trẻ bị HCTH nguyên phát dựa vào yếu tố nào sau đây?

#### Select one:

- a. Số lần tái phát
- b. Đáp ứng hay kháng corticoide
- c. Tuổi khởi phát
- d. Mức độ phù lúc nhập viện

#### Question 20

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Triệu chứng sớm của hội chứng thận hư tái phát là gì?

#### Select one:

- a. Trẻ phù mắt và lan toàn thân
- b. Trẻ tăng cân nhanh
- o. Que nhúng nước tiểu có đạm 3 ngày liên tiếp
- d. Mi mắt trẻ sưng nhẹ

#### Question 21

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Triệu chứng tiểu máu đại thể của bệnh nhân viêm cầu thận cấp hậu nhiễm liên cầu sẽ h<mark>ết tối đa trong khoảng bao lâu?</mark>

#### Select one:

- a. 4-6 tuần
- b. 3-4 tuần
- c. 2-3 tuần
- d. Tùy đáp ứng với thuốc điều trị

#### Question 22

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Trong hội chứng thận hư, trẻ dễ bị nhiễm trùng là do nguyên nhân nào sau đây?

- a. Mất yếu tố \q properdin
- b. Giảm albumin máu
- c. Tăng hoạt tính của vi khuẩn
- o d. Mất globulin miễn dịch

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Trường hợp nào sau đây bổ thể C3 và C4 trong máu bình thường?

#### Select one:

- a. Viêm cầu thận cấp tăng sinh màng nguyên phát
- b. Bênh Berger
- c. Hội chứng thân hư thứ phát sau lupus
- d. Viêm cầu thận cấp hậu nhiễm trùng

#### Question 24

Not yet

answered

Marked out of

Viêm cầu thân cấp hâu nhiễm liên cầu trùng, điều nào sau đây đúng?

#### Select one:

2-14 tuổi, nhiều nhất 3-5 tuổi

a. Thường gặp ở trẻ < 2 tuổi

Trong khoảng 90% bê g hai tuần lễ <mark>đầu</mark> tiên của đợt bệnh. <mark>Nồng độ C4 và C2 có thể th</mark> nh nhân, gợi ý sự hoạt hóa cả hai con đ quay trở về bình thường trong

- b. Tỉ lệ tấn công chung của streptococci chủng hướng thận là 25 %
- c. Kháng thể kháng liên cầu ASO trong máu dương tính trong 90-100 % trường hợp
- d. C3 máu có thể trở về bình thường sau 4-6 tuần chắc lấy sách mới. 4-8 tuần

#### Question 25

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Xét nghiệm nào sau đây là cần thiết nhất để chẩn đoán hội chứng thận hư?

- a. Đạm niệu 24 giờ
- b. Sinh thiết thận
- c. Điện di đạm trong nước tiểu
- d. Định lượng lipid máu

