



# NHI KHOA 1 (PEDIATRICS 1)

Nhà của tôi ► Các khoá học của tôi ► NK1 ► TIÊU HOÁ ► Pretest CBL Tiêu chảy cấp

## Câu hỏi 1

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Triệu chứng nào sau đây gợi táo bón do nguyên nhân thực thể?

Select one:

- ☒ a. Ói dịch mật
- ☐ b. Tiêu phân su lúc 36 giờ tuổi
- ☐ c. Trẻ són phân nhiều lần trong ngày
- ☐ d. Khám thấy có ứ phân cứng trong trực tràng

## Câu hỏi 2

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Kháng sinh được khuyến cáo sử dụng điều trị tả hiện nay là gì?

Select one:

- ☐ a. Metronidazole
- ☐ b. Cefixim
- ☐ c. Ciprofloxacin
- ☒ d. Azithromycin

**Câu hỏi 3**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Trong đánh giá hậu quả của nôn ói, điều nào sau đây nên được đánh giá đầu tiên?

Select one:

- ☐ a. Trẻ có kèm theo sốt không
- ☐ b. Trẻ đã ói bao nhiêu ngày rồi
- ☐ c. Trẻ có dấu hiệu nặng cần cấp cứu không
- ☐ d. Trẻ có nguy cơ thất bại đường uống không

**Câu hỏi 4**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Điều nào sau đây là đúng về quá trình tiêu hóa carbohydrate?

Select one:

- ☐ a. Fructose được vận chuyển vào trong tế bào nhờ quá trình phụ thuộc natri và năng lượng
- ☐ b. Ở niêm mạc ruột có các men để phân hủy carbohydrate
- ☐ c. Sự tiêu hóa carbohydrate thường hoàn tất ở đoạn cuối hồi tràng
- ☐ d. Lactose được vận chuyển vào trong tế bào nhờ khuếch tán

**Câu hỏi 5**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Nguyên nhân nào sau đây KHÔNG là béo phì do di truyền?

Select one:

- ☐ a. Hội chứng Down
- ☐ b. Hội chứng Carpenter.
- ☐ c. Hội chứng Prader Willi
- ☐ d. Hội chứng Cushing

**Câu hỏi 6**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Hoạt động nào sau đây giúp phòng ngừa béo phì ở trẻ em?

Select one:

- ☐ a. hoạt động thể chất >2 giờ/ngày
- ☐ b. giảm cân
- ☒ c. giảm thời gian xem màn hình <2 giờ/ngày
- ☐ d. ghi nhật ký ăn uống

**Câu hỏi 7**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặc điểm nào sau đây chỉ điểm đến nguyên nhân béo phì thứ phát?

Select one:

- ☒ a. chậm phát triển tâm thần.
- ☐ b. chiều cao tốt
- ☐ c. cha hoặc mẹ béo phì
- ☐ d. khám lâm sàng bình thường

**Câu hỏi 8**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Hai cơ chế chính trong bệnh tiêu chảy là gì?

Select one:

- ☐ a. Giảm  $\text{Ca}^{++}$  máu và tăng  $\text{Cl}^-$  trong lòng ruột
- ☐ b. Giảm dịch nhập và tăng nhu động ruột
- ☒ c. Giảm hấp thu và tăng xuất tiết
- ☐ d. Giảm lợi khuẩn đường ruột và tăng vi khuẩn gây bệnh

**Câu hỏi 9**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Điều nào sau đây là đúng khi giáo dục cho gia đình có trẻ bị táo bón?

Select one:

- ☐ a. Phạt trẻ nếu trẻ có són phân
- ☒ b. Khen thưởng nếu trẻ đi tiêu tốt
- ☐ c. Dùng thuốc là yếu tố quan trọng nhất trong điều trị táo bón
- ☐ d. Cho trẻ uống càng nhiều nước càng tốt

**Câu hỏi 10**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Theo quan điểm của Tổ chức Y tế Thế giới, hướng xử trí khi trẻ tiêu chảy cấp kèm ói nhiều là gì?

Select one:

- ☐ a. Chuyển viện lên tuyến cao hơn
- ☒ b. Hướng dẫn kỹ thuật uống đúng
- ☐ c. Ngưng ăn đường miệng và truyền dịch
- ☐ d. Chọn thuốc chống ói hiệu quả

**Câu hỏi 11**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Dấu hiệu Carnett (+) khi khám bụng gợi ý đến kiểu đau nào?

Select one:

- ☐ a. Đau tạng.
- ☒ b. Đau thành.
- ☐ c. Đau cấp.
- ☐ d. Đau mạn.

**Câu hỏi 12**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Trẻ tiêu chảy cấp có nguy cơ thất bại bù dịch đường uống khi nào?

Select one:

- ☒ a. Liệt ruột.
- ☐ b. Trẻ khát nhiều.
- ☐ c. Ói 4 lần / ngày.
- ☐ d. Tiêu chảy 10 lần / ngày.

**Câu hỏi 13**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Triệu chứng đau bụng trong bệnh tiêu chảy cấp thuộc kiểu đau nào?

Select one:

- ☐ a. Đau thành.
- ☐ b. Đau chuyển vị.
- ☒ c. Đau tạng.
- ☐ d. Đau nhanh.

**Câu hỏi 14**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Dấu hiệu nào sau đây gợi ý đau bụng do bệnh lý ngoại khoa?

Select one:

- ☐ a. Đau bụng mạn kèm buồn nôn.
- ☒ b. Đau bụng kèm nôn ra mật.
- ☐ c. Đau bụng kèm dấu hiệu nhiễm siêu vi.
- ☐ d. Cơ đau không tiến triển.

**Câu hỏi 15**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Câu nào sau đây đúng về ói tất cả mọi thứ?

Select one:

- ☐ a. Là ói trên 8 lần trong 24 giờ
- ☒ b. Là một dấu hiệu nguy hiểm toàn thân
- ☐ c. Là ói thức ăn và thuốc nhưng nước thì vẫn uống được
- ☐ d. Rất thường xảy ra khi trẻ bị tiêu chảy

**Câu hỏi 16**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Khám bệnh nhân tiêu chảy cấp ghi nhận trẻ li bì, uống kém, mắt trũng, dấu véo da bụng mất chậm. Phân độ mất nước nào phù hợp?

Select one:

- ☐ a. Mất nước nhẹ.
- ☐ b. Không mất nước.
- ☐ c. Mất nước trung bình.
- ☐ d. **Mất nước nặng.**

**Câu hỏi 17**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Điều nào sau đây là đúng trong điều trị táo bón chức năng?

Select one:

- ☐ a. Dùng probiotics và chất xơ
- ☐ b. Tháo xổ phân bằng lactulose nếu có ứ phân
- ☐ c. Ngưng điều trị bằng thuốc sớm nếu trẻ hết táo bón
- ☐ d. **Nên điều trị duy trì ít nhất 2 tháng**

**Câu hỏi 18**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Hoàng, 14 tháng tuổi, cân nặng 10kg bị tiêu chảy cấp được đánh giá có mất nước. Lượng Oresol đưa cho Hoàng uống bù nước trong 4 giờ đầu là bao nhiêu ml?

Select one:

- ☐ a. 1000ml
- ☐ b. **750ml**
- ☐ c. 250ml
- ☐ d. 500ml

**Câu hỏi 19**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Tiêu chảy cấp là tiêu chảy không quá bao nhiêu ngày?

Select one:

- ☐ a. 7 ngày
- ☐ b. 30 ngày
- ☒ c. 14 ngày
- ☐ d. 21 ngày

**Câu hỏi 20**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Dấu hiệu nào gợi ý tiêu chảy do tác nhân vi trùng?

Select one:

- ☐ a. Tiêu chảy kèm sốt 38oC.
- ☐ b. Tiêu chảy nhiều lần.
- ☒ c. Tiêu chảy phân có máu.
- ☐ d. Tiêu chảy kèm đau bụng.

