

MCQ Questions

Câu hỏi

1 U xơ-cơ tử cung là một khối u lệ thuộc steroid sinh dục. Khái niệm này phải được hiểu ra sao? Chọn một câu đúng

A. Estrogen là điều kiện cần thiết cho sự phát triển của khối u, thông qua thụ thể estrogen

B. Progesterone là yếu tố chủ lực thúc đẩy sự phát triển của khối u, thông qua thụ thể progesterone

C. Khối u sẽ thoái triển khi không có estrogen nội sinh hay khi thụ thể progesterone bị ức chế bằng thuốc

~~D.~~ Cả 3 mệnh đề trên cùng là các lý giải chính xác về tình trạng lệ thuộc steroid sinh dục của u xơ-cơ tử cung

2 Khái niệm về tiềm năng ác tính rất thấp của u xơ tử cung được diễn giải ra sao trong thực hành? Chọn một câu đúng

A. Không cần thiết phải chỉ định phẫu thuật với mục đích duy nhất là khảo sát mô bệnh học

B. U xơ-cơ tử cung có kết quả bệnh học là STUMP có thể được xem là một khối u lành tính

C. Không nhất thiết phải thực hiện khảo sát mô bệnh học bệnh phẩm mổ u xơ-cơ tử cung

D. Hiện đã đủ bằng chứng để xác định leiomyosarcoma là bệnh lý độc lập với u xơ-cơ tử cung

3 Sự kiện nào ủng hộ thuyết vi sang chấn về bệnh sinh của adenomyosis? Chọn một câu đúng

A. Đặc trưng trên hình ảnh học của adenomyosis

B. Nhu động nghịch thường của nội mạc tử cung

C. Tình trạng cường estrogen ở mô tuyến nội mạc

D. Thường kèm theo lạc nội mạc thâm nhiễm sâu

4 Sự kiện nào có tính phù hợp kém với thuyết tử cung hai nguồn gốc về bệnh sinh của adenomyosis? Chọn một câu đúng

A. Sự tồn tại của vùng tín hiệu kém giữa nội mạc và lớp cơ trên MRI

B. Tổn thương adenomyosis thường là các tổn thương đa ổ và lan tỏa

~~C.~~ Tần suất cao xảy ra thai làm tổ ngoài tử cung trong adenomyosis

D. Tổn thương adenomyosis thường đi kèm lạc nội

Thời gian còn lại

0:18:29



Số báo danh

20170419_96739

SUBMIT

IF AT					
C1	A	B	C	D	0
C2	A	B	C	D	0
C3	A	B	C	D	0
C4	A	B	C	D	0
C5	A	B	C	D	0
C6	A	B	C	D	0
C7	A	B	C	D	0
C8	A	B	C	D	0
C9	A	B	C	D	0
C10	A	B	C	D	0
C11	A	B	C	D	0
C12	A	B	C	D	0
C13	A	B	C	D	0
C14	A	B	C	D	0
C15	A	B	C	D	0
C16	A	B	C	D	0
C17	A	B	C	D	0
C18	A	B	C	D	0
C19	A	B	C	D	0
C20	A	B	C	D	0
SCORE: 0					

mặc thâm nhiễm sâu

5 Khảo sát nào hữu ích về nhiều mặt, giúp phân biệt u xơ-cơ tử cung và bệnh tuyến cơ tử cung? Chọn một câu đúng

- A. ☐ Siêu âm thang xám
- B. ☐ Siêu âm Doppler
- ~~C.~~ ☒ Cộng hưởng từ
- D. ☐ Soi buồng tử cung

6 Đáp ứng với điều trị nội của u xơ tử cung và bệnh tuyến cơ tử cung giống nhau ở vấn đề gì? Chọn một câu đúng

~~A.~~ ☒ Cả hai cùng nhanh chóng đáp ứng với liệu trình GnRH agonist

B. ☐ Cả hai cùng nhanh chóng tái phát sau liệu trình GnRH agonist

C. ☐ Cả hai cùng đề kháng với liệu pháp cắt nguồn estrogen nội sinh

D. ☐ Cả hai cùng đề kháng với liệu pháp dựa trên nền progesterone

7 Trong các trường hợp u xơ-cơ tử cung FIGO 4 sau, có chỉ định điều trị ngoại khoa ở trường hợp nào? Chọn một câu đúng

A. ☐ Khối u xơ-cơ tử cung FIGO 4, ở người còn rất trẻ

B. ☐ Khối u xơ-cơ tử cung FIGO 4, ở người có kế hoạch sinh con

~~C.~~ ☒ Khối u xơ-cơ tử cung FIGO 4, ở người có tiền sử sản khoa xấu

D. ☐ Khối u xơ-cơ tử cung FIGO 4, có kèm theo bệnh tuyến cơ tử cung

8 Điều trị u xơ tử cung bằng GnRH đối vận tương đương với điều trị nào trong các điều trị sau? Chọn một câu đúng

- A. ☐ Aromatase inhibitor
- ~~B.~~ ☒ GnRH đồng vận
- C. ☐ Progestogen
- D. ☐ Ulipristal

9 Trong các trường hợp u xơ-cơ tử cung FIGO 2 sau, có chỉ định điều trị ngoại khoa ở trường hợp nào? Chọn một câu đúng

- A. ☐ Khối u xơ-cơ tử cung FIGO 2 gây biến chứng

IF AT					
C1	A	B	C	D	0
C2	A	B	C	D	0
C3	A	B	C	D	0
C4	A	B	C	D	0
C5	A	B	C	D	0
C6	A	B	C	D	0
C7	A	B	C	D	0
C8	A	B	C	D	0
C9	A	B	C	D	0
C10	A	B	C	D	0
C11	A	B	C	D	0
C12	A	B	C	D	0
C13	A	B	C	D	0
C14	A	B	C	D	0
C15	A	B	C	D	0
C16	A	B	C	D	0
C17	A	B	C	D	0
C18	A	B	C	D	0
C19	A	B	C	D	0
C20	A	B	C	D	0
SCORE: 0					

xuất huyết tử cung bất thường

B. ● Khối u xơ-cơ tử cung FIGO 2 gây tiền sử các thai kỳ với kết cục sản khoa xấu

C. ● Khối u xơ-cơ tử cung FIGO 2 gây biến dạng buồng tử cung ở người hiếm muộn

D. ● Có chỉ định điều trị ngoại khoa cho cả 3 trường hợp u xơ-cơ tử cung FIGO 2 trên

10 Nên chọn phương pháp điều trị nội khoa u xơ-cơ tử cung nào cho các mục tiêu điều trị ngắn hạn? Chọn một câu đúng

A. ● Chất ức chế hoạt động của enzym Aromatase

B. ● Thuốc tránh thai estrogen-progestogen phối hợp **3 tháng, giống GnRHa**

C. ● Dụng cụ tử cung phóng thích chậm levonorgestrel

D. ● Chất điều hòa chọn lọc thụ thể của progesterone **3-6 tháng áh**

11 Trong bệnh sinh của adenomyosis, giả thuyết vòng xoắn vi sang chấn giải thích được vấn đề nào?

A. ● Đặc trưng trên hình ảnh học của adenomyosis

B. ● Tình trạng cường estrogen ở mô tuyến nội mạc

C. ● Sự tồn tại song song của u xơ tử cung và adenomyosis

D. ● Sự tồn tại song song của adenomyosis và của DIE (deeply infiltrating endometriosis)

12 Trong bệnh sinh của adenomyosis, giả thuyết tử cung hai nguồn gốc giải thích được vấn đề nào?

A. ● Tình trạng tổn thương đa ổ và lan tỏa của adenomyosis

B. ● Tình trạng đề kháng progesterone ở mô tuyến nội mạc

C. ● Tần suất cao xảy ra thai ngoài tử cung trong adenomyosis

D. ● Tần suất cao xảy ra kết cục thai kỳ xấu trong adenomyosis

13 Thể khối của u xơ-cơ tử cung tăng lên trong điều kiện nội tiết nào?

A. ● Khi u chịu tác dụng liên tục của estrogen nội sinh hay ngoại sinh

B. ● Khi u chịu tác dụng liên tục của estrogen phối hợp với progestin ngoại sinh

C. ● Khi u chịu tác dụng liên tục của progestin ngoại

IF AT					
C1	A	B	C	D	0
C2	A	B	C	D	0
C3	A	B	C	D	0
C4	A	B	C	D	0
C5	A	B	C	D	0
C6	A	B	C	D	0
C7	A	B	C	D	0
C8	A	B	C	D	0
C9	A	B	C	D	0
C10	A	B	C	D	0
C11	A	B	C	D	0
C12	A	B	C	D	0
C13	A	B	C	D	0
C14	A	B	C	D	0
C15	A	B	C	D	0
C16	A	B	C	D	0
C17	A	B	C	D	0
C18	A	B	C	D	0
C19	A	B	C	D	0
C20	A	B	C	D	0
SCORE: 0					

sinh

~~D.~~ ● Khi u chịu tác dụng lần lượt của estrogen theo sau bằng progesterone

14 Chọn phát biểu chính xác trong các phát biểu sau về đặc điểm mô bệnh học của u xơ-cơ tử cung.

A. ● U xơ-cơ tử cung lành tính có khả năng chuyển đổi thành leiomyosarcoma

B. ● U xơ-cơ tử cung có kết quả bệnh học là STUMP phải được xem là ác tính

~~C.~~ ● U xơ tử cung tổng hợp thụ thể với progesterone nhờ tác động của estrogen

D. ● U xơ cơ tử cung có khả năng tự tổng hợp estrogen từ androstenedione

15 Khi một khối u xơ-cơ tử cung không có triệu chứng, đặc điểm nào là chỉ định phải can thiệp điều trị?

A. ● Khối u xơ-cơ tử cung có nguy cơ sẽ chèn ép

B. ● Khối u xơ-cơ tử cung trong cơ, to, nhiều nhân

C. ● Khối u xơ-cơ tử cung dưới thanh mạc có cuống

D. ● Khối u xơ-cơ tử cung dưới niêm mạc có cuống

16 Đặc điểm nào giúp phân biệt u xơ cơ tử cung lành tính với leiomyosarcoma?

~~A.~~ ● Đặc điểm hình ảnh trên cộng hưởng từ

B. ● Đặc điểm hình ảnh trên siêu âm

C. ● Nạo sinh thiết buồng tử cung

D. ● Diễn tiến khối u to nhanh

17 Khi có rong huyết liên quan đến u xơ-cơ tử cung, khảo sát hình ảnh nào giúp quyết định phương pháp điều trị?

A. ● Cộng hưởng từ khảo sát vùng kết nối

B. ● Siêu âm với khảo sát dòng chảy bằng Doppler

C. ● Siêu âm grey-scale tiêu chuẩn

~~D.~~ ● Siêu âm với bơm nước buồng tử cung

18 Trong các tình huống sau, việc thực hiện UAE là hợp lý và chính đáng nhất trong tình huống nào?

A. ● U xơ-cơ tử cung nhiều nhân, gây nhiều phức tạp cho cuộc mổ bóc nhân xơ bảo tồn tử cung

B. ● U xơ-cơ tử cung có triệu chứng, không đáp ứng với điều trị nội, nhưng muốn bảo tồn tử cung

~~C.~~ ● U xơ-cơ tử cung cần cắt tử cung ở người từng bị mổ bụng nhiều lần, tiền lượng mổ rất khó

D. ● U xơ-cơ tử cung không triệu chứng, nhưng có

IF AT					
C1	A	B	C	D	0
C2	A	B	C	D	0
C3	A	B	C	D	0
C4	A	B	C	D	0
C5	A	B	C	D	0
C6	A	B	C	D	0
C7	A	B	C	D	0
C8	A	B	C	D	0
C9	A	B	C	D	0
C10	A	B	C	D	0
C11	A	B	C	D	0
C12	A	B	C	D	0
C13	A	B	C	D	0
C14	A	B	C	D	0
C15	A	B	C	D	0
C16	A	B	C	D	0
C17	A	B	C	D	0
C18	A	B	C	D	0
C19	A	B	C	D	0
C20	A	B	C	D	0
SCORE: 0					

kích thước lớn, không có chỉ định của phẫu thuật **chỉ định UAE là có chỉ định cắt TC mà không mổ cắt mà**

19 Nhận định ra sao khi so sánh điều trị u xơ-cơ tử cung có triệu chứng xuất huyết bằng SPRM và bằng IUS-LNG?

- A.** ● Bên cạnh làm giảm rong huyết SPRM có ưu thế hơn IUS-LNG nhờ hiệu quả làm giảm khối u
- B.** ● Bên cạnh làm giảm rong huyết IUS-LNG có ưu thế hơn SPRM nhờ hiệu quả làm giảm khối u
- C.** ● SPRM và IUS-LNG cùng có hiệu quả trên thể tích khối u và triệu chứng rong huyết
- D.** ● SPRM và IUS-LNG cùng có hiệu quả trên rong huyết và cùng không làm giảm khối u

20 Khi có chỉ định điều trị nội khoa u xơ-cơ tử cung, một cách tổng quát, phương pháp nào là phương pháp có nhiều ưu thế nhất?

- A.** ● Chất điều hòa chọn lọc thụ thể của progesterone
- B.** ● Progestin đơn độc đường uống hay LASDS
- C.** ● Thuốc tránh thai estrogen-progestin phối hợp
- D.** ● GnRH agonist hay GnRH antagonist

IF AT					
C1	A	B	C	D	0
C2	A	B	C	D	0
C3	A	B	C	D	0
C4	A	B	C	D	0
C5	A	B	C	D	0
C6	A	B	C	D	0
C7	A	B	C	D	0
C8	A	B	C	D	0
C9	A	B	C	D	0
C10	A	B	C	D	0
C11	A	B	C	D	0
C12	A	B	C	D	0
C13	A	B	C	D	0
C14	A	B	C	D	0
C15	A	B	C	D	0
C16	A	B	C	D	0
C17	A	B	C	D	0
C18	A	B	C	D	0
C19	A	B	C	D	0
C20	A	B	C	D	0
SCORE: 0					