

84/100


Câu hỏi 1

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00


Đặt cờ

41.Cô A., 22 tuổi. Khám vi huyết trắng có mùi hôi, tăng lên khi giao hợp. Âm đạo có huyết trắng đục. Soi tươi huyết trắng có hình ảnh:



Chẩn đoán phù hợp là gì?

41.Cô A., 22 tuổi. Khám vi huyết
Soi tươi huyết trắng có hình ảnh



Câu hỏi 2

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

73.Cô A., 35 tuổi, 3 tháng nay cô ra máu kinh nhiều và kéo dài hơn bình thường, siêu âm ghi nhận khối choáng chỗ lòng tử cung 1x1x2cm. Can thiệp nào tiếp theo là phù hợp để chẩn đoán rõ hơn tình trạng của cô A.?

- ☐ a. Nạo sinh thiết lòng tử cung
- ☐ b. Siêu âm bơm nước lòng tử cung
- ☐ c. Siêu âm Doppler
- ☐ d. MRI

Câu hỏi 3

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

10.Hãy cho biết cơ chế xuất huyết tử cung chức năng ở bé gái tuổi dậy thì?

- ☐ a. Chưa có xung GnRH
- ☐ b. Chưa có FSH
- ☐ c. Chưa có đỉnh LH
- ☐ d. Tất cả các cơ chế trên

Câu hỏi 4

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

94. Cô A., 45 tuổi, nhũ ảnh phát hiện một tổn thương BIRADS 4. Xử trí tiếp theo là gì?

- ☐ a. Tìm gen đột biến BRCA
- ☐ b. Sinh thiết lõi
- ☐ c. Sinh thiết bằng kim nhỏ
- ☐ d. MRI vú

Câu hỏi 5

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

27. Cô A., 30 tuổi, PARA 2002, trễ kinh 1 tuần, ra máu âm đạo 3 ngày, tư thứ QS (+). Hôm nay đau bụng nhiều nên cô đi khám, không sốt, không ói. Cô mệt, vã mồ hôi. Mạch: 108 lần/ phút, huyết áp 90/60mmHg. Khám: ấn đau khắp bụng, đau nhiều hố chậu trái, phản ứng thành bụng (+). Âm đạo ít huyết sẫm, tử cung lớn hơn bình thường, mềm, 2 phần phụ khó sờ, cứng đồ căng đau. Siêu âm: tử cung 35mm, nội mạc 10mm, cạnh buồng trứng trái có khối echo hỗn hợp 22x60mm, dịch cùng đồ (+) dịch rãnh gan thận (+). Nguyên nhân nào được nghĩ đến nhiều nhất?

- ☐ a. Vỡ nang hoàng thể
- ☐ b. Vỡ TNTC bên trái
- ☐ c. Vỡ nang hoàng tuyến
- ☐ d. Vỡ khối u buồng trứng + thai chưa rõ vị trí

Câu hỏi 6

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

26. Cô A., 30 tuổi, PARA 2002, trễ kinh 1 tuần, ra máu âm đạo 3 ngày, tư thứ QS (+). Hôm nay đau bụng nhiều nên cô đi khám, không sốt, không ói. Cô mệt, vã mồ hôi. Mạch: 108 lần/ phút, huyết áp 90/60mmHg. Khám: ấn đau khắp bụng, đau nhiều hố chậu trái, phản ứng thành bụng (+). Âm đạo ít huyết sẫm, tử cung lớn hơn bình thường, mềm, 2 phần phụ khó sờ, cứng đồ căng đau. Siêu âm: tử cung 35mm, nội mạc 10mm, cạnh buồng trứng trái có khối echo hỗn hợp 22x60mm, dịch cùng đồ (+) dịch rãnh gan thận (+). Can thiệp nào cần làm ngay?

- ☐ a. Cho bệnh nhân nằm nghiêng trái
- ☐ b. Lập đường truyền tĩnh mạch
- ☐ c. Định tính beta hCG
- ☐ d. Cho bệnh nhân nằm đầu cao

Câu hỏi 7

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

31. Cô A., 35 tuổi, bị nấm tái phát 5-6 lần/năm. Hôm nay cô đi khám vì bị ngứa âm hộ giống những lần trước. Khám: âm đạo có huyết trắng đặc trưng của nhiễm nấm. Những yếu tố nào cần khai thác liên quan đến nhiễm nấm tái phát?

- ☐ a. Tiền căn dị ứng
- ☐ b. Yếu tố bệnh tình
- ☐ c. Yếu tố nguy cơ
- ☐ d. Tiền căn gia đình

Câu hỏi 8

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

43. Triệu chứng nào phù hợp với viêm âm đạo do nấm

- ☐ a. pH âm đạo kiềm
- ☐ b. Huyết trắng xanh có nhiều bọt, hôi
- ☐ c. Cổ tử cung viêm đỏ như hình trái dâu tây
- ☐ d. Huyết trắng dạng phô mai sữa

[Trang Tiếp](#)**Câu hỏi 9**

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

5. Cô A., 60 tuổi, mãn kinh 2 năm. Một tuần lễ nay, cô bị ra máu âm đạo, mỗi ngày ướt 1 băng vệ sinh. Siêu âm ghi nhận tử cung dAP 30mm, nội mạc tử cung 7mm, ít dịch lỏng tử cung. Khảo sát nào cần thực hiện cho cô?

- ☐ a. Siêu âm bơm nước lỏng tử cung
- ☐ b. Nạo kênh lỏng tử cung
- ☐ c. Xét nghiệm nội tiết
- ☐ d. Nội soi buồng tử cung

Câu hỏi 10

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

67. Cô A., 30 tuổi, PARA 1001, đang ngừa thai bằng COC. Cô khám phụ khoa định kỳ, siêu âm phát hiện khối ở buồng trứng trái kích thước 4x4x5cm, echo trống, bờ mỏng, không chồi, không vách. CA12.5: 12 UI/mL. Nhận định gì về khối u buồng trứng của cô A.?

- ☐ a. U buồng trứng thực thể nghi ác tính
- ☐ b. U buồng trứng thực thể nghi lành tính
- ☐ c. Cần thêm dữ kiện
- ☐ d. U buồng trứng cơ năng

Câu hỏi 11

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

61. Cô A., đã cấy que Implanon được 3 tháng, 1 tuần nay cô bị ra máu âm đạo ít. Khám: âm đạo ít máu sẫm, cổ tử cung lành, âm đạo và cổ tử cung không sang thương, tử cung nhỏ, 2 phần phụ bình thường, QS âm tính, siêu âm: nội mạc 4mm, tử cung và 2 phần phụ bình thường. Can thiệp nào là phù hợp?

- ☐ a. Theo dõi thêm, chưa cần điều trị
- ☐ b. Lấy que Implanon
- ☐ c. Estrogen liều thấp
- ☐ d. Progestin uống

Câu hỏi 12

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

15. Cô A., 37 tuổi, PARA 1001, trước đây kinh đều chu kỳ 28 ngày, 2 năm nay cô không ngừa thai vì đang mong con, cô mất kinh 5 tháng, nhiều lần tự thử QS nhưng âm tính. Những đề nghị của bạn đều có kết quả âm tính và không phát hiện bất thường. Cô A. được thử FSH 30 UI/mL. Chẩn đoán nào phù hợp?

- ☐ a. Suy tuyến yên
- ☐ b. Suy buồng trứng
- ☐ c. Rối loạn phóng noãn
- ☐ d. Suy hạ đồi

Câu hỏi 13

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

51. Cô A., 22 tuổi, chu kỳ kinh không đều 1-3 tháng. Cô muốn tránh thai bằng phương pháp tránh ngày phóng noãn. Tư vấn nào là hợp lý?

- ☐ a. Theo dõi rụng trứng bằng que thử LH
- ☐ b. Theo dõi thân nhiệt để xác định ngày tránh giao hợp
- ☐ c. Theo dõi dịch âm đạo để xác định ngày tránh giao hợp
- ☐ d. Tư vấn phương pháp tránh thai khác

Câu hỏi 14

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

38. Mục tiêu chính trong điều trị loạn khuẩn âm đạo là gì?

- ☐ a. Tạo môi trường có nhiều lactobacillus
- ☐ b. Khôi phục môi trường khuẩn hệ nguyên thủy
- ☐ c. Tiêu diệt các vi khuẩn yếm khí ngoại lai
- ☐ d. Cân bằng môi trường toan - kiềm âm đạo

Câu hỏi 15

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

22. Cô A., 45 tuổi, PARA 2002, đến khám vì trễ kinh, ra huyết âm đạo. Sinh hiệu bình thường, bụng mềm, âm đạo ít huyết sậm. Cổ tử cung đóng, tử cung khoảng thai 10 tuần, siêu âm thấy lòng tử cung có khối echo hỗn hợp 40x45mm. Beta hCG 120.000 mUI/mL. Xử trí thích hợp là gì?

- ☐ a. Hút nạo lòng tử cung
- ☐ b. Gây sảy thai với Misoprostol
- ☐ c. Hóa trị với Methotrexate
- ☐ d. Cắt tử cung nguyên khối

Câu hỏi 16

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

28. Cô A., 44 tuổi, PARA 3003, Khám vì trễ kinh 2 tuần, ra máu âm đạo. Khám: bụng mềm, âm đạo ít huyết sậm, tử cung to bằng thai 7-8 tuần. Siêu âm: lòng tử cung có khối echo hỗn hợp 40x50mm, 2 buồng trứng có khối giới hạn rõ 5x6x6cm, echo trống, nhiều vách mỏng. Beta hCG 70.000 mUI/mL. Can thiệp gì là phù hợp?

- ☐ a. Cắt tử cung nguyên khối + bóc u buồng trứng
- ☐ b. Hút nạo lòng tử cung
- ☐ c. Hút nạo lòng tử cung + bóc u buồng trứng
- ☐ d. Cắt tử cung nguyên khối

Câu hỏi 17

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

24. Cô A., 32 tuổi, PARA 1001, trễ kinh 1 tuần, QS (+) ra máu âm đạo ít rỉ rả 3 ngày nên đi khám. Khám: sinh hiệu ổn, bụng mềm, không điểm đau, âm đạo ít huyết sậm. Siêu âm: lòng tử cung trống, nội mạc 8mm, buồng trứng 2 bên bình thường, cạnh buồng trứng trái có khối echo hỗn hợp 20x22mm, ít dịch cùng đồ. Beta hCG 1700mIU/mL. Chẩn đoán nào là phù hợp nhất?

- ☐ a. Thai ngoài tử cung bên trái chưa vỡ
- ☐ b. Ung thư buồng trứng trái
- ☐ c. Thai chưa rõ vị trí + xuất huyết nang buồng trứng trái
- ☐ d. Chưa thể xác định

Câu hỏi 18

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

64. Chế độ ăn nào dưới đây phù hợp cho người mắc hội chứng buồng trứng đa nang có rối loạn chuyển hoá glucose?

- ☐ a. Ăn nhiều thực phẩm chứa Vitamin B12
- ☐ b. Cân đối các thành phần: đường, đạm, béo
- ☐ c. Tiết chế đạm
- ☐ d. Tiết chế tinh bột

Câu hỏi 19

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

54. Cô A., 35 tuổi, vừa sanh con 1 tháng, đang cho con bú. Phương pháp ngừa thai nào phù hợp cho cô trong giai đoạn này?

- ☐ a. POP
- ☐ b. COC
- ☐ c. Thuốc khẩn cấp
- ☐ d. Vòng TCu380A

Câu hỏi 20

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

70. Cô A., 42 tuổi, PARA 2002, cô đi khám vì gần đây đau bụng kinh nhiều. Khám: tử cung lớn hơn bình thường, di động kém, cạnh phải tử cung có khối 4x5cm di động kém. Siêu âm: tử cung ngã sau, đường kính trước sau 42mm, cơ thành sau dày gấp đôi thành trước, nội mạc 5mm. Buồng trứng trái bình thường, buồng trứng phải có u kích thước 44x40x52mm, không vách, không chồi, trong chứa echo kém dạng kính mài. CA 12.5: 45UI/mL. Xử trí nào đúng với khối u buồng trứng của cô A.?

- ☐ a. Mổ bụng hở
- ☐ b. Theo dõi
- ☐ c. Chụp MRI bụng chậu
- ☐ d. Mổ nội soi

Câu hỏi 21

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

32. Cô A., 35 tuổi, bị nấm tái phát 5-6 lần/năm. Hôm nay cô đi khám vì bị ngứa âm hộ giống những lần trước. Khám: âm đạo có huyết trắng đặc trưng của nhiễm nấm. Xét nghiệm nào giúp ra quyết định điều trị cho cô A?

- ☐ a. Nuôi cấy dịch âm đạo, định danh tác nhân
- ☐ b. Nhỏ huyết trắng vào dung dịch KOH 10%
- ☐ c. Whiff test
- ☐ d. Soi nhuộm huyết trắng

Câu hỏi 22

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

29. Cô A., đã được chẩn đoán u xơ cơ tử cung không biến chứng, cô được theo dõi và tái khám mỗi 6 tháng. Chế độ ăn nào phù hợp với cô?

- ☐ a. Giữ chế độ ăn cân bằng
- ☐ b. Ưu tiên các chế phẩm từ sữa
- ☐ c. Hạn chế thịt đỏ
- ☐ d. Hạn chế chất béo

Câu hỏi 23

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

76.Cô A., 38 tuổi, khám vì xuất huyết tử cung bất thường 6 tháng nay. Khám: tử cung to bằng thai 7-8 tuần, di động kém. Siêu âm: tử cung ngã sau, đường kính trước-sau 60mm, thành sau dày hơn thành trước, thành sau có cấu trúc phản âm kém, cấu trúc không đồng nhất, giới hạn không rõ. Định hướng chẩn đoán là gì?

- ☐ a. AUB-L
- ☐ b. AUB-P
- ☐ c. AUB-M
- ☒ d. AUB-A

Câu hỏi 24

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

59.Cơ chế ngừa thai chính của thuốc viên uống phối hợp là gì?

- ☐ a. Diệt tinh trùng
- ☐ b. Ức chế rụng trứng
- ☐ c. Ngăn sự làm tổ
- ☐ d. Làm đặc chất nhầy cổ tử cung

Câu hỏi 25

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

83.Cô A., 30 tuổi, có kết quả PAP's là ASC-US và HPV âm tính. Cần làm gì tiếp theo?

- ☐ a. Soi cổ tử cung
- ☐ b. Nạo kênh cổ tử cung
- ☐ c. Làm lại cotesting 1 năm sau
- ☒ d. Làm lại cotesting 3 năm sau

Câu hỏi 26

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

44. Cô A., 28 tuổi, đến khám vì ra dịch âm đạo nhiều và tiểu buốt. Âm đạo có nhiều dịch vàng loãng, cổ tử cung có hình ảnh:



Xét nghiệm nào nên được ưu tiên thực hiện?

- ☐ a. Huyết thanh chẩn đoán lậu
- ☐ b. NAATs
- ☐ c. Cấy dịch, kháng sinh đồ
- ☐ d. Soi tử cung, nhuộm Gram

Câu hỏi 27

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

1. Nội tiết nào do buồng trứng tiết ra?

- ☐ a. LH, progesterone
- ☐ b. FSH, LH
- ☐ c. Progesterone, estrogen
- ☐ d. Estrogen, FSH

Câu hỏi 28

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

7. Cô A., 33 tuổi, đang cấy que Implanon được 5 tháng, cô đến khám vì 3 tuần nay ra máu âm đạo rỉ rỉ. Siêu âm: tử cung dAP 35mm, nội mạc 3mm, 2 phần phụ bình thường. Điều trị gì cho cô A?

- ☐ a. Progestin
- ☐ b. Estrogen
- ☐ c. Theo dõi
- ☐ d. Clomiphene citrate

Câu hỏi 29

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

50. Cô A., 22 tuổi, chu kỳ kinh 24-28 ngày. Đây là vỉ thuốc ngừa thai phối hợp đầu tiên cô sử dụng. Cô có kinh ngày 1/8, bắt đầu vỉ thuốc vào ngày 3/8, uống thuốc vào mỗi tối. Hôm nay là sáng ngày 11/8 cô phát hiện ra mình đã quên thuốc ngày 10/8. Tư vấn dùng thuốc tiếp theo như thế nào để an toàn và ít tác dụng phụ nhất?

- ☐ a. Uống 2 viên vào tối 11/8, ngừa thai hỗ trợ trong 7 ngày tới
- ☒ b. Uống 1 viên buổi sáng 11/8, tối 11/8 uống như bình thường
- ☐ c. Uống 1 viên tối 11/8, tiếp tục vỉ thuốc như bình thường
- ☐ d. Uống 2 viên vào sáng 11/8, ngừa thai hỗ trợ trong 7 ngày tới

Câu hỏi 30

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

47. Cô A., 33 tuổi, có kết quả PAP's bình thường và HPV dương tính (không phải type nguy cơ cao). Lịch tầm soát tiếp theo của cô A. như thế nào?

- ☐ a. Sau 6 tháng
- ☐ b. Sau 3 năm
- ☐ c. Sau 1 năm
- ☐ d. Sau 5 năm


Câu hỏi 31

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

42. Cô A., 22 tuổi. Khám vi huyết trắng có mùi hôi, tăng lên khi giao hợp. Âm đạo có huyết trắng đục. Soi tươi huyết trắng có hình ảnh:



Điều trị phù hợp cho cô A. là gì?

- ☐ a. Clotrimazole
- ☐ b. Metronidazole
- ☐ c. Fluconazole

Câu hỏi 32

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

78. Cô A., 25 tuổi, đã tiêm ngừa HPV khi cô được 12 tuổi, lịch tầm soát ung thư cổ tử cung của cô thay đổi như thế nào so với những người chưa tiêm ngừa HPV?

- ☐ a. Thưa hơn 1 năm
- ☐ b. Không cần tầm soát
- ☐ c. Giống nhau
- ☐ d. Thưa hơn 3 năm

Câu hỏi 33

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

13. Cô A., 22 tuổi, ngừa thai bằng tránh ngày phóng noãn. Cô ra máu âm đạo rỉ rả 3 ngày nay. Không nhớ rõ kinh chót. Điều cần làm đầu tiên là gì?

- ☐ a. Định tính beta hCG
- ☐ b. Siêu âm doppler
- ☐ c. Công thức máu
- ☐ d. Siêu âm gray scale

Câu hỏi 34

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

2. Nội tiết nào do tuyến yên tiết ra?

- ☐ a. FSH, progesterone
- ☐ b. Progesterone, estrogen
- ☐ c. Estrogen, prolactin
- ☐ d. Prolactin, FSH

Câu hỏi 35

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

21. Yếu tố nào liên quan NHIỀU NHẤT đến thành công của điều trị nội khoa thai ngoài tử cung?

- ☐ a. Cân nặng bệnh nhân
- ☐ b. Beta hCG
- ☐ c. Tình trạng ra máu âm đạo
- ☐ d. Kích thước khối thai

Câu hỏi 36

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

16. Cô A., 46 tuổi. Hôm nay cô đến khám vì ra máu âm đạo rỉ rả 5 ngày nay. Việc nào cần làm đầu tiên?

- ☐ a. Loại trừ có thai
- ☐ b. Xác định nguyên nhân chảy máu
- ☐ c. Xác định vị trí chảy máu
- ☐ d. Loại trừ bệnh lý ác tính

Câu hỏi 37

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

37. Yếu tố nào quyết định sẽ điều trị một trường hợp viêm âm đạo do nấm?

- ☐ a. Không có lactobacillus trong dịch âm đạo
- ☐ b. Kết quả soi tươi huyết trắng có bào tử nấm
- ☐ c. pH âm đạo kiềm
- ☐ d. Biểu hiện lâm sàng huyết trắng đặc hiệu

Câu hỏi 38

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

45. Cô A., 28 tuổi, đến khám vì ra dịch âm đạo nhiều và tiểu buốt. Âm đạo có nhiều dịch vàng loãng, cổ tử cung có hình ảnh:



Điều trị nào là phù hợp cho cô?

- ☐ a. Tinidazole đường uống
- ☐ b. Metronidazole đặt âm đạo
- ☐ c. Ceftriazone uống

Câu hỏi 39

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

23.Cô A., 20 tuổi, PARA 0000, đến khám vì trễ kinh, ra huyết âm đạo. Sản hiệu bình thường, bụng mềm, âm đạo ít huyết nhợt, cổ tử cung đóng, tử cung khoảng thai 6 tuần, siêu âm thấy lòng tử cung có khối echo hỗn hợp 20x20mm. hCG 50.000mUI/mL. Chẩn đoán thích hợp nhất là gì?

- ☐ a. Sẩy thai trọn
- ☐ b. Bệnh lý nguyên bào nuôi
- ☐ c. Sẩy thai không trọn
- ☐ d. Thai sớm dọa sẩy

Câu hỏi 40

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

17.Cô A., 30 tuổi, chu kỳ kinh không đều, chu kỳ 1 đến 5 tháng. Cô đi khám vì vô kinh 3 tháng. Can thiệp cần làm?

- ☐ a. Siêu âm phụ khoa
- ☐ b. Beta hCG
- ☐ c. Tái khám 1 tháng nếu chưa ra kinh
- ☐ d. Tái khám 2 tháng nếu chưa ra kinh

Câu hỏi 41

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

48.Cô A., khám phụ khoa được soi tươi huyết trắng thấy trùng roi di động. Xử trí nào là đúng?

- ☐ a. Metronidazole đường âm đạo cho vợ
- ☐ b. Metronidazole đường uống cho vợ và chồng
- ☐ c. Metronidazole đường uống cho vợ
- ☐ d. Metronidazole đường âm đạo cho vợ, đường uống cho chồng

Câu hỏi 42

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

68.Cô A., 30 tuổi, PARA 1001, đang ngừa thai bằng COC. Cô khám phụ khoa định kỳ, siêu âm phát hiện khối ở buồng trứng trái kích thước 4x4x5cm, echo trống, bờ mỏng, không chồi, không vách. CA12.5: 12 UI/mL. Xử trí nào là đúng?

- ☐ a. Mổ bụng hở
- ☐ b. Mổ nội soi
- ☐ c. Theo dõi
- ☐ d. Siêu âm Doppler

Câu hỏi 43

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

80. Cô A., 35 tuổi, có kết quả PAP's bình thường, HPV (+) type 16. Cần làm gì tiếp theo?

- ☐ a. Soi cổ tử cung
- ☐ b. Nạo kênh cổ tử cung
- ☐ c. Làm lại cotesting 1 năm sau
- ☐ d. Làm lại cotesting 3 năm sau

Câu hỏi 44

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

46. Cô A., 33 tuổi, cách 3 năm cô có làm PAP's nhưng dịch kết quả bình thường, hôm nay tới hẹn tầm soát ung thư cổ tử cung mà cô phát hiện mình có thai 6 tuần. Nên tầm soát ung thư cổ tử cung cho cô A. ở thời điểm nào?

- ☐ a. Trong tam cá nguyệt thứ 3
- ☐ b. Ngay lúc này
- ☐ c. Sau sinh
- ☐ d. Trong tam cá nguyệt thứ 2

Câu hỏi 45

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

33. Cô A., 22 tuổi, cô hút thai cách nay 2 tuần, hôm nay sốt 38°C nên đi khám. Bụng mềm, âm đạo ít huyết trắng hôi, CTC lồi, lổ cổ tử cung đau, chạm tử cung đau, 2 phần phụ không sờ chạm. Siêu âm không ghi nhận bất thường. Can thiệp nào là phù hợp?

- ☐ a. Soi nhuộm gram dịch âm đạo
- ☐ b. Điều trị kháng sinh
- ☐ c. X quang bụng đứng không sửa soạn
- ☐ d. Sinh thiết lòng tử cung

Câu hỏi 46

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

62. Thời gian tối đa có thể sử dụng thuốc ngừa thai khẩn cấp chứa Levonorgestrel sau quan hệ là bao nhiêu?

- ☐ a. 144 giờ
- ☐ b. 72 giờ
- ☐ c. 96 giờ
- ☐ d. 120 giờ

Câu hỏi 47

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

95. Tầm soát ung thư vú bằng nhũ ảnh cho đối tượng nào sau đây?

- ☐ a. 55 tuổi, đã mổ ung thư vú
- ☐ b. 45 tuổi, béo phì
- ☐ c. 25 tuổi, đau vú
- ☐ d. 35 tuổi, khoẻ mạnh

Câu hỏi 48

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

57. Cô A., 49 tuổi, cô đặt vòng TCu 380A đến nay vừa tròn 10 năm. Hiện cô vô kinh 6 tháng. Cô đi khám phụ khoa định kỳ, không có than phiền gì. QS âm, siêu âm: dụng cụ tử cung (DCTC) nằm đúng vị trí, không bất thường ở tử cung và buồng trứng. Tư vấn DCTC cho cô như thế nào là phù hợp nhất?

- ☐ a. Thay DCTC mới ngay
- ☐ b. Sử dụng tiếp DCTC
- ☐ c. Cho thuốc nội tiết, chờ ra kinh thay DCTC
- ☐ d. Lấy DCTC và ngừa thai cách khác

Câu hỏi 49

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

75. Cô A., 57 tuổi, đã mãn kinh 05 năm. Cô đã có nhân xơ tử cung từ trước, 3 năm trước nhân xơ có đường kính 5-6cm. Hôm nay cô đau bụng dưới nên đi khám, siêu âm ghi nhận khối echo hỗn hợp trong cơ tử cung có kích thước 10x10x12cm, giới hạn không rõ. Nguyên nhân phù hợp nhất làm cho khối trong cơ tử cung tăng kích thước ở cô A. là gì?

- ☐ a. Nhân xơ tử cung thoái hoá
- ☐ b. Tăng kích thước theo thời gian
- ☐ c. Sarcoma cơ tử cung
- ☐ d. Đáp ứng với tình trạng mãn kinh

Câu hỏi 50

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

9. Bé A., 15 tuổi, chưa quan hệ, chu kỳ không đều, 4 tháng nay không ra kinh. Hiện ra máu âm đạo rỉ rả 3 tuần. Nội mạc 8mm. Điều trị gì cho bé A.?

- ☐ a. Progestin
- ☐ b. Estrogen
- ☐ c. Clomiphene citrate
- ☐ d. Theo dõi

Câu hỏi 51

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

52. Biện chứng xuất huyết tử cung thường gặp nhất ở phương pháp ngừa thai bằng thuốc viên phối hợp nào dưới đây?

- ☐ a. E2 50mg
- ☐ b. E2 35mcg
- ☐ c. E2 20mcg
- ☐ d. E2 15mcg

Câu hỏi 52

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

6. Cô A., 45 tuổi, trước đây có chu kỳ kinh 28-30 ngày, hành kinh 5 ngày. Cô đi khám vì 6 tháng nay vòng kinh chỉ 25 ngày, hành kinh 3-4 ngày. Siêu âm: tử cung dAP 33mm, nội mạc 7mm, 2 buồng trứng bình thường. Ngoài ra không thấy có bất thường gì khác. Cần làm gì tiếp theo?

- ☐ a. Bổ sung estrogen uống
- ☐ b. Hẹn tái khám định kỳ
- ☐ c. Thử beta hCG
- ☐ d. Nạo sinh thiết tử cung

Câu hỏi 53

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

63. Sử dụng thuốc ngừa thai khẩn cấp chứa Levonorgestrel vào thời gian nào sau quần hệ thì có hiệu quả nhất?

- ☐ a. > 36 giờ
- ☐ b. < 12 giờ
- ☐ c. 24-36 giờ
- ☐ d. 12-24 giờ

Câu hỏi 54

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

99. Chiến lược tầm soát ung thư vú nào phù hợp với người phụ nữ 35 tuổi, có mẹ ruột vừa qua đời vì ung thư vú?

- ☐ a. Tự nhận thức về vú
- ☐ b. Siêu âm vú kết hợp nhũ ảnh mỗi năm 1 lần
- ☐ c. MRI vú mỗi năm 1 lần
- ☐ d. Nhũ ảnh mỗi năm 1 lần

Câu hỏi 55

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

82. Cô A., 23 tuổi, có kết quả PAP's là ASC-US. Cần làm gì tiếp theo?

- ☐ a. Nạo kênh cổ tử cung
- ☐ b. Làm lại PAP's 1 năm sau
- ☐ c. Soi cổ tử cung
- ☐ d. Làm lại PAP's 3 năm sau

Câu hỏi 56

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

3. Nội tiết nào tác động trực tiếp lên lớp nội mạc tử cung?

- ☐ a. GnRH, LH
- ☐ b. Estrogen, progesterone
- ☐ c. Progesterone, GnRH
- ☒ d. LH, estrogen

Câu hỏi 57

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

14. Cô A., 37 tuổi, PARA 1001, trước đây kinh đều chu kỳ 28 ngày, 2 năm nay cô không ngừa thai vì đang mong con, cô mất kinh 5 tháng, nhiều lần tự thủ QS nhưng âm tính. Khảo sát nào cần làm?

- ☐ a. Siêu âm gray scale, LH
- ☐ b. Beta hCG, siêu âm gray scale
- ☐ c. LH, siêu âm Doppler
- ☐ d. Siêu âm Doppler, beta hCG

Câu hỏi 58

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

4. Cô A., 42 tuổi, ra huyết âm đạo rỉ rả kéo dài 2 ngày nay. Xét nghiệm nào bắt buộc phải làm?

- ☐ a. Estrogen
- ☐ b. Beta hCG
- ☐ c. Progesterone
- ☐ d. FSH

Câu hỏi 59

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

88.Cô A., 32 tuổi, có kết quả PAP's là HSIL. Cần làm gì tiếp theo?

- ☐ a. LEEP
- ☐ b. Khoét chóp
- ☐ c. Nạo kênh cổ tử cung
- ☐ d. HPV testing

Câu hỏi 60

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

20.Cô A., 27 tuổi, PARA 1001, trễ kinh 1 tuần, hôm nay ra máu ít nên đi khám. Sinh hiệu bình thường, âm đạo ít máu sẫm, cổ tử cung lồi, tử cung lớn hơn bình thường, 2 phần phụ không sờ chạm, cùng đồ không căng. Siêu âm: nội mạc tử cung 10mm, 2 phần phụ bình thường. beta hCG 1200 mUI/mL. Hướng xử trí tiếp theo là gì?

- ☐ a. Hẹn tái khám 2 ngày
- ☐ b. Điều trị MTX
- ☐ c. Ngâm misoprostol
- ☐ d. Hút lòng tử cung

Câu hỏi 61

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

40.Xử trí nào phù hợp nhất với VVC tái phát nhiều lần?

- ☐ a. Điều trị cho bạn tình
- ☐ b. Kiểm soát các yếu tố nguy cơ
- ☐ c. Liệu pháp ức chế kéo dài với Fluconazole
- ☐ d. Bổ sung probiotic đường âm đạo

Câu hỏi 62

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

53.Cô A., 38 tuổi, PARA 2002, chu kỳ kinh 28 ngày, trước giờ cô ngừa thai bằng tránh ngày phóng noãn, cô muốn được đặt vòng TCu380A. Thời điểm nào đặt vòng tốt nhất cho cô?

- ☐ a. Bất kỳ thời điểm nào
- ☐ b. Ngay sau sạch kinh
- ☐ c. Đang ra kinh ngày 3
- ☐ d. Chuẩn bị ra kinh

Câu hỏi 63

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

71. Nang hoàng thể xuất hiện ở thời điểm nào của chu kỳ kinh?

- ☐ a. Vừa sạch kinh
- ☐ b. Đang hành kinh
- ☐ c. Sau rụng trứng
- ☐ d. Bất cứ thời điểm nào

Câu hỏi 64

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

69. Cô A., 42 tuổi, PARA 2002, cô đi khám vì gần đây đau bụng kinh nhiều. Khám: tử cung lớn hơn bình thường, di động kém, cạnh phải tử cung có khối 4x5cm di động kém. Siêu âm: tử cung ngã sau, đường kính trước sau 42mm, cơ thành sau dày gấp đôi thành trước, nội mạc 5mm. Buồng trứng trái bình thường, buồng trứng phải có u kích thước 44x40x52mm, không vách, không chồi, trong chứa echo kém dạng kính mờ. CA 12.5: 45UI/mL. Nhận định gì về khối u buồng trứng của cô A.?

- ☐ a. U buồng trứng thực thể nghi ác tính
- ☐ b. U buồng trứng thực thể nghi lành tính
- ☐ c. U buồng trứng cơ năng
- ☐ d. Cần thêm dữ kiện

Câu hỏi 65

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

56. Trong các phương pháp tránh thai dưới đây, phương pháp nào hiệu quả cao nhất?

- ☐ a. Bao cao su
- ☐ b. LNG-IUS
- ☐ c. Implanon
- ☐ d. COCs

Câu hỏi 66

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

84. Cô A., 30 tuổi, có kết quả PAP's là ASC-US và HPV (+) type 18. Cần làm gì tiếp theo?

- ☐ a. Nạo kênh cổ tử cung
- ☐ b. Soi cổ tử cung
- ☐ c. Làm lại cotesting 3 năm sau
- ☐ d. Làm lại cotesting 1 năm sau

Câu hỏi 67

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

65. Chế độ ăn nào dưới đây phù hợp với người mắc hội chứng buồng trứng đa nang có tăng testosterone

- ☐ a. Tiết chế tinh bột
- ☐ b. Cân đối các thành phần: đường, đạm, béo
- ☐ c. Ăn nhiều thực phẩm chứa Vitamin B12
- ☐ d. Tiết chế đạm

Câu hỏi 68

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

34. Cô A., 27 tuổi, PARA 0000, khám vì ra huyết trắng bất thường 5 ngày. Khám: âm hộ không viêm đỏ, âm đạo có dịch trắng xám, pH dịch âm đạo 5.9, nhỏ KOH vào dịch âm đạo có mùi cá thối. Điều trị nào là phù hợp?

- ☐ a. Clotrimazole
- ☐ b. Sulfametotazole
- ☐ c. Metronidazole
- ☐ d. Fluconazole

Câu hỏi 69

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

66. Cô A., 42 tuổi, 6 tháng nay cô bị rong kinh, cường kinh do nhân xơ tử cung, cô đã được lên chương trình phẫu thuật. Chế độ ăn nào phù hợp cho cô?

- ☐ a. Hạn chế thịt đỏ
- ☐ b. Sử dụng nhiều thực phẩm chứa sắt
- ☐ c. Hạn chế thực phẩm nhiều tinh bột
- ☐ d. Sử dụng nhiều thực phẩm chứa Vitamin C

Câu hỏi 70

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

11. Một phụ nữ 18 tuổi, chảy máu tử cung không thường xuyên. Được chẩn đoán hội chứng buồng trứng đa nang. Đến khám vì muốn có chu kỳ kinh đều. Xử trí nào sau đây phù hợp?

- ☐ a. Uống anti-androgen liên tục
- ☐ b. Uống viên thuốc tránh thai phối hợp
- ☐ c. Uống progestogen liên tục
- ☐ d. Uống thuốc gây phóng noãn

Câu hỏi 71

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

72. Cô A., 27 tuổi, PARA 1001, tiền căn nội ngoại khoa bình thường, được chẩn đoán u bì buồng trứng trái. Cô được chỉ định mổ nội soi bóc u buồng trứng. Dùng kháng sinh cho cô A. như thế nào cho hợp lý?

- ☐ a. Đường tĩnh mạch 3 ngày sau mổ
- ☐ b. Phối hợp kháng sinh
- ☐ c. Dự phòng trước mổ
- ☐ d. Đường tĩnh mạch 5 ngày sau mổ

Câu hỏi 72

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

93. Cô A., 30 tuổi, siêu âm vú phát hiện một tổn thương BIRADS 3. Xử trí tiếp theo là gì?

- ☐ a. Nhũ ảnh
- ☐ b. Sinh thiết lõi
- ☐ c. Sinh thiết bằng kim nhỏ
- ☐ d. MRI vú

Câu hỏi 73

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

49. Cô A., có chu kỳ kinh dao động 28-32 ngày. Cô muốn ngừa thai bằng cách tránh ngày phóng noãn. Cô có kinh ngày 01/8. Ngày nào là ngày có thể rụng trứng?

- ☐ a. 18/8-22/8
- ☐ b. 14/8-18/8
- ☐ c. 22/8-26/8
- ☐ d. 10/8-14/8

Câu hỏi 74

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

87. Cô A., 22 tuổi, có kết quả PAP's là HSIL. Soi và sinh thiết cổ tử cung không có sang thương CIN 2 hay CIN 3. Cần làm gì tiếp theo?

- ☐ a. LEEP
- ☐ b. Khoét chớp
- ☒ c. Soi cổ tử cung và PAP's 6 tháng sau
- ☐ d. HPV testing

Câu hỏi 75

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

89. Cô A., 35 tuổi có kết quả PAP's là AGC. Cần làm gì tiếp theo

- ☐ a. HPV testing + Soi cổ tử cung
- ☒ b. Nạo kênh cổ tử cung + Soi cổ tử cung
- ☐ c. Khoét chóp + HPV testing
- ☐ d. LEEP + Nạo kênh cổ tử cung

Câu hỏi 76

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

86. Cô A., 32 tuổi, có kết quả PAP's là LSIL và HPV (+) type 16. Cần làm gì tiếp theo?

- ☒ a. Soi cổ tử cung
- ☐ b. Nạo kênh cổ tử cung
- ☐ c. Làm lại cotesting 3 năm sau
- ☐ d. Làm lại cotesting 1 năm sau

Câu hỏi 77

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

97. Cô A., 25 tuổi, thường đau vú khi gần ngày kinh. Khám không phát hiện bất thường. Xử trí nào phù hợp

- ☐ a. Xem xét thay đổi kích cỡ áo ngực
- ☐ b. Gel bôi chứa NSAID
- ☐ c. Gel bôi chứa estrogen
- ☐ d. Gel bôi chứa progestogen

Câu hỏi 78

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

85. Cô A., 32 tuổi, có kết quả PAP's là LSIL. Cần làm gì tiếp theo?

- ☐ a. Soi cổ tử cung
- ☐ b. Làm lại PAP's 3 năm sau
- ☐ c. Làm lại PAP's 1 năm sau
- ☐ d. Nạo kênh cổ tử cung

Câu hỏi 79

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

77.Cô A., 40 tuổi, PARA 3003, chu kỳ kinh đều 30 ngày, hành kinh 3-4 ngày, đến khám vì tình cờ phát hiện nhân xơ tử cung. Khám: tử cung to bằng thai 14 tuần, di động. Siêu âm: khối nhân xơ tử cung ở đáy kích thước 7x7x9cm (FIGO 4-5). Xử trí nào là phù hợp?

- ☐ a. GnRH đồng vận
- ☐ b. GnRH đối vận
- ☐ c. Phẫu thuật
- ☐ d. Theo dõi định kỳ

Câu hỏi 80

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

74.Cô A., 39 tuổi, 6 tháng nay cô ra máu kinh rất nhiều, kéo dài 7-10 ngày, làm cô thường xuyên mệt và chóng mặt. Siêu âm ghi nhận khối nhân xơ tử cung kích thước 5x5x6cm, lấn vào lòng tử cung. Ngoài bệnh lý nhân xơ tử cung, vấn đề sức khoẻ đi kèm nào cần được lưu tâm?

- ☐ a. Rối loạn đông máu
- ☐ b. Ung thư nội mạc tử cung
- ☐ c. Tăng sinh nội mạc tử cung
- ☐ d. Thiếu máu

Câu hỏi 81

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

35.Cô A., 35 tuổi, PARA 2022. Được chẩn đoán áp xe phần phụ trái với kích thước 30x33mm. Hướng xử trí nào là phù hợp?

- ☐ a. Phẫu thuật nội soi
- ☐ b. Phẫu thuật mở bụng
- ☐ c. Kháng sinh khi có kết quả kháng sinh đồ
- ☐ d. Kháng sinh phối hợp ngay

Câu hỏi 83

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

30. Cô A., được chẩn đoán ung thư buồng trứng giai đoạn IA, đã phẫu thuật và đang theo dõi. Cô cần chú ý điều gì trong khẩu phần ăn?

- ☐ a. Thay gạo trắng bằng gạo lức
- ☐ b. Kiêng không sử dụng đường
- ☐ c. Cân bằng các thành phần dinh dưỡng
- ☐ d. Hạn chế thịt đỏ

Câu hỏi 84

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

90. Tầm soát đại trà ung thư vú cho người > 40 tuổi, có nguy cơ bình quân, chủ yếu dựa vào phương tiện nào?

- ☐ a. MRI vú
- ☐ b. Siêu âm vú
- ☐ c. Nhũ ảnh
- ☐ d. Tự nhận thức về vú

Câu hỏi 85

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

81. Cô A. 35 tuổi, có kết quả PAP's bình thường, HPV (+) không phải type 16 hay type 18. Cần làm gì tiếp theo?

- ☐ a. Nạo kênh cổ tử cung
- ☐ b. Soi cổ tử cung
- ☐ c. Làm lại cotesting 1 năm sau
- ☐ d. Làm lại cotesting 3 năm sau

Câu hỏi 86

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

36. Cô A. đến khám vì huyết trắng có mùi hôi, soi tươi có nhiều bạch cầu và trùng roi di động. Cô bị viêm âm đạo 4-5 lần/ năm. Ngoài việc điều trị cho cô A. can thiệp bổ sung nào là phù hợp?

- ☐ a. Dùng dung dịch vệ sinh mỗi ngày
- ☐ b. Điều trị cho bạn tình
- ☐ c. Dùng bao cao su khi quan hệ
- ☐ d. Không quan hệ trong thời gian điều trị

Câu hỏi 87

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

19. Cô A., 25 tuổi, đang được điều trị MTX vì TNTC bên trái chưa vỡ. Ngày tiêm MTX có beta hCG 3500 mUI/mL. Hôm nay ngày thứ 4 sau tiêm MTX có beta hCG 4500 mUI/mL. Khám: sinh hiệu ổn, bụng mềm không điểm đau. Can thiệp gì tiếp theo?

- ☐ a. Thử beta hCG 3 ngày sau
- ☐ b. Phẫu thuật mở bụng
- ☐ c. Tiêm thêm 1 liều Methotrexate
- ☐ d. Phẫu thuật nội soi

Câu hỏi 88

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

91. Cô A., 40 tuổi, PARA 1001, đến khám vì đau vú 1 bên 3 ngày nay. Khám vú không phát hiện sang thương, không điểm đau, không hạch vùng. Thái độ xử trí tiếp theo là gì?

- ☐ a. Tái khám 3 tháng sau
- ☐ b. Nhũ ảnh
- ☐ c. Siêu âm vú
- ☐ d. MRI vú

Câu hỏi 89

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

60. Cơ chế ngừa thai chính của viên thuốc chứa progestin liều thấp uống mỗi ngày là gì?

- ☐ a. Diệt tinh trùng
- ☐ b. Làm đặc chất nhầy cổ tử cung
- ☐ c. Ức chế rụng trứng
- ☐ d. Ngăn sự làm tổ

Câu hỏi 90

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

96. Cô A., 50 tuổi, đến tầm soát ung thư vú. Thái độ thích hợp là gì?

- ☐ a. MRI vú
- ☐ b. Khám lâm sàng
- ☐ c. Siêu âm vú
- ☐ d. Nhũ ảnh

Câu hỏi 91

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

8. Bé A., 15 tuổi, chưa quan hệ, chu kỳ không đều, 4 tháng nay không ra kinh. Hiện ra máu âm đạo rỉ rả 3 tuần. Nội mạc 8mm. Nguyên nhân nhiều khả năng nhất gây ra máu bất thường ở bé A. là gì?

- ☐ a. Rối loạn phóng noãn
- ☐ b. Bất thường giải phẫu tử cung
- ☐ c. Tăng sinh nội mạc tử cung
- ☐ d. Cả 3 nguyên nhân có khả năng như nhau

Câu hỏi 92

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

98. Cô A., 55 tuổi, béo phì, tầm soát ung thư vú bằng nhũ ảnh thường quy như thế nào?

- ☐ a. Mỗi 3-5 năm
- ☐ b. Mỗi 3-6 tháng
- ☐ c. Mỗi 6-12 tháng
- ☒ d. Mỗi 1-2 năm

Câu hỏi 93

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

39. Yếu tố tin cậy nhất giúp chẩn đoán loạn khuẩn âm đạo là gì?

- ☐ a. Có nhiều Clue cell
- ☐ b. Khí hư âm đạo dạng mũ nhầy
- ☐ c. Soi tươi huyết trắng có trùng roi di động
- ☐ d. pH âm đạo \leq 4.5

Câu hỏi 94

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

58. Cơ chế ngừa thai chính của dụng cụ tử cung chứa đồng là gì?

- ☒ a. Ngăn sự làm tổ
- ☐ b. Diệt tinh trùng
- ☐ c. Làm đặc chất nhầy cổ tử cung
- ☐ d. Ức chế rụng trứng

Câu hỏi 95

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

79. Cô A., 40 tuổi, có kết quả cotesting âm tính. Lịch tầm soát ung thư cổ tử cung tiếp theo của cô là khi nào?

- ☐ a. Sau 6 tháng
- ☐ b. Sau 5 năm
- ☐ c. Sau 1 năm
- ☐ d. Sau 3 năm

Câu hỏi 96

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

25. Cô A., 32 tuổi, PARA 1001, trễ kinh 1 tuần, QS (+) ra máu âm đạo ít rỉ rả 3 ngày nên đi khám. Khám: sinh hiệu ổn, bụng mềm, không điểm đau, âm đạo ít huyết sậm. Siêu âm: lòng tử cung trống, nội mạc 8mm, buồng trứng 2 bên bình thường, cạnh buồng trứng trái có khối echo hỗn hợp 20x22mm, ít dịch cùng đồ. Beta hCG 1700mUI/mL. Xử trí nào là phù hợp?

- ☐ a. MTX đơn liều
- ☐ b. Tái khám 2 ngày
- ☐ c. Phẫu thuật nội soi
- ☐ d. Phẫu thuật mở bụng

Câu hỏi 97

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

92. Cô A., 25 tuổi, tình cờ phát hiện u vú BIRADS 2, kích thước 0,7x0,8x1cm vị trí 1 giờ sát quầng vú. Xử trí gì tiếp theo?

- ☐ a. Phẫu thuật
- ☐ b. Progestogen
- ☐ c. Theo dõi
- ☐ d. Estrogen

Câu hỏi 98

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

100. Cô A., 38 tuổi, có chỉ định điều trị đau vú bằng nội tiết, thuốc nào được xem là lựa chọn đầu tay?

- ☐ a. Tamoxifene
- ☐ b. COCs
- ☐ c. Bromocriptine
- ☐ d. POPS

Câu hỏi 99

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

12. Hãy cho biết điểm giống nhau về cơ chế xuất huyết tử cung chức năng giữa tuổi dậy thì và tuổi quanh mãn kinh?

- ☒ a. Biên độ đỉnh LH thấp
- ☐ b. Không có đỉnh estrogen
- ☐ c. Xung GnRH không ổn định
- ☐ d. Xung FSH không ổn định

Câu hỏi 100

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

 Đặt cờ

18. Cô A., 60 tuổi, mãn kinh 10 năm, 1 tuần nay cô thấy ra máu âm đạo nên đi khám. Âm hộ bình thường, âm đạo ít máu sẫm, cổ tử cung teo, không sang thương, tử cung nhỏ, 2 phần phụ không chạm. Siêu âm: đường kính trước sau tử cung 26mm, cơ tử cung đồng nhất, nội mạc 6mm, có ít dịch lỏng tử cung, 2 buồng trứng nhỏ không u. Khảo sát nào cần thực hiện?

- ☐ a. PAP's
- ☐ b. Nạo sinh thiết kênh lòng tử cung
- ☐ c. Nội soi lòng tử cung chẩn đoán và điều trị
- ☐ d. Siêu âm bơm nước lòng tử cung