Y được TP,Hồ Chí Minh Khoa Y

ĐỂ THI LÝ THUYẾT Y4 (LẦN 1) MÔN: UNG THƯ Ngày thi: 21/05/2016 Thời gian làm bài: 40 phút (Để thi gồm có 70 câu hỏi)

- Họ tên sinh viên:	Giám thị 1	Giám thị 2
- Số báo danh:		
- Tổ: Lớp		

CHỌN 1 CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHÁT

1.	Ung	thur	cô	tű	cung	thường	gặp	nhất	ở vùng i	nào:
----	-----	------	----	----	------	--------	-----	------	----------	------

A. Đông Á

Nam Á

C. Tây Á

D. Trung Đông

E. Trung Á

2. Tuổi thường gặp nhất của ung thư cổ tử cung

A. 25-35 tuổi

B. 35-45 tuổi

45-55tuổi 40-60y

D. 55-65 tuổi

E. >65 tuổi

3. Tổn thương tiền ung thư cổ tử cung


- A. Xuất độ cao nhất là 40-45 tuổi
- B. CIN 2 có nghĩa là các tế bào dị dạng chiếm 2/3 trên bề dầy của lớp biểu mô nhưng chưa xâm lẫn màng đáy
- CIN 3 có nghĩa là các tế bào dị dạng chiếm toàn bộ bề dầy của lớp biểu mô nhưng chưa xâm lẫn màng đáy
- D. Khả năng diễn tiến thành ung thư cổ từ cung xâm lấn đối với CIN3 là 80% sau 10 năm

E. Câu C,D đúng

4. Diễn tiến tự nhiên của ung thư cổ tử cung

Á. Lan xuống âm đạo là thường gặp nhất nhưng khó đánh giá bằng khám lâm sàng

Mã để 001



D. Cường giáp E. Câu A và C đúng 11. Dịch tế học ung thư nội mạc tử cung A. Là ung thư thường gặp ở các nước đang phát triển hơn các nước phát triển B. Tuổi trung bình lúc được chấn đoán thường là 50-55 tuổi C. Có liên quan đến chế độ dinh dưỡng, béo phi D. Có liên quan đến hút thuốc lá E. Câu C và D đúng 12. Nguyên nhân ung thư cổ tử cung A. Herpes-Simplex virus (HSV) Human Papilloma virus (HPV) C. Sanh để nhiều D. Lập gia đình sớm E. Quan hệ tình dục với nhiều người 13. Yếu tố nào sau đây được xem là yếu tố thuận lợi của ung thư cổ từ cung A. Human Papilloma virus (HPV) => Nguyên nhân B. Sanh đẻ nhiều C. Quan hệ tình dục với nhiều người D. Câu B,C đúng E. Tất cả đều đúng 14. Loại giải phẫu bệnh thường gặp nhất trong ung thư cổ tử cung là A. Carcinôm tuyến B. Carcinôm tế bào gai C. Carcinôm tế bào nhỏ D. Carcinôm tế bào chuyển tiếp E. Carcinôm tế bào sáng 15. Tăng sản không điển hình nặng của nội mạc tử cung có nguy cơ diễn tiến thành ung thư xâm lần A. 25% B. 50% C. 60% D. 70% 16. Loại giải phẫu bệnh thường gặp nhất của ung thư nội mạc tử cung là: A. Carcinôm tuyến dạng nội mạc, biệt hóa cao đến trung bình B. Carcinôm tuyến dạng nội mạc, biệt hóa kém Q. Carcinôm tế bào gai, biệt hóa cao đến trung bình D. Carcinôm tuyến dạng nhú E. Carcinôm gai - tuyên 17. Giải phẫu bệnh ung thư vú, chọn câu SAI Mã đề 001

24. Một phụ nữ 59 tuổi, mãn kinh 8 năm, đến bác sĩ khám vì sở thấy một khối trong vú phải khoảng 3 tháng nay. Không tiến căn bệnh lý vú trước đó, bệnh nhân đang dùng thuốc điều trị cao huyết áp và ổn định. Khám lâm sàng sở thấy một khối 1,5 cm, chắc, giới hạn không rõ, ¼ dưới ngoài vú phải vị trí 8 giờ, cách núm vú 4 cm, it di động trong mô vú và di động tốt so với thành ngực, không dính da. Siêu âm nghĩ sang thương thay đổi sợi bọc khu trú vú phải vị trí 8 giờ. Bệnh nhân được chọc FNA dưới hướng dẫn siêu âm tương ứng vị trí này với kết quả là tồn thương lành tính. Bước xử trí tiếp theo thích hợp trên bệnh nhân này?

A. Chụp MRI vú 2 bên.

B. Chụp nhũ ảnh 2 bên

K. Sinh thiết trọn sang thương

D. Sinh thiết lõi kim sang thương

E. Chup CT-scan ngực

25. Loại ung thư nào có từ xuất cao nhất trên toàn thế giới

A. Ung thư phối

B. Ung thu gan C. Ung thư da dày

D. Ung thư buông trứng

E. Ung thu true trang

26. Ung thư ở trẻ em có các đặc tính sau đây, ngoại trừ:

A. Bướu phát triển nhanh

B. Thời gian ủ bệnh ngắn

C. Liên quan đến sự phơi nhiễm các tác nhân sinh ung

D. Có yếu tổ gia đình trong 10-15% các trường hợp

E. Thường gặp nhất là ung thư máu

27. Khi không thể có được chẩn đoán giải phẫu bệnh trên bệnh nhân nghi ngờ ung thư gan, việc chấn đoán là ung thư gan có thể dựa trên:

A. Hình ảnh bướu gan trên siêu âm, CT bụng + khối u dưới sường phải sờ được trên

B. Hình ảnh bướu gan trên siêu âm, CT bung + xét nghiệm HbsAg hoặc Anti-HCV

dương tính mạnh Hình ảnh bướu gan trên siêu âm, CT bụng + AFP/ huyết thanh > 400ng/ ml

D. Xét nghiệm HbsAg hoặc Anti-HCV dương tính mạnh + AFP/ huyết thanh dương tính

E. Tat ca deu sai

28. Yếu tố nguy cơ hàng đầu của ung thư phối

A Hút thuốc lá

B. Tiếp xúc với amiăng /

C. Nhiễm virus HPV

D. Tiền căn gia đình có ung thư phối

E. Tiếp xúc hydrocarbon vòng thơm

29. Chọn câu đúng khi nói về giải phẩu bệnh của ung thư phổi: A. Carcinôm tuyến thường xuất hiện ở vùng trung tâm của phỏi 💉

B. Carcinôm tế bảo gai là giải phẫu bệnh thường gặp nhất C. Carcinôm tế bào lớn có nguồn gốc từ tế bào thần kinh- nội tiết -

D. Carcinôm ở phối xuất phát từ biểu mô phế nang Carcinôm tế bảo nhỏ có tính xâm lấn mạnh và điển tiến nhanh

30. Phương pháp điều trị chủ yếu trong ung thư phối tế bào nhỏ



C. Liệu pháp nhắm trúng đích

D. Phẫu thuật

E. Tất cả các phương pháp trên

31. Bệnh nhân nam, 53 tuổi, đi khám vì sụt 3kg/ 2 tháng. Tiền căn: hút thuốc lá 20 gói.năm. Không bệnh lý nội ngoại khoa. CTscan ngực có sang thương như hình bên. Phương tiện nào được ưu tiên sử dụng để xác định bản chất sang thương phối?


A. Xét nghiệm đảm tìm tế bào lạ

B. Nội soi phế quản

Q. FNA xuyên thành ngực

D. Nội soi màng phối

E. Nội soi trung thất



A. Sarcôm cơ vân

B. Carcinôm đại tràng

C. Bướu nguyên bào thần kinh

D. Carcinôm phôi tinh hoàn

E. Bướu nguyên bào tùy

33. Triệu chứng thường gặp nhất của ung thư thực quản:

A. Nôn ói

B. Khàn tiếng

Nuốt nghẹn, nuốt khó

D. Hạch cổ, trên đòn.

34 Hội chứng/ triệu chứng nào sau đây không phải là hội chứng cận ung trong ung thư phôi?

A. Hội chứng Cushing

B. Ngón tay dùi trống

C Hội chứng Horner

D. Tăng tiết ADH không thích hợp /

35. Phương tiện nào sau đây dùng để tầm soát ung thư đại trực tràng đã được chứng minh có hiệu quả trong những thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có nhóm chứng?

8 Tìm máu ẩn trong phân

B. Nội soi đại tràng sigma bằng ống soi mềm

C. Chụp cản quang kép khung đại tràng với baryte

D. Nội soi khung đại tràng

E. Nội soi ào khung đại tràng

36. AFP (Alpha feto protein) tăng cao trong:

K. Carcinôm tế bào gan

B. Carcinôm đường mật trong và ngoài gan



C. Sarcôm mạch máu ở gan D. Tất cả các câu trên đều đúng 7. Tại Âu-Mỹ, ung thư gan thường liên quan đến yếu tố: A. Virut gây viêm gan B, C B. Độc tổ aflatoxin trong ngũ cốc bị nhiễm nấm mốc C Xơ gan do rượu và các bệnh lý chuyển hóa Cá 3 yếu tố trên đều đúng. Câu A và C đúng 8. Ngoài ung thư phỗi, hút thuốc lá có thể gây ung thư: A. Ung thư thực quản B. Ung thu bàng quang C. Ung thur tuy D. Ung thư thân Tất cả các câu trên đều đúng 9. Để phòng ngừa ung thư dương vật: A. Nên cắt da quy đầu thường quy cho trẻ sơ sinh theo phong tục Do Thái giáo B. Khám tiền hôn về các bệnh lây nhiễm qua đường tinh dục C Cắt đa quy đầu trước hôn nhân nếu da quy đầu đài hoặc hẹp D. Cắt da quy đầu cho trẻ nhũ nhi nếu da quy đầu dài hoặc hẹp 💨 Bệnh nhân nam, 28 tuổi, đến khám vì sờ thấy bướu ở vùng bìu (P). Siêu âm phát hiện khối echo kém 3cm trong tình hoàn (P) nghĩ bướu. Dấu hiệu sinh học nào được xét nghiệm trong trường hợp này? A. AFP, CEA và LDH P. AFP, β -HCG và LDH C. β -HCG, PSA và CEA D. LDH, β-HCG và CA 125 41. Sau khi có kết quả xét nghiệm, để xác định bản chất bướu trong tinh hoàn (P), điều cần làm tiếp theo: X. FNA bướu tinh hoàn (P) B. Cắt trọn tinh hoàn (P) qua ngã bìu C. Sinh thiết một phần bướu tính hoàn (P) Cắt trọn tính hoàn (P) qua ngã ben 42. Trường hợp trên sẽ được xếp vào loại bướu tế bào mầm tinh hoàn nếu có giải phẫu bệnh là, ngoại trừ: Bướu tế bào Leydig b. Sêminôm c. Bướu túi noãn hoàng d. Carcinôm phôi 43. Khàn tiếng là triệu chứng có thể gặp ở ung thư nào? A. Ung thư tuyến giáp B. Ung thư phối 🔑 . Ung thu thực quản D. Câu A và B đúng Mã để 001

N Câu A,B,C đúng

- 44. Các thuốc điều trị tại chỗ trên đa có hiệu quá đối với sang thương loại nào
 - B. Carcinôm tế bào đáy của đa
 - C. Carcinóm tế bào gai của da
 - D. Carcinôm tuyến bã của đa
 - E. Tất cá đều sai
- 45. Bệnh nhân nam 75 tuổi nhập viện vì vết loét không lành ở mặt 2 năm nay. KPS 80. Khám lâm sáng vết loét rãnh mũi môi (T) đường kính 1,5cm giới hạn rõ, bờ gỗ cao ngắm sắc tố đen. Tiền căn cao huyết áp đang điều trị, COPD. Phương pháp sinh thiết phù hợp đối với bệnh nhân nây là:
 - A. Sinh thiết lạn bướu
 - Sinh thiết bằng kêm bấm
 - C. Sinh thiết trọn
 - D. Sinh thiết bằng kim nhỏ
 - E. Sinh thiết lõi kim
- 46. Kết quả sinh thiết là mô việm mạn tinh. Bước xứ trí thích hợp tiếp theo là

 - B. Phẩu thuật lấy trọn sang thương
 - C. Theo dôi thêm
 - D. A. B đúng
 - E. Tất cả đều đúng
- 47. Bệnh nhân nữ 55 tuổi ở quận Bình Thạnh, TPHCM. Cách nhập viện 6 tháng bệnh nhân phát hiện vết loét vùng má (T) không lành. Cách nhập viện 2 tuần bệnh nhân đi khám tại bệnh viện tư được chấn đoán là ung thư da và được cắt rộng sang thương. Giải phẩu bệnh sau mố: carcinôm tế bảo đáy, diện cắt bên (+) nên chuyển bệnh viện Ung Bướu. Hiện KPS 70, seo mô vùng má (T) lành tốt, mô dưới seo hơi sượng. Xử trí thích hợp cho bệnh nhân này là:
 - K. Cắt rộng seo và tạo hình
 - B. Xa tri
 - C. Theo dõi thêm
 - D. Kem 5-FU
 - E. Hóa tri
- 48. Carcinôm tuyến giáp dạng nhú, chọn câu đúng
 - K. Chiêm 20-30% các trường hợp ung thư tuyến giáp mới mắc
 - B. Cắt giáp toàn phần là phẫu thuật chọn lựa ngay cả khi bướu nhỏ <1cm.</p>
 - C Rất nhiều trường hợp có tính đa ổ trên vi thể
 - D. Hiểm khí cho di căn hạch cổ ở những bệnh nhân dưới 15 tuổi
 - E. Là bệnh có tiên lượng xấu trong ung thư đầu cổ
- 49. Loại ung thư nào sau đấy thường tho di căn não?
 - A. Ung thư gan và ung thư đại trang +
 - B. Ung thư đại trắng và ung thư tụy *
 - C. Ung thư tụy và ung thư phôi
- D Ung thư phối và ung thư vú
- Ung thư vú và ung thư gan

50. Bệnh nhân nữ, 35 tuổi khám sức khỏc định kỳ phát hiện một nhân giáp thủy trái; không có tiền căn xạ trị và gia đình không ai bị ung thư giáp. Siêu âm cổ phát hiện nhân giáp thủy trái 2cm, echo kém, vi với hóa và hạch cổ nhóm III (T) 0.8 cm, echo kêm, mắt rồn hạch . Xét nghiệm máu TSH, FT3, FT4 bình thường. Xét nghiệm cần A. CT-scan vùng cổ có cản quang B FNA nhân giáp và hạch cổ C. Xa hình tuyến giáp D. Câu A và B đúng E. Câu A,B,C đúng 51. Chẩn đoán lâm sàng: Carcinôm tuyến giáp dạng nhú di căn hạch cổ (T). Xếp giai đoạn bệnh trên bệnh nhân này? K. Giai doan I B. Giai doạn II C. Giai doan III D. Giai doan IV Tắt cả đều sai Chưa xác định được có M1 hay không? ????? 52. Diểu trị cho bệnh nhân trên: A) Cắt giấp toàn phần, nao hạch cổ trái B. Cắt giáp toàn phần C. Cắt giáp toàn phần nạo hạch cổ hai bên D. Cắt trọn thủy trái, nạo hạch cổ trái E. Một lựa chọn khác 53. Bệnh nhân nam, 42 tuổi, được chẳn đoán carcinôm tuyến giáp không biệt hóa. Siêu âm có hạch cổ (P) 1 cm nghi ngờ di căn. Các xét nghiệm khác chưa phát hiện di căn xa. Xếp giai đoạn trên bệnh nhân này, chọn câu đúng: A. Cần xác định giải phẫu bệnh của hạch cổ mới xếp giai đoạn được B. Cần biết thêm thông tin về kích thước bướu giáp C. Cần biết thêm thông tin bướu có xâm lấn dây thần kinh quặt ngược hay chưa Dã đủ dữ kiện xếp giai đoạn IV cho bệnh nhân E. Câu A và B đúng 54. Tiêm vắc xin ngừa HPV phòng ung thư cổ tử cung, chọn câu SAI Hiệu quả tốt nhất là ở người chưa quan hệ tình dục B. Người đã quan hệ tình dục vẫn có hiệu quả Tiêm ngừa càng sớm càng tốt trong độ tuổi cho phép Tiêm ngừa càng gần thời điểm bắt đầu quan hệ tinh dục càng tốt vì hiêu quá bảo vệ sẽ Boo xuất phát:
phát xuất từ tế bào nang giáp (90%)
số phát xuất từ tế bào cận nang (5-9%)
phát xuất từ tế bào nang giáp (1-2%)
phát xuất từ tế bào miễn dịch (1-3%) cao hon E. Câu A và D sai 55. Đột biến gen trong ung thư tuyến giáp A. Carcinom tuyến giáp dạng nhú thường có đột biến gen HRAS phát xuất từ tế bào trung mô (< 1%) áp có the puair sana deo usen usen sang na<u>kóli) diễn tiến châm;</u> carcinôm dạng nhỏ carcinôm dạng nang. (B.) Carcinôm tuyến giáp dạng nang thường có đột biến gen RAS Carcinôm tuyến giáp dạng tùy thường có đột biến gen RET/PTC D. Carcinôm tuyến giáp không biệt hóa thường có ít đột biến gen 56. Khi khai thác tiền căn bệnh lý ung thư tuyến giáp cần lưu ý các vấn đề sau A. Tiền căn có tiếp xúc với phơi nhiễm phóng xạ trước đây hay không Mã để 001

B. Tiền căn gia định có ai mắc bệnh ung thư tuyến giáp trước đó hay không Bệnh nhân có tiền sử bệnh ung thư tuyến vú trước đó hay không Câu A và B đúng E. Tất cá các câu đều đúng. Yeu tố tiên lượng quan trọng nhất của sarcôm mô mềm? . Tuối B. Vị trí bướu C. Kích thước bướu D. Grad mô học E. Di căn hạch 58. Loại sarcôm mô mềm nào ít cho di căn hạch? A. Sarcôm mỡ B. Sarcôm mạch máu C. Sarcôm tế bào sáng D. Sarcôm cơ vân E. Sarcôm dạng biểu mô 59. Yếu tố tiên lượng xấu trong ung thư vú, ngoại trừ: A. Tuổi trẻ B Còn kinh nguyệt Thụ thể ER, PR dương tính D. Biểu hiện quá mức thụ thể HER2 E. Tất cả đều sai 60. Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nổi về ung thư dạ dày? A. Bệnh thường gặp ở các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản B. Bệnh gặp ở nam nhiều hơn nữ C. Phần lớn bệnh nhân được phát hiện bệnh vào giai đoạn trễ Tiên lượng tốt nhất trong ung thư ống tiêu hóa E. Có mối liên quan giữa bệnh với môi trường và chế độ ăn uống. 61. Đặc điểm của ung thư dạ dày không thuộc tâm vị: A. Thường gặp ở khu vực có tỉ lệ ung thư dạ dày cao B. Có liên quan chặt chẽ đến nhiễm Helicobacter pylori C Tiên lượng xấu hơn ung thư tâm vị D. Câu a và b đúng E. Câu a,b,c dúng 62. Triệu chứng nào sau đây gọi ý bướu dạ dày ở tâm vị? A. Đau thượng vị kéo dài Nuốt nghọn tăng dần C. Nôn ói ra thức ăn cũ D. Cảm giác nóng rát thượng vị E. Sờ thấy bướu thượng vị lệch (P) 63. Nhận định nào không đúng về ung thư đại trực tràng? A. Được xếp vào 1 trong 10 loại ung thư thường gặp nhất ở Việt Nam. • M. Tây Âu và Australia là khu vực "nguy cơ cao" của bệnh này

E. Tỉ lệ sống còn 5 năm ở giai đoạn sớm đạt 90%

64. Độ tuổi nguy cơ của ung thư đại trực tràng: A Tuổi là yếu tố nguy cơ không thể tránh khỏi

B. 70 – 90 % trường hợp mắc bệnh ở độ tuổi > 75 50

C. Bệnh đang có xu hướng giảm dần ở lứa tuổi trẻ

D. Câu a và b đúng E. Câu a,b,c đúng

65. Nguyên tắc phẫu thuật trong ung thư đại tràng, chọn câu sai:

A. Thám sát đầy đủ và chính xác ổ bụng

B. Thất mạch mấu nuôi cao và giảm thiều tác động đến bướu

C. Bờ mép diện cắt an toàn về mặt ung thủ học

Đánh clip vào những vị trí có hạch đi căn E. Đánh giá giải phẫu bệnh ít nhất 12 hạch


66. PSA là kháng nguyên đặc hiệu của tuyến tiền liệt, được dùng đế:

A. Tầm soát ung thư tuyến tiền liệt B. Chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt

C. Theo dõi sau điều trị ung thư tuyến tiền liệt

D. Cả 3 câu trên đều đúng E. Câu B và C đúng

67. Quan sát hình vẽ giải phẫu tuyến tiền liệt, hãy cho biết carcinôm tuyến tiền liệt thường gặp nhất ở vị trí nào? Các lựa chọn a,b,c,d,e tương ứng với các phân khu trong hình vẽ.




68. Người ta không lựa chọn xạ trị là mô thức điều trị hỗ trợ cho loại ung thư nào?

A. Carcinôm ống tuyến vú

B. Carcinôm tế bào gai cổ từ cung

Carcinôm tuyến đại tràng (P)

Mã để 001



--HÉT--