

MCQ Questions

Câu hỏi

1 Nguyên nhân sâu xa của xuất huyết tử cung cơ năng tuổi dậy thì liên quan đến hiện tượng nào?

A. ☐ Tuyến yên chưa trưởng thành về chức năng

~~**B.**~~ ☒ Nhịp độ của các xung GnRH quá thưa thớt

C. ☐ Nhịp độ của các xung GnRH quá dày đặc

D. ☐ Tuyến yên không nhạy cảm với xung GnRH

2 Khảo sát nội tiết ở một thiếu nữ bị xuất huyết tử cung cơ năng tuổi dậy thì, ghi nhận điều gì?

A. ☐ AMH thấp

B. ☐ Inhibin B thấp

~~**C.**~~ ☒ Progesterone thấp

D. ☐ Estradiol thấp

3 Điều trị một trường hợp xuất huyết tử cung tuổi dậy thì, bạn nhắm đến mục tiêu nào?

A. ☐ Thiết lập được một phóng noãn hằng định

~~**B.**~~ ☒ Thay thế tạm thời hoàng thể bị bất toàn

C. ☐ Thúc đẩy tiến trình phát triển

Thời gian còn lại

0:8:14



Số báo danh

20190501_9190

SUBMIT

IF AT			
C1	A	★	C
C2	A	B	★
C3	X	★	C
C4	★	B	C
C5	A	B	★
C6	X	X	X
C7	★	X	X
C8	X	X	★
C9	X	B	X
C10	A	X	★
SCORE:2			

noãn nang

D. ☐ Giải phóng trực khỏi tình trạng bị ức chế

4 Trong hội chứng buồng trứng đa nang, sản phẩm chế tiết chủ yếu của nang noãn là chất nào?

- ~~**A.**~~ ☐ Dihydroepiandrosterone
B. ☐ Pregnenolone
C. ☐ Các estrogen (bao gồm cả E1 và E2)
D. ☐ Progesterone

5 Một phụ nữ vô kinh nguyên phát, FSH và LH rất cao, bạn định hướng đến nguyên nhân nào?

- A.** ☐ Nguyên nhân hạ đồi
B. ☐ Nguyên nhân tuyến yên
~~**C.**~~ ☐ Nguyên nhân buồng trứng
D. ☐ Nguyên nhân cơ quan Mullerian

6 Một phụ nữ với hội chứng buồng trứng đa nang, cần được điều trị ra sao?

- A.** ☐ Dùng progestogen có hoạt tính kháng androgen
B. ☐ Dùng các chất thúc đẩy sản xuất FSH nội sinh
C. ☐ Giảm cân và dùng các chất tăng nhạy insulin
~~**D.**~~ ☐ Chọn một trong 3 điều trị

IF AT			
C1	A	★	C
C2	A	B	★
C3	X	★	C
C4	★	B	C
C5	A	B	★
C6	X	X	X
C7	★	X	X
C8	X	X	★
C9	X	B	X
C10	A	X	★
SCORE:2			

trên, tùy mục tiêu

7 Trong xuất huyết tử cung bất thường quanh mãn kinh, so sánh sinh thiết bằng nong nạo, ống Pipelle và sinh thiết qua soi buồng tử cung, bạn nhận thấy điều gì?

A. ☒ Sinh thiết bằng ống Pipelle là ưu tiên trong phần lớn các trường hợp, nếu không có tổn thương khu trú

B. ☐ Sinh thiết dưới soi buồng tử cung là lựa chọn trước tiên do khả năng tiếp cận chính xác tổn thương

C. ☐ Nong cổ tử cung và nạo sinh thiết buồng tử cung là ưu tiên do ít có nguy cơ bỏ sót tổn thương

D. ☐ Cả 3 phương pháp khảo sát là tương đương về độ nhạy, độ chuyên biệt, âm giả và dương giả

IF AT			
C1	A	★	C
C2	A	B	★
C3	X	★	C
C4	★	B	C
C5	A	B	★
C6	X	X	X
C7	★	X	X
C8	X	X	★
C9	X	B	X
C10	A	X	★
SCORE:2			

8 Thăm dò một trường hợp xuất huyết tử cung quanh tuổi mãn kinh, mục tiêu nào là ưu tiên nhất?

A. ☐ Xác định có rối loạn phóng noãn qua tổng soát nội tiết

B. ☐ Khảo sát tình trạng dự trữ noãn nang tại buồng trứng

C. ☒ Xác định có hay không có một nguyên nhân thực thể

D. ☐ Đánh giá ảnh hưởng toàn thân của giảm steroid sinh dục

9 Một phụ nữ tuổi sinh đẻ, bị không phóng noãn do thiếu năng hạ đồi, cần được điều trị ra sao?

A. ☐ Dùng bơm tạo xung GnRH ngoại sinh

B. ☐ Dùng gonadotropin FSH và LH ngoại sinh

C. ☐ Dùng estrogen và progesterone ngoại sinh

~~**D.**~~ ☐ Chọn một trong 3 điều trị trên, tùy mục tiêu

10 Điều trị xuất huyết tử cung hậu mãn kinh đã loại trừ bất thường ác tính ở nội mạc tử cung, ưu tiên chọn được chất nào là dược chất đầu tay?

A. ☐ Ethinyl estradiol

B. ☐ Dydrogesterone

~~**C.**~~ ☐ Acid tranexamic

D. ☐ Progestogen

IF AT			
C1	A	★	C
C2	A	B	★
C3	X	★	C
C4	★	B	C
C5	A	B	★
C6	X	X	X
C7	★	X	X
C8	X	X	★
C9	X	B	X
C10	A	X	★
SCORE:2			