

ĐỀ NHI

1. Đi loạn choạng tổn thương ở đâu
 - a. Tiểu não
2. TCM tự hết trong bao nhiêu ngày
 - a. 7 ngày
3. 1 ca sốt 3 ngày, 38°C, khám không có gì, hỏi độ mầy?
 - a. IIA
4. Hỏi xử trí?
 - a. Cho nhập viện, nằm phòng thường
 - b. Cho nhập viện vì nhà xa
 - c. Cho nằm cấp cứu
5. 1 ca 2B nhóm II (đi không vững hay rung thân gì đó), hỏi xử trí
 - a. Nằm cấp cứu, truyền ngay IVIG
 - b. Nằm cấp cứu theo dõi 6h để quyết định có truyền IVIG không
6. Đường lan của TCM?
 - a. Đường miệng
 - b. Đường hô hấp
 - c. Đường da
7. Liệt 1 tay là tổn thương ở đâu?
 - a. Neuron sừng trước tủy sống
8. HA tăng hỏi tổn thương ở đâu?
 - a. Hệ TKTV
9. Còn 2-3 câu nữa không nhớ
10. Rắn nào sau đây là rắn lành?
 - a. Mai gầm
 - b. Rắn ráo
11. Bé gái ngạt nước tím tái đang ở trong nước, bạn là người cứu bé, làm gì đầu tiên?
 - a. Đưa ngay vào bể bơi
 - b. Thổi ngạt
 - c. Ấn tim
12. 1 ca bị ngạt nước vô thở NKQ, $PaO_2 = 80$; $PaCO_2 = 20$; hỏi chỉnh máy, cho thở máy tần số 30 l/p; $FiO_2 = 80\%$?
 - a. Tăng oxy
 - b. Giảm tần số thở
 - c. Tăng tần số thở
13. Nguyên nhân không gây khò khè mạn?
 - a. Dị vật thanh quản
14. Nguyên nhân không gây khò khè mạn?
 - a. VTPQ tắc nghẽn
 - b. Phù phổi
15. 1 ca N1-N2 ho sổ mũi, N3 khò khè, sốt 38°C, hỏi CĐ?
 - a. VTPQ
16. XQ thấy 9 cung sườn, vòm hoành dẹt, tăng sáng 2 phế trường, có dạng nốt lưới 2 bên không có tính hợp lưu?

- a. Ứ khí, viêm phổi mô kẽ
17. Làm CTM cho bé trên ra MCV = 80; MCH = ?, WBC tăng, NEU 80%, hỏi kết luận
a. Thiếu máu đẳng sắc đẳng bào, nhiễm vi trùng
b. Thiếu máu đẳng sắc đẳng bào, nhiễm siêu vi
18. Sau nó bé sốt cao, đừ, bỏ bú, hỏi CD?
a. VTPQ bội nhiễm
b. Viêm phổi do vi trùng
19. Khò khè nào sau đây phải điều trị, chọn câu sai?
a. Khò khè đơn thuần
20. Triệu chứng nào sau đây không gợi ý khò khè do hen?
a. Khò khè khi thay đổi tư thế
21. Triệu chứng nào sau đây không gợi ý khò khè do hen?
a. Khò khi cảm lạnh
22. Chỉ định nuôi ăn TM cho trẻ VTPQ?
a. Nuôi ăn qua sonde không đạt 80 ml/kg/ngày
b. Co lõm ngực nặng
c. Thở > 70 l/p
d. Tăng công hô hấp rõ khi ăn, bú
23. Dấu hiệu nào sau đây không gợi ý VTPQ nguy kịch?
a. Tím tái
b. PaO₂ không đạt 50 mmHg với FiO₂ = 80%
c. Rối loạn tri giác
d. ???
24. Bé gái 18 tháng, thiếu máu gan lách to độ 1, ít nghĩ gì?
a. G6PD
25. 1 ca bé 3-4t, gan lách độ 2, da xanh niêm nhạt, hỏi CD?
a. Thalass
26. Hỏi làm XN gì để CD?
a. Điện di Hb
27. 1 ca bé 1-2 t, gan lách to độ 1, ăn ít cháo (hình như ½ chén cháo x3), uống sữa nhiều (~700-800 mL), hỏi nguyên nhân nghĩ nhiều nhất?
a. Thiếu máu thiếu sắt
28. Làm CLS cho bé?
a. Ferritin
29. Cho CTM kết quả thiếu thiếu máu HC nhỏ nhược sắc (Hb ~ 8 g/dL), hỏi đọc kết quả CTM, eos tăng, HCL 8%, RDW = 18?
a. Dòng BC bình thường
b. Thiếu máu đẳng sắc đẳng bào
c. Thiếu máu HC nhỏ nhược sắc
30. Hỏi kết luận nguyên nhân thiếu máu của BN?
a. Thiếu máu thiếu sắt cấp do giun móc
b. Thiếu máu thiếu sắt do nhiễm KST
31. XHGTC miễn dịch khi nào cho làm tủy đồ?
a. Ngay khi CD

b. Sau 6 tháng điều trị ko đáp ứng

32. 1 ca XHGTC da + niêm hời điều trị gì?

a. Pred uống

33. Chọn câu sai về XHGTCMD ở trẻ em?

a. Thường gặp trong bệnh cảnh lupus, hiv

34. Chọn câu sai về XHGTCMD ở trẻ em?

a. Giảm cả hồng cầu lẫn tiểu cầu

35. Cơ chế của Pred trong điều trị XHGTCMD?

a. Làm bền thành mạch

b. Giảm bắt giữ tiểu cầu

c. Ức chế tạo kháng thể

d. Cả 3 đều đúng

36. Cơ chế giảm TC trong XHGTC miễn dịch?

a. Ức chế tại trung ương, tăng phá hủy ngoại biên

37. Đặc điểm nào là phù hợp với xuất huyết do hemophilia?

a. Xuất huyết thường gặp ở cơ, khớp

b. Xuất huyết tự nhiên

38. Điều nào sau đây là đúng khi điều trị xuất huyết não do hemophilia?

a. Bù YTĐM càng sớm càng tốt

b. Đợi XN yếu tố đông máu rồi mới bù

c. Phải CT, SÂ não trước rồi mới bù

d. Cần nâng YTĐM lên tối thiểu 50%

39. Nguyên nhân gây TMTS?

a. Sinh già tháng

b. Cho bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu

~~c. Ăn dặm trễ sau 6 tháng~~

40. Dấu hiệu nào trên LS cho thấy bù trừ của hệ giao cảm đã quá mức và gây nguy hiểm?

a. Rối loạn nhịp

b. Hạ HA

c. Tim nhanh

41. PDA mà bù trừ theo Laplace thì biểu hiện gì?

a. Phì đại ly tâm, tăng thể tích thất T

b. Phì đại hướng tâm, giảm thể tích thất T

c. Phì đại ly tâm, giảm thể tích thất T

d. Phì đại hướng tâm, tăng thể tích thất T

42. Bệnh nào gây phì đại hướng tâm theo Laplace?

a. TOF

b. PDA

c. ASD

d. VSD

43. Thuốc CCĐ hẹp eo ĐMC?

a. Digoxin

b. Acei

44. Cơ chế gì đó về β blocker?

- a. Thụ thể lặn hết vào trong TB cơ tim
45. Bé gái 2 tháng sinh non nhẹ ký vô viện có mạch nẩy mạnh chìm nhanh, AT 2 thì ở KLS II-III lan bờ T xương ức, chi mát, da xanh, gan to 2-3 cm HSP, không phù, nghe rale ẩm ở phổi, co lõm ngực TB, có chậm tăng trưởng (hình như cân nặng của nó gần bằng cân nặng lúc sinh). Hỏi CĐ?
- a. PDA
46. Điều trị?
- a. Digoxin, Furo
b. Digoxin, Furo, Cap
47. Ross?
- a. I
b. II
c. III
d. IV
48. Tác nhân không thuộc TORSCH?
- a. GBS
b. Viêm gan B
49. Yếu tố nào không phải dấu hiệu nguy cơ của NTSS?
- a. Mẹ nhiễm trùng tiểu không điều trị
b. Vỡ ối > 30h
c. Vàng da vào giờ 48h
50. Hỏi nhận xét sai về NTSS?
- a. NTSS sớm là do lây từ mẹ qua đường niệu dục
b. NTB là NT trong vòng 7 ngày kể từ khi xuất viện
c. Mốc 3 ngày là để phân biệt NTSS sớm và muộn
51. Yếu tố nào sau đây gợi ý NTSS?
- a. Lúc 12h CRP = 20
52. Bé có nhiễm trùng rốn, mủ máu, đỏ tấy lan ra 2 cm quanh rốn, hỏi điều trị nào là thích hợp?
- a. Nhập viện
53. Ca trên điều trị sai?
- a. Rửa rốn, băng lại
b. Rửa rốn, để thoáng
c. Cấy máu, cấy dịch
54. YTNC NTSS muộn?
- a. Sinh non
b. Nhiễm GBS
55. Dịch tễ học của co giật
- a. Thường gặp ở trẻ 6 tháng – 3 tuổi
56. Yếu tố nào làm tăng khả năng sốt co giật tái phát?
- a. Co giật trong vòng 24 giờ kể từ khi sốt
b. Co giật lần đầu ở trẻ < 12 tháng
57. RLĐG nào sau đây không gây ra co giật?
- a. Hạ Kali
b. Hạ Magie
c. Hạ Natri Tăng Natri??

- d. Hạ Calci *0.15-0.2 (max 5mg với trẻ <5 tuổi)*
58. Trẻ 3 tuổi 30 ký, hỏi liều diazepam?
- a. 5 mg
 - b. 6 mg
 - c. 8 mg
59. Cắt cơn đầu tiên chọn thuốc gì?
- a. Mida
 - b. phenobarbital
60. Tỷ lệ FSGS ở trẻ < 8 tuổi?
- a. < 10%
 - b. 20%
 - c. 30%
61. 1 câu vô có tam chứng cushing (mạch chậm và HA cao, hô hấp bình thường), bệnh cảnh viêm màng não, hỏi điều trị gì?
- a. Mannitol
62. 1 câu vô u não, hỏi chọn điều trị gì để làm giảm áp lực nội sọ?
- a. Dexamethasone
 - b. Mannitol
 - c. NaCl 3%
63. Tỷ lệ đáp ứng cort ở FSGS
- a. 20- 30%
64. Tỷ lệ FSGS ở trẻ HCTH?
- a. 7 – 10%
65. Hóa chất để nhuộm trong miễn dịch huỳnh quang, ko dùng cái nào?
- a. Nitrit
 - b. Triochrome
 - c. Bạc
66. 1 bé hcth vô sốt, đỏ 1 vùng da ở vùng, những vùng khác ko đỏ ko đau, hỏi CD?
- a. Viêm mô tế bào
67. VCTC chỉ định sinh thiết thận?
- a. Có biểu hiện HCTH
 - b. Sau 1 tuần vẫn còn HA cao
68. XN giá trị nhất trong CD nguyên nhân VCTC?
- a. ASO
 - b. Phết họng
 - c. Bổ thể
69. BN vô tiểu máu toàn dòng, lần đầu, tiền căn gia đình ko có bất thường, TC chạy chơi?, làm xét nghiệm gì?
- a. Bổ thể
70. 1 câu VCTC vô HA 160, phù, nhức đầu, rale ẩm ở phổi, hỏi điều trị?
- a. Furo truyền
 - b. Furo uống
 - c. Nifedipine uống hay truyền gì đó
71. Bé được CD VCTC, sau 3 tháng vẫn còn C3 giảm, hỏi CD hiện tại nghĩ là gì?

- a. Bệnh cầu thận màng
- b. Bệnh thận IgA
72. 1 ca VCTC y chang đề tốt nghiệp L1 của Y15
73. 1 ca HCTH cách nhập viện 7 tháng bị lần đầu, từ đó đến nay bị tái phát 2 lần; lần đầu là sau khi ngưng cort đc 7 ngày, lần 2 là đang dùng 5 mg cách ngày?
- a. Lệ thuộc cort liều thấp
74. Bé gái suy tim do tbs cho cái hình 4 đưa trogn SGK (sdd mạn tiến triển, sdd mạn hồi phục, sdd cấp, bình thường), hỏi nó thuộc hình nào?
- a. A: sdd mạn tiến triển
75. Bé nam, 6 tuổi, BMI = 1.x; có tình hoàn teo, bàn tay nhỏ, hỏi bị gì?
- a. Thừa cân
- b. Béo phì
76. Trẻ sinh non nhẹ cân thì nguy cơ mắc bệnh nào, ngoại trừ?
- a. COPD
- b. THA
- c. Bệnh thận
77. Nguyên nhân của ca trên?
- a. Suy giáp
- b. Down
- c. Prader-Willi
78. XN để CĐ
- a. TSH
- b. NST đồ
79. Can thiệp SDD hiệu quả nhất là trong khoảng thời gian nào?
- a. 1000 ngày sau sinh
- b. 2 năm đầu đời
80. Có mấy câu cho SD xong hỏi CĐ =.= ko nhớ nổi
81. Khởi đầu điều trị bên nhân VK thiếu niên dựa vào yếu tố nào là quan trọng nhất?
- a. Theo phân nhóm của EULAR
- b. Phân theo hoạt tính bệnh của JADAS
- c. Tiên lượng kém
- d. Tổn thương xương trên XQ
82. DMARDs xài khi nào?
- a. Khi không đáp ứng với NSAID và/hoặc cort
83. Yếu tố quan trọng nhất để CĐ viêm khớp dạng thấp thiếu niên?
- a. Kéo dài > 6 tuần
- b. < 16 tuổi
- c. Đã loại trừ các bệnh lý khác
84. ĐTD hỏi cách chia liều theo cổ điển (cho số kí luôn rồi bắt tính liều chi tiết)?
85. ĐTD đang dùng phác đồ cổ điển, có ĐH buổi trưa tăng cao, hỏi điều chỉnh insulin?
- a. Tăng liều insulin TD nhanh buổi sáng
- b. Tăng liều insulin NPH buổi sáng
86. Kháng thể nào không có trong ĐTD typ1?
- a. IAA

- b. ICA
 - c. Anti-GAD
 - d. ???
87. Để phân biệt T1DM vs T2DM thì dùng xét nghiệm nào có độ tin cậy cao hơn?
- a. Insulin
 - b. Peptide C
88. ĐTĐ nên tiêm insuline trước ăn bao lâu?
- a. 30p
89. 1 ca bé ĐTĐ vô có 4 nhiều, HbA1 = 13%; ĐH đo bất kỳ? cỡ 300 mg/dL hỏi làm gì?
- a. Cho nhập viện điều trị insulin
 - b. Chờ làm XN có kết quả rồi chiều cùng ngày cho NV
 - c. Điều trị với metformin
90. 1 ca vô chi mát, ceton niệu (+); ĐH ~ 300, nôn ói, sốt (giống đề cũ), hỏi cỡ?
- a. Toan ceton
 - b. Tăng ĐH thoát qua trong sốc nhiễm trùng
 - c. Tăng ĐH thoát qua trong sốc giảm thể tích
91. Khuyết điểm của phác đồ cổ điển?
- a. Khó kiểm soát đường huyết
 - b. Tăng đường huyết buổi trưa
92. Bệnh nào sau đây ở VN kiểm soát kém nhất?
- a. Ho gà
 - b. Uốn ván
 - c. Lao
 - d. VGB
93. Thành phần để tăng cường đáp ứng miễn dịch?
- a. Muối nhôm
 - b. Neomycin
 - c. Trứng gà
 - d. Nước muối sinh lý
94. Vaccin OPV chứa thành phần nào
- a. Type 1, 2, 3
 - b. Type 1, 3
95. Bé 4.5 tháng, đã tiêm 2 mũi 5 trong 1 (mũi cuối cách 2 tuần), hỏi tiêm vaccin gì cho bé?
- a. Rotavirus (giờ ko tiêm thì mai mốt tiêm ko kịp)
 - b. Phế cầu cộng hợp
96. 23 tháng, đã tiêm 3 mũi 6 trong 1, đã tiêm sởi quai bị rubella, đã tiêm VNNB 2 mũi, giờ hỏi tiêm gì cho bé?
- a. Nhắc lại combe five
 - b. Tiêm VNNB
97. Câu nào sai về hệ miễn dịch thích nghi (đặc hiệu)?
- a. Phản ứng ngay khi vật lạ xâm nhập
98. Vaccin nào không nằm trong TCMR của VN?
- a. Thương hàn
 - b. Viêm gan A