



# NỘI KHOA (INTERNAL MEDICINE Y6)

Dashboard ► My courses ► NOIY6 ► PRE-TEST - ĐỢT 1 - 2021 ►

Pretest Tiếp cận điều trị suy tim mạn 14/11/2021

## Question 1

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Bệnh nhân nam 70 tuổi, chẩn đoán suy tim toàn bộ NYHA III, hội chứng vành mạn, tăng huyết áp. Thuốc đang điều trị: Lisinopril, Metoprolol, Aspirin, Atorvastatin. Siêu âm tim có phân suất tổng máu (EF) 30%. Thuốc bổ sung trong điều trị cho bệnh nhân này là gì?

- ☐ a. Digoxin
- ☒ b. Spironolactone
- ☐ c. Indapamide
- ☐ d. Nitrate

**Question 2**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Bệnh nhân nam 60 tuổi, suy tim 2 năm nay do bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ, đã được đặt một stent LAD. Đang dùng thuốc Enalapril 5 mg 1 viên x 2 uống, Bisoprolol 2,5 mg 1 viên uống, Aspirin 81 mg 1 viên uống, Atovastatin 20 mg 1 viên uống. Gần 1 tuần nay bệnh nhân phù nhiều 2 chân, mệt hơn khi nằm ngủ một gối. Nằm cao hai gối thì dễ chịu. Khám mạch 100 lần/phút, huyết áp 120/80 mmHg. Tim T1 - T2 đều, không gallop, phổi không ran. Bụng mềm, gan không to. Phù 2 mu chân. Siêu âm tim gần nhất ghi nhận phân suất tổng máu (EF) là 30%. Điều trị nào sau đây là phù hợp cho bệnh nhân?

- ☐ a. Tăng liều Enalapril
- ☒ b. Thêm Furosemide
- ☐ c. Thêm Digoxin
- ☐ d. Tăng liều Bisoprolol

thêm lợi tiểu, điều trị triệu chứng  
hay tăng BB để hạ nhịp tim

**Question 3**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Bệnh nhân nam 55 tuổi, suy tim 5 năm nay do tăng huyết áp, hen 3 năm đang dùng thuốc giãn phế quản. Thuốc tim mạch đang dùng: Enalapril và Amlodipin. Bệnh nhân không khó thở khi sinh hoạt hàng ngày và hoạt động thể lực thông thường. Khám mạch 90 lần/phút, huyết áp 120/80 mmHg. Tim T1 - T2 đều, phổi không ran. Bụng mềm, gan không to. Không phù chân. Siêu âm tim gần nhất ghi nhận phân suất tổng máu (EF) là 38%. Chiến lược điều trị nào sau đây là thích hợp cho bệnh nhân?

- ☐ a. Thêm Diltiazem
- ☒ b. Thêm Ivabradin
- ☐ c. Thêm Digoxin
- ☐ d. Thêm Metoprolol

non-DHP CCB có CCD cho suy  
tim EF giảm  
BB CCD cho hen

**Question 4**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Bệnh nhân suy tim mạn có phù nhẹ ở hai mắt cá chân khi ấn. Thuốc lợi tiểu nào được chọn?

- ☐ a. Lợi tiểu quai
- ☐ b. Lợi tiểu quai + Kháng Aldosterone
- ☐ c. Kháng Aldosterone
- ☒ d. Thiazide

**Question 5**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Thuốc lợi tiểu được sử dụng ở bệnh nhân suy tim mạn khi có dấu hiệu nào sau đây?

- ☐ a. Lớn tim
- ☐ b. Giảm tưới máu ngoại biên
- ☒ c. Sung huyết ở phổi hay ở ngoại vi
- ☐ d. Mạch nhanh > 100 lần/phút

**Question 6**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Khi bệnh nhân suy tim mạn có dấu hiệu sung huyết ở phổi hoặc có dấu hiệu phù ở ngoại vi, loại thuốc nào sau đây nên sử dụng cho bệnh nhân?

- ☐ a. Kiểm soát nhịp tim
- ☐ b. Tăng co bóp cơ tim
- ☐ c. Dẫn mạch
- ☒ d. Lợi tiểu

**Question 7**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Sự lựa chọn lợi tiểu quai hay thiazide trong điều trị suy tim mạn phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

- ☐ a. Trị số huyết áp
- ☒ b. Độ lọc cầu thận
- ☐ c. Phân độ giai đoạn của suy tim
- ☐ d. Phân suất tổng máu

**Question 8**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

Bệnh nhân suy tim mạn có GFR < 30 ml/phút/1,73 m<sup>2</sup> da, loại thuốc nào sau đây khi dùng sẽ có không có hiệu quả?

- ☒ a. Thiazide
- ☐ b. Digoxin
- ☐ c. Hydralazin
- ☐ d. Nitrate

