



# TIẾT NIỆU ( Urology) - PGS.TS. Ngô Xuân Thái: Trưởng BM - TS. Đỗ Anh Toàn: Leader

Dashboard ► My courses ► TN ► Pre-test ► PRETEST Cấp cứu tiết niệu - sinh dục

**Started on** Thursday, 25 November 2021, 7:40 PM

**State** Finished

**Completed on** Thursday, 25 November 2021, 7:44 PM

**Time taken** 4 mins 58 secs

**Grade** 10.00 out of 10.00 (100%)

**Question 1**

Complete

Mark 1.00 out of  
1.00

Bí tiểu do tắc nghẽn đường tiết niệu dưới có thể do:

- ☐ a. Gây tê tủy sống
- ☐ b. Sỏi niệu quản hai bên
- ☒ c. Tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt
- ☐ d. Hẹp niệu quản

**Question 2**

Complete

Mark 1.00 out of  
1.00

Cần chẩn đoán phân biệt xoắn thường tinh với, ngoại trừ

- ☒ a. Sỏi niệu quản chậu
- ☐ b. Viêm ruột thừa cấp thể tiểu khung
- ☐ c. Viêm mào tinh hoàn – tinh hoàn cấp
- ☐ d. Thoát vị bẹn nghẹt

**Question 3**

Complete

Mark 1.00 out of  
1.00

Dạng xoắn thường tinh thường gặp nhất là:

- ☐ a. Xoắn mào tinh
- ☒ b. Xoắn trong bao tinh mạc
- ☐ c. Xoắn ngoài tinh mạc
- ☐ d. Xoắn mẫu phụ tinh hoàn

**Question 4**

Complete

Mark 1.00 out of  
1.00

Đặc điểm sinh bệnh học của Hoại thư Fournier là?

- ☒ a. Nhiều loại vi khuẩn hiếu khí, kỵ khí gây huyết khối tắc mạch và hoại tử mô
- ☐ b. Ngoại độc tố hình thành từ các vi khuẩn gram dương gây hoại tử cân
- ☐ c. Vi khuẩn kỵ khí tiết ra các chất gây rối loạn tăng sinh biểu mô lớp cân
- ☐ d. Tăng oxy hóa mô hình thành các gốc oxygen tự do

**Question 5**

Complete

Mark 1.00 out of  
1.00

Khi viêm tinh hoàn diễn tiến thành áp-xe, nên thực hiện:

- ☒ a. Rạch rộng ổ áp-xe tháo mủ
- ☐ b. Chọc dò ổ áp-xe bằng kim nhỏ
- ☐ c. Phẫu thuật cắt tinh hoàn
- ☐ d. Điều trị nội khoa bảo tồn

**Question 6**

Complete

Mark 1.00 out of  
1.00

Nguyên nhân bí tiểu mạn

- ☐ a. Sỏi kẹt niệu đạo
- ☒ b. Hẹp niệu đạo
- ☐ c. Do thuốc kháng phó giao cảm
- ☐ d. Chấn thương niệu đạo

**Question 7**

Complete

Mark 1.00 out of  
1.00

Nguyên nhân thường gặp vỡ thể hang tại các nước phương Tây là:

- ☐ a. Do tai nạn khi giao hợp
- ☐ b. Do tự bẻ
- ☒ c. Do tai nạn giao thông
- ☐ d. Do té kiểu ngồi ngựa

**Question 8**

Complete

Mark 1.00 out of  
1.00

Thuốc dùng trong điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt:

- ☐ a. Thuốc chống trầm cảm 3 vòng
- ☒ b. Thuốc ức chế alpha
- ☐ c. Thuốc kháng histamine
- ☐ d. Thuốc kháng cholinergic

**Question 9**

Complete

Mark 1.00 out of  
1.00

Vị trí nhiễm khuẩn khởi đầu của hoại thư Fournier KHÔNG bao gồm?

- ☒ a. Ổ bụng
- ☐ b. Da
- ☐ c. Đường niệu dục
- ☐ d. Hậu môn trực tràng

**Question 10**

Complete

Mark 1.00 out of  
1.00

Xoắn thường tinh có tiên lượng tốt khi xử trí sớm trong vòng:

- ☐ a. 4h đầu
- ☐ b. 5h đầu
- ☒ c. 6h đầu
- ☐ d. 3h đầu

