

18. Một bệnh nhân nam, 30 tuổi, bị trật khớp bàn ngón cái tay phải vào sáng nay. Bệnh nhân được gây mê và nắn 3 lần nhưng đều thất bại. Chẩn đoán lâm sàng nào sau đây phù hợp nhất với bệnh lí của bệnh nhân?

- a. Trật khớp không điển hình
- b. Trật khớp tái hồi
- c. Trật khớp khoá
- d. Trật khớp thường trực

15. Bệnh nhân nam, 40 tuổi, được đưa vào khoa cấp cứu 1 giờ sau tai nạn giao thông với gãy kín thân xương đùi phải và hai xương cẳng chân trái (đối bên). Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, huyết áp 95/70 mmHg, mạch 100 lần/phút, nhịp thở 26 lần/phút, SpO₂ 98%, niêm hơi nhẹ. Ước tính thể tích tuần hoàn giảm khoảng bao nhiêu ở trường hợp này?

- a. 800-1500ml
- b. Nhỏ hơn 750ml
- c. Lớn hơn 2000ml
- d. 1500-2000ml

xg đầu : 1000 - 1500

xg chày/máć : 500 - 1000

→ 1500 - 2000

→ Σ = 2000

A

16. Điều trị trật khớp khuỷu cấp tính theo thứ tự nào sau đây?

- a. Nắn trật - Bó bột 4 tuần - Tập vận động
- b. Phẫu thuật nắn trật hay tạo hình khớp
- c. Nắn trật - tập vận động sớm
- d. Nắn trật - Bất động đủ thời gian - Tập vận động



05. Bệnh nhân Nam 30 tuổi bị tai nạn giao thông chấn thương trực tiếp vào cổ chân Phải. Hình ảnh X quang cho thấy gãy đầu dưới xương chày và hình ảnh lâm sàng như hình bên dưới. Phương pháp điều trị tốt nhất cho tổn thương khớp lúc này là gì?

gãy phạm khớp

- a. Cố định ngoài
- b. Nắn mở, bất động vững tuyệt đối
- c. Nắn kín và bó bột
- d. Kết hợp xương đinh nội tuỷ

22.Khi bị tổn thương dây chằng bên ngoài cổ chân độ I, bệnh nhân sẽ có các triệu chứng nào sau đây?

- a. Đau nhiều, cổ chân sưng to, đi lại khó khăn Đúng (F)
- b. Tuỳ thuộc vào mỗi bệnh nhân.
- c. Rất đau, cổ chân bị "lỏng lẻo " rất rõ và đi lại hết sức khó khăn Đúng (H)
- d. Đau vừa, sưng tại chỗ, vẫn đi lại được

01.Cơ chế sinh lý bệnh chính trong gãy xương không điển hình là gì?

- a. Sự ức chế hoạt động của tạo cốt bào
- b. Sự huỷ xương quá mức
- c. Sự tạo xương quá mức
- d. Sự ức chế hoạt động của huỷ cốt bào



23.Phân độ tổn thương dây chằng cổ chân, câu nào sau đây đúng?

- a. Độ II đứt hoàn toàn dây chằng
- b. Độ II đứt một số sợi dây chằng
- c. Độ III đứt nhiều sợi dây chằng. X
- d. Độ III đứt một số sợi dây chằng X

20. Bệnh nhân nam, 33 tuổi, nhập viện vì đau khuỷu phải khi thi đấu võ thuật. Khám lâm sàng thấy khớp khuỷu sưng ít, tam giác Hueter bị đảo ngược. Cảm giác và vận động các ngón tay phải bình thường, mạch quay rõ. Chẩn đoán nào thích hợp nhất với bệnh nhân này?

- a. Trật khớp khuỷu
- b. Gãy chỏm quay
- c. Trật mỏm vẹt
- d. Gãy mỏm khuỷu



27. Bệnh nhân bị vết thương dập nát bàn tay trái, đã được phẫu thuật cắt lọc, hậu phẫu ngày thứ nhất, được băng và cố định bàn tay như hình ảnh lâm sàng bên dưới. Hình ảnh này có chi tiết nào KHÔNG phù hợp với yêu cầu cần phải theo dõi, chăm sóc sau mổ ở bệnh nhân bị vết thương bàn tay cấp tính?

- a. Tập phục hồi chức năng bàn tay
- b. Tình trạng phù nề vết thương
- c. Tình trạng tưới máu đầu các ngón tay
- d. Tình trạng nhiễm trùng vết thương

C

12. Một trường hợp gãy 1/3 giữa xương cánh tay bên trái, với vết thương # 1x1 cm kha sạch, có ít dị vật, xương gãy ngang đơn giản. Trong mổ thấy cơ bầm dập ít. Phân loại gãy xương hở theo Gustilo và Anderson nào là phù hợp nhất?


- a. Type IIIA
- b. Type I
- c. Type IIIB
- d. Type II

D

1cm

<1cm

1-10cm



06. Bệnh nhân Nam 32 tuổi bị tổn thương và được điều trị như hình bên dưới. Hình thức bất động và kiểu lành xương sẽ đạt được ở bệnh nhân này là gì ?

- a. Bất động tương đối và lành xương thì đầu
- b. Bất động tuyệt đối và lành xương thì hai
- c. Bất động tuyệt đối và lành xương thì đầu
- d. Bất động tương đối và lành xương thì hai



04.Theo phân loại tổn thương phần mềm của AO thì tổn thương dưới đây thuộc loại nào (hình bên dưới)?

- a. IC3
- b. IC4
- c. IC2
- d. IC1

D

21.Trong xử trí ban đầu tổn thương dây chằng RICE, chữ "E" có nghĩa là gì?



- a. Kê cao chi
- b. Băng ép
- c. Chườm đá
- d. Nghỉ ngơi

17.Tư thế biến dạng đặc hiệu của trật khớp vai xuống dưới là gì?

C

- a. Tay lành đỡ tay đau X
- b. Vai khép và xoay trong
- c. Cánh tay đưa lên cao
- d. Vai dạng và xoay ngoài



03. Tổn thương dưới đây được gây ra bởi chấn thương có mức năng lượng nào sau đây?

- a. Trung bình
- b. Vừa phải
- c. Thấp
- d. Cao

11.Trong trường hợp gãy xương hở chảy máu nhiều. Phương pháp băng cầm máu thế nào là phù hợp?



- a. Băng ép có trọng điểm
- b. Kết hợp băn ép với ga rô chi
- c. Băng ga rô đoạn chi phía trên
- d. Băng ép với nhiều gạc



14. Bệnh nhân nam, 30 tuổi, đi cầu thang trượt chân té chấn thương tay trái. Qua thăm khám thấy bệnh nhân duỗi được cổ tay, không té và cảm giác bình thường, mạch rõ. X quang xương như hình bên dưới. Bệnh nhân được chỉ định nắn bó bột cánh bàn tay trái ôm vai. Sau bó bột, thăm khám lại bệnh nhân té giảm cảm giác mu tay, không duỗi được cổ tay và khớp bàn ngón tay trái. Xử trí tiếp theo phù hợp nhất là gì?

→ tổn thương TR quay thứ phát
→ cố định cố ngay

- a. Mổ thám sát kết hợp xương
- b. Cho xuất viện hẹn tái khám theo dõi
- c. Đo điện cơ
- d. Tháo bột thay bằng nẹp bột

28. Bảo quản phần chi đứt lìa trong vết thương đứt lìa cổ - bàn tay phù hợp nhất là gì?

- a. Để phần đứt lìa vào bao nylon cột kín lại, bao phủ bên ngoài bằng gạc sạch rồi ngâm vào thùng đá lạnh
- b. Để phần đứt lìa được bao phủ gạc sạch vào bao nylon chứa đá lạnh cột kín lại rồi đặt vào thùng
- c. Để phần đứt lìa vào bao nylon, bao phủ bên ngoài bằng gạc sạch rồi ngâm vào thùng đá lạnh
- d. Để phần đứt lìa được bao phủ gạc sạch vào bao nylon cột kín lại rồi ngâm vào thùng đá lạnh



A



B

25. Trong trận bóng đá nữ giữa Braxin (áo vàng) và Đức (áo trắng) xảy ra tình huống va chạm mạnh như hình A bên dưới (cầu thủ số 16 Đức đang dẫn bóng bị cầu thủ số 8 Braxin tắc bóng). Nếu cầu thủ số 16 bị đau mặt trong gối nhiều không thể đá tiếp được. Khi chụp X quang động cho cô ấy có kết quả như hình B bên dưới. Cô ấy bị tổn thương dây chằng bên trong độ mấy?



- a. Độ I
- b. Độ IV
- c. Độ II
- d. Độ III

30.X- quang giúp chẩn đoán gì trong vết thương bàn tay cấp tính? Chọn câu trả lời KHÔNG chính xác.

- a. Các gãy xương bàn – ngón tay
- b. Xác định gãy xương hở
- c. Phát hiện các dị vật cản quang
- d. Các trường hợp trật khớp

10. Một bệnh nhân nữ 30 tuổi bị tai nạn giao thông gãy hở 1/3 giữa 2 xương cẳng chân trái, vết thương 4x6 cm bầm dập nhiều, vết thương dơ nhiều đất cát dị vật dính vào xương gãy, xương gãy có nhiều mảnh nhỏ, cơ xung quanh bầm dập nặng không tổn thương mạch máu chính, nhập viện vào giờ thứ 8 sau tai nạn. Phương tiện kết hợp xương nào sau đây là phù hợp nhất sau khi đã mổ cắt lọc?

- a. Bất động ngoài
- b. Nẹp vít
- c. Đinh nội tủy có chốt
- d. Đinh Rush

02. Bệnh nhân nữ 50 tuổi, nhập viện vì đau cẳng chân phải sau tai nạn giao thông. Thăm khám lâm sàng thấy gập góc mở  sau khoảng 400° ở 1/3 trên cẳng chân, đau, sưng nhiều, nổi bóng nước ở cẳng chân phải, gập duỗi thụ động bàn chân đau tăng lên. Chẩn đoán nào là phù hợp nhất trên bệnh nhân này?

- a. Chấn thương phần mềm cẳng chân phải, biến chứng thần kinh
- b. Gãy 1/3 trên 2 xương cẳng chân phải, biến chứng chèn ép khoang
- c. Chấn thương phần mềm cẳng chân phải, biến chứng chèn ép khoang
- d. Trật khớp gối phải, biến chứng thần kinh



09. Bệnh nhân Nữ 20 tuổi bị tai nạn giao thông được chẩn đoán gãy kín xương đùi phải không biến chứng có hình X quang như hình bên dưới. Phương pháp cố định xương nào sau đây phù hợp nhất?

- a. Bó bột đùi bàn chân
- b. Nẹp vít nén ép
- c. Cố định ngoài
- d. Nẹp bắt cầu

phức tạp → tg đối thời
sợ hít thở can xy e fot

26.Chi phối vận động cho các cơ nội tại bàn tay bao gồm các thần kinh nào?

- a. Trụ, giữa
- b. Quay, giữa
- c. Cơ bì, giữa
- d. Nách, quay

13.Dấu chứng nào sau đây thuộc tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng tắc mạch máu do mỡ của Guard?

- a. Sốt 38,80C *39°*
- b. Hemoglobin máu: 9 g/dl *X*
- c. Tiểu cầu 100G/L *X*
- d. Nhịp thở 30 lần/ phút *Rối loạn?*

A



→ Lành xương trực tiếp

07. Bệnh nhân Nam 50 tuổi bị tai nạn xe máy được chẩn đoán gãy kín 1/3 trên thân xương cánh tay phải giờ thứ 3 chưa biến chứng và điều trị bằng kết hợp xương nẹp vít nén . Đặc điểm phương pháp điều trị này là gì?



- a. Bắt động tương đối
- b. Lành xương cho can xương trên X quang
- c. Lành xương nhanh hơn điều trị bó bột
- d. Lành xương trực tiếp

29. Kháng sinh được thực hiện phòng ngừa nhiễm trùng trong xử trí vết thương bàn tay cấp tính. Thái độ xử trí nào sau KHÔNG hợp lý?

- a. Thực hiện ngay tại phòng cấp cứu → **dung**
- b. Thực hiện ngay sau phẫu thuật → **dung**
- c. Thực hiện ngay trước phẫu thuật
- d. Thực hiện ngay tại y tế cơ sở → **dung**

Sau pT là khác đ�断.

08. Hình thức bất động nào sau đây cho kết quả lành xương trực tiếp?

- a. Nẹp vít nén ép
- b. Nẹp bắt cầu
- c. Bó bột
- d. Đinh nội tuỷ



24.Trong trận bóng đá nữ giữa Braxin (áo vàng) và Đức (áo trắng) xảy ra tình huống va chạm mạnh như hình bên dưới (cầu thủ số 16 Đức đang dẫn bóng bị cầu thủ số 8 Braxin tắc bóng). Nếu cầu thủ số 16 bị đau mặt trong gối nhiều không thể đá tiếp được. Cần làm gì tốt nhất để chẩn đoán vấn đề gối của cô ấy?

- a. Chụp MRI khớp gối
- b. Nghiệm pháp lâm sàng dạng khớp gối
- c. X quang tĩnh
- d. Chụp X quang động khi làm nghiệm pháp dạng



lên trên, ra sau.



19. Một bệnh nhân nam, 30 tuổi, bị tai nạn giao thông. Khi vào bệnh viện, anh ta nằm tư thế như hình bên và không thể duỗi thẳng khớp háng ra được. Chẩn đoán nghĩ nhiều nhất trên bệnh nhân này là gì?

- a. Trật khớp háng lên trên, ra trước
- b. Trật khớp háng xuống dưới, ra sau
- c. Trật khớp háng lên trên, ra sau
- d. Trật khớp háng xuống dưới, ra trước

B