



NỘI KHOA (INTERNAL MEDICINE Y6)

Dashboard ► My courses ► NOIY6 ► PRETEST NỘI ĐỢT 1-2022-2023 ►
Pretest Tiếp cận điều trị bệnh lý liên quan acid dịch vị - Đợt 1 - 12/09/2022

Started on Monday, 12 September 2022, 6:23 PM

State Finished

Completed on Monday, 12 September 2022, 6:43 PM

Time taken 20 mins 12 secs

Grade 8.00 out of 8.00 (100%)

Question 1

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Trường hợp nào sau đây có chỉ định điều trị duy trì PPI sau khi lành loét?

- ☐ a. Tiết trừ H. pylori kháng thuốc thành công
- ☐ b. Loét dạ dày tái phát (< 2 lần/năm)
- ☐ c. Loét dạ dày tá tràng do thuốc kháng viêm không steroid
- ☒ d. Loét tá tràng không lành sau 8 tuần điều trị

Question 2

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Bệnh nhân có tần suất đầy bụng sau ăn hoặc ăn nhanh no như thế nào trong tiêu chuẩn chẩn đoán khó tiêu chức năng theo tiêu chuẩn ROME IV?

- ☒ a. Ít nhất 3 ngày/tuần
- ☐ b. Ít nhất 1 lần/tuần x 3 tuần
- ☐ c. Ít nhất 3 lần/ngày
- ☐ d. Ít nhất 1 lần/tháng x 3 tháng

Question 3

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Thời gian điều trị thích hợp cho trường hợp loét dạ dày là bao lâu?

- ☐ a. 2 – 4 tuần
- ☐ b. 4 – 8 tuần
- ☒ c. 8 – 12 tuần
- ☐ d. 12 – 16 tuần

Question 4

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Thời gian điều trị thích hợp cho trường hợp loét tá tràng là bao lâu?

- ☐ a. 8 – 12 tuần
- ☒ b. 4 – 8 tuần
- ☐ c. Tối đa 4 tuần
- ☐ d. 12 – 16 tuần

Question 5

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, tiền căn chưa ghi nhận bệnh lý, than phiền đau thượng vị 2 ngày/tuần trong 12 tuần. Nội soi tiêu hóa trên: Viêm sung huyết niêm mạc hang vị, CLO-test âm tính. Điều trị ban đầu nào sau đây phù hợp với bệnh nhân này?

- ☐ a. Thuốc trợ vận động trong 4 – 8 tuần
- ☐ b. AntiH2 trong 4 - 8 tuần
- ☐ c. Thuốc điều hòa thần kinh trong 8 – 12 tuần
- ☒ d. PPI liều chuẩn trong 4 – 8 tuần

Question 6

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Trường hợp nào sau đây KHÔNG cần sử dụng PPI liều cao?

- ☐ a. Loét tá tràng không lành sau 8 tuần
- ☒ b. Khó tiêu chức năng
- ☐ c. Loét dạ dày không lành sau 12 tuần
- ☐ d. Bệnh trào ngược dạ dày thực quản có triệu chứng dai dẳng

Question 7

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Bệnh nhân nam, 35 tuổi, tiền căn chưa ghi nhận bệnh lý, than phiền đầy bụng, ăn mau no 3 ngày/tuần trong 12 tuần. Nội soi tiêu hóa trên: Viêm sung huyết niêm mạc hang vị, CLO-test âm tính. Điều trị ban đầu nào sau đây phù hợp với bệnh nhân này?

- ☐ a. Thuốc điều hòa thần kinh
- ☒ b. Thuốc trợ vận động
- ☐ c. AntiH2
- ☐ d. PPI

Question 8

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Bệnh nhân nam, 45 tuổi, tiền căn chưa ghi nhận bệnh lý, than phiền đau thượng vị 3 - 4 ngày/tuần trong 12 tuần. Nội soi tiêu hóa trên: Viêm sung huyết niêm mạc hang vị, CLO-test âm tính. Bệnh nhân được điều trị PPI liều chuẩn 1 lần/ngày x 8 tuần, hiện tại còn đau thượng vị 1 - 2 ngày/tuần. Điều trị tiếp theo nào sau đây phù hợp với bệnh nhân này?

- ☐ a. Phối hợp thêm AntiH2
- ☒ b. Phối hợp thêm thuốc điều hòa thần kinh
- ☐ c. PPI liều chuẩn 2 lần/ngày
- ☐ d. Phối hợp thêm thuốc trợ vận động

