

NGOẠI NIỆU ĐỢT 4 Y17

1. Điều trị nào của bướu bàng quang hiện nay không sử dụng
 - A. Cắt bàng quang toàn bộ
 - B. Tiêm botulinum A
2. Thuốc chẹn alpha sử dụng điều trị sỏi kích thước nào:
 - A. >2 mm
 - B. >5 mm
 - C. > 10mm
3. Trường hợp nào ít nguy cơ chấn thương thận:
 - A. Té từ trên cao, thận bị kéo xuống theo quán tính
 - B. Chấn thương trực tiếp hông lưng
 - C. Tai nạn giao thông
 - D. Thận bị đâm
4. Trường hợp nào sau đây thường gây ra tổn thương thận nhất
 - A. té từ trên cao, thận bị kéo xuống theo quán tính
 - B. Tai nạn giao thông
 - C. Chấn thương trực tiếp vào hạ sườn, vùng hông lưng
5. Câu nào sai khi nói về viêm bàng quang cấp đơn thuần phụ nữ
 - A. Thường do quan hệ tình dục
 - B. Thường ở phụ nữ trẻ, chưa mãn kinh, không mang thai
6. Vỡ thể hang cấp cứu để làm gì
 - A. Cầm máu, lấy máu tụ
 - B. Khâu lại bao trắng, lấy máu tụ
 - C. Cầm máu, khâu cân buck
7. Vỡ thể hang dương vật
 - A. thường xảy ra khi dương vật đang cương cứng
8. Cương đau dương vật kéo dài thể thiếu màu, siêu âm doppler thấy
 - A. giảm dòng máu động mạch
 - B. Tăng dòng máu động mạch
 - C. nhiều lỗ rò động tĩnh mạch
7. Thời gian vàng điều trị xoắn tinh hoàn
 - A. 6 giờ
 - B. 12 giờ
8. điều trị sỏi ở phụ nữ có thai nên phẫu thuật vào thời điểm nào
 - A. TCN 1
 - B. TCN 2
 - C. TCN 3
 - D. Không được điều trị
9. thang điểm gleason dùng cho ung thư nào
 - A. tuyến tiền liệt
10. điều trị chuẩn của sỏi san hô
 - A. mổ mở lấy sỏi
 - B. tán sỏi ngoài cơ thể
 - C. nội soi ngược dòng lấy sỏi
11. bệnh nhân có sỏi 30mm ở niệu quản điều trị như thế nào
 - A. tán sỏi qua da
12. viêm bàng quang cấp tái đi tái lại ở phụ nữ là
 - A. phức tạp

- B. tái nhiễm
7. nhiễm khuẩn cộng đồng
- A. trong vòng 48 giờ sau nhập viện
8. Thuốc đầu tay trong điều trị viêm bàng quan cấp ở phụ nữ
- A. fosfomycin
- B. Ceftriaxon thế hệ 2
9. PSA tăng trong trường hợp nào ngoại trừ
- A. sau quan hệ tình dục hoặc khám hậu môn trực tràng
- B. Dùng thuốc chẹn 5 alpha reductase
10. triệu chứng không thuộc triệu chứng tổng xuất.
- A. tiểu khó
- B. Tiểu ngập ngừng
- C. Tia nước tiểu yếu
- D. Tiểu gắt
11. Nhóm thuốc nào sau đây không được khuyến cáo trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt
- A. Thuốc chẹn alpha
- B. Thảo dược
- C. Thuốc chẹn 5 alpha reductase
- D. Thuốc lợi tiểu
12. Bệnh nhân nam, 74 tuổi đến khám vì tiểu khó, tiểu lắt nhắt, IPSS 30 điểm, siêu âm TTL 60ml, Hướng xử trí phù hợp là gì
- A. cắt đốt nội soi
- B. Đặt thông niệu đạo
- C. Điều trị nội khoa
- D. Sinh thiết tuyến tiền liệt
13. Điều trị bàng quang tăng hoạt
- A. tập co thắt cơ sàn chậu- tập bàng quang
14. Điều trị bàng quang tăng hoạt, điều trị nào sai
- A. Nhật ký đi tiểu không còn được sử dụng
15. Điều trị Hoại thư founier, chọn câu sai
- A. điều trị triệt căn tận gốc nguyên nhân
- B. cắt lọc loại bỏ mô hoại tử
16. Mục tiêu điều trị vỡ thể hang
- A. lấy máu tụ, khâu bao trắng
17. 1 bệnh nhân được nội soi cắt bướu bàng quang, sinh thiết ra xâm lấn lớp niêm mạc nhưng chưa xâm lấn lớp cơ, không có di căn hạch, không có di căn xa. Phân độ
- A. cT1N0M0
- B. pT1N0M0
- C. pTaN0M0
- D. cTaN0M0
18. Theo hội tiết niệu châu âu, chấn thương thận chia làm mấy độ
- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5
19. 1 bệnh nhân được chẩn đoán bướu bàng quang cT3N0M0, sau khi được hóa trị liệu 1 đợt, nội soi không thấy bướu, cần làm gì tiếp theo
- A. cắt bàng quang toàn bộ
- B. Nội soi bàng quan mỗi 3-6 tháng

C.

20 vì sau chấn thương thận có thể điều trị bảo tồn quên mất

A. vì thận nằm sau phúc mạc nên hiếm khi bị chấn thương

B. vì thận có bao phủ nên tăng áp lực trong bao thận ngừa chảy máu

21 câu nào đúng về chấn thương thận

A. đa phần có thể điều trị nội khoa

22 vi khuẩn không tiết men nitrit reductase

A. E coli

B. Klesiella

C. Morganella morganii