



NỘI KHOA (INTERNAL MEDICINE Y6)

Dashboard ► My courses ► NOIY6 ► PRETEST ĐỢT 2-2021 ► Tắc nghẽn hô hấp dưới-Pretest đợt 2-13/12/2021

Question 1

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh nhân COPD được phân nhóm B, điều trị nền đầu tay được lựa chọn là gì?

- ☒ a. LABA hoặc LAMA
- ☐ b. ICS+ LABA
- ☐ c. ICS+LAMA
- ☐ d. LABA+ LAMA

Question 2

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh nhân COPD ngoài cơn đi được 100 mét khó thở, không ghi nhận đợt cấp nào trong vòng 12 tháng. Tiền căn có lao phổi cách đây 2 năm. Điều trị nào sau đây được ưu tiên lựa chọn?

- ☐ a. ICS+ LABA
- ☒ b. LABA hoặc LAMA
- ☐ c. ICS+LAMA
- ☐ d. LABA+ LAMA

Question 3

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh nhân vừa xuất viện vì đợt cấp COPD, trong năm qua 3 lần nhập viện vì đợt cấp, ngoài cơn bệnh nhân đi khoảng 100 mét khó thở, có eosinophil 400. Lựa chọn thuốc điều trị nền cho bệnh nhân khi xuất viện nên ưu tiên là gì?

- ☐ a. LABA+LAMA
- ☒ b. LABA+ICS
- ☐ c. LABA+ICS+LAMA
- ☐ d. ICS+LAMA

Question 4

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Câu 3: Bệnh nhân nam, chẩn đoán COPD 10 năm, ngoài cơn cấp đi chậm hơn người cùng tuổi, trong năm qua có 1 đợt cấp, khám phòng khám, không nhập viện. Phân độ ABCD theo GOLD 2021 của bệnh nhân này là?

- ☐ a. A
- ☒ b. B
- ☐ c. C
- ☐ d. D

Question 5

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Câu 7: Bệnh nhân COPD, trong năm qua nhập viện 3 lần, ngoài cơn đi vệ sinh cũng gây khó thở, lần này ho đàm, sốt, nhập viện, mục tiêu oxy cần đạt trong điều trị đợt cấp là bao nhiêu?

- ☒ a. 88-92%
- ☐ b. 92-95%
- ☐ c. 93-96%
- ☐ d. 94-98%

Question 6

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Câu 8: Bệnh nhân nhập viện vì đợt cấp COPD, tình tiếp xúc tốt, SpO₂: 87%, nhịp thở 28 lần/phút, mạch: 120 lần/phút, pH: 7,35; pCO₂: 60 mmHg. Xử trí nào phù hợp thời điểm hiện tại ngoài điều trị thuốc tối ưu?

- ☐ a. Thở oxy canula 6 lít/phút
- ☐ b. Thở oxy túi mask 10 lít/phút
- ☒ c. Thở máy BiPAP
- ☐ d. Đặt nội khí quản thở máy xâm lấn

Question 7

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Phát biểu nào sau đây đúng về phân độ đợt cấp COPD theo GOLD 2021?

- ☐ a. Nhẹ: giảm khi dùng giãn phế quản tác dụng ngắn và corticoid uống liều thấp
- ☐ b. Trung bình: cần dùng đến kháng sinh hoặc corticoid đường tĩnh mạch, SABDs
- ☒ c. Nặng: cần phải nhập viện hoặc nhập khoa cấp cứu, có thể liên quan suy hô hấp cấp
- ☐ d. Trung bình: cần điều trị corticoid đường toàn thân và giãn phế quản tác dụng ngắn

Question 8

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Phát biểu nào sau đây đúng với phân độ ABCD theo GOLD 2021?

- ☐ a. Nhóm A: mMRC 0-1, một đợt cấp nhập viện
- ☐ b. Nhóm B: mMRC 0-1, 0-1 đợt cấp không nhập viện
- ☐ c. Nhóm C: mMRC ≥ 2 , 0-1 đợt cấp nhập viện
- ☒ d. Nhóm D: mMRC ≥ 2 , ≥ 2 hoặc 1 đợt cấp phải nhập viện

