

- Ung thư vú thường di căn xa đến xương nhiều nhất. Điều này có thể được giải thích hợp lý nhất là
- A. Có sự thông nối trực tiếp từ tĩnh mạch vú trong với tĩnh mạch trong xương bằng hệ thống tĩnh mạch trước sống
- ☒ B. Các tế bào ung thư vú có thể xâm lấn trực tiếp vào các xương sườn bên dưới từ đó lan vào các xương khác.
- ☒ C. Vì môi trường ở xương thuận lợi cho sự phát triển cho tế bào ung thư vú
- D. Các tế bào ung thư vú theo tĩnh mạch về tim phải sau đó qua phổi và về tim trái và theo hệ thống động mạch đến xương
10. Một bệnh nhân




VERIFIED

ments for colonization and bone destruction. This 'seed-and-soil' hypothesis of the mechanism of metastasis was first proposed by Stephan Paget in 1889 that circulating cancer cells (seeds) can accomplish metastasis only in the organs of which microenvironment (soil) is advantageous for their growth [8]. This theory has been widely accepted

- Phương tiện nào sau đây được sử dụng trong tầm soát ung thư cổ tử cung?
- A. Khám phụ khoa lâm sàng
- ☒ B. Xét nghiệm HPV
- D. Sinh thiết cổ tử cung bằng kẽm
13. Một phụ nữ 42 tuổi đã quan hệ tình dục đến khám tư vấn để được tầm soát ung thư. Ung thư cổ tử cung có chỉ định tầm soát ở phụ nữ này?
- ☒ A. Ung thư cổ tử cung, ung thư vú
- ☒ B. Ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư đại tràng
- C. Ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư tuyến giáp
- D. Ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư đại tràng, ung thư tuyến giáp
14. Sau khi được tư vấn, cô đồng ý tầm soát ung thư cổ tử cung bằng bộ đôi xét nghiệm tế bào học và HPV. Kết quả xét nghiệm bộ đôi đều bình thường. Cô sẽ được hẹn tầm soát lại ung thư cổ tử cung sau
- A. 1 năm
- B. 2 năm
- C. 3 năm
- ☒ D. 5 năm
15. Tổn thương nào sau đây được xem là tổn thương tiền ung thư cổ tử cung?
- A. Viêm cổ tử cung mãn tính
- B. Nhiễm HPV mãn tính ở cổ tử cung




EMERGENCY



+ Chụp X quang cắt lớp điện toán (CT Scan) hay cộng hưởng từ (MRI) vùng chậu để đánh giá rõ hơn sự xâm lấn vùng chậu, di căn hạch chậu, hạch cạnh động mạch chủ bụng. Hiện nay, các xét nghiệm này được khuyến cáo nên thực hiện thường quy, đặc biệt là cộng hưởng từ được xem là phương tiện chẩn đoán hình ảnh tốt nhất đánh giá xâm lấn vùng chậu. **CT ~ MRI, nên làm cái nào cũng được.**

CT ~ MRI nhưng tốt nhất là MRI





Do triệt nguồn testosterone... truyền không phụ thuộc androgen dẫn đến chết...  
Câu B và C đúng  
Cô A, 28 tuổi, PARA 2002, có đột biến gen BRCA1 và mẹ qua đời vì ung thư vú. Cô không muốn đoạn nhũ và cắt 2 phần phụ phòng ngừa giống nữ diễn viên Angelina Jolie. Cô đang phương pháp tuân thủ nghiêm ngặt lịch tầm soát ung thư vú theo tư vấn của bác sĩ. Cô A thực hiện phòng ngừa ung thư cấp mấy?

Cấp 2

35. Trong bệnh ung thư vú, yếu tố nguy cơ nào sau đây có thể điều chỉnh được?
- A. Có kinh sớm và mãn kinh muộn
  - B. Không sinh con hoặc sinh con đầu khi đã lớn tuổi
  - C. Mô tuyến vú dày (trên nhũ ảnh)
  - ☒ D. Tình trạng béo phì

D

giao nguy co ung thu?

