

Đề Ngoại Osce Lâm sàng Y17 Y3
HKII ngày thứ 3 (25/06/2020)

Trạm 1:

Bn nam 21t bệnh 4 ngày nhập viện vì đau bụng quặn quanh rốn, buồn nôn, nôn, bí đại tiện 3 ngày, trung tiện đc sau trung tiện giảm đau. Tiền căn mổ hở RT 3 năm. Khám sinh hiệu ổn, dấu rấn bò (+), bóng trực tràng rỗng

1. BN có HC gì? **Bán tắc ruột** Trung tiện giảm đau

2. CLS gì được thực hiện ở cc? **XQBĐKSS**

3. Nguyên nhân nào sau đây gây liệt ruột?

A. Hạ K máu

B. Polyp ĐT

Trạm 2: 1 BN nam >40t bệnh 4 ngày, NV vì đau bụng quặn cơn HSP. Đến ngày NV có sốt, tiểu vàng sậm phân vàng. Tiền căn sỏi túi mật 12 năm ko điều trị, viêm gan siêu vi C đang điều trị ổn. Khám có vàng da vàng mắt, sốt 38.5, bụng ấn đau nhẹ HSP.

1. BN có HC gì?

A. Tam chứng Charcot

B. HC vàng da tắc mật

2. Nguyên nhân nhiều nhất trên bn này?

A. Viêm đường mật do sỏi

B. Viêm túi mật do sỏi

C. Viêm gan cấp do siêu vi C

3. CLS nào ko cần thực hiện trên bn này?

A. MSCT bụng chậu

B. SÂ bụng

C. MRI gan mật

☒ B. NS dạ dày

4. Yếu tố nguy cơ hình thành sỏi sắc tố?

A. Xơ gan Xơ gan do rượu mới đúng

B. RLLP máu

☒ C. Tán huyết Tán huyết mạn

Note: Phân vân ☐ A và C. Slide Y3 Y14 ghi rõ YTNC sỏi sắc tố: Xơ gan do rượu / Thiếu máu ác tính / Tán huyết mạn. Đáp án cho xơ gan không ghi do rượu là sai nên C đúng. Tán huyết thường là tán huyết mạn tính.

Trạm 3: trước NV BN đi nhậu với bạn sau đó gây gỗ -> bị đâm bởi dao gọt trái cây giữa bụng, KT vết thương 1×2 cm, ko thấy lòi ruột... chảy máu rỉ rả, BN tỉnh, sinh hiệu ổn. Sonde nước tiểu vàng trong.

1. Nghi tạng nào bị tổn thương nhiều nhất?

☒ A. Ruột non Giữa bụng thì RN là hàng đầu

B. ĐT

C. Tá tràng

D. gan

2. Cần phải hỏi thêm chi tiết gì quan trọng?

A. Hình ảnh con dao

B. Tiền căn bệnh nội khoa mãn tính

☒ C. Thời gian từ lúc bị đâm tới lúc nhập viện

D. Tiền căn ngoại khoa

Note: Câu này phân vân A và C. Tuy nhiên A hình ảnh con dao đề bài đã nói là dao gọt trái cây. Câu C thời gian có ý nghĩa vì liên quan tới diễn tiến viêm phúc mạc sau đó. Và thời gian theo dõi ...

3. CLS nào ít cần nhất

A. XQ ngực

B. XQ bụng

C. SÂ bụng

☒ **D. Tptnc**

Note: Ca này sonde nc tiểu bình thường rồi. Xquang coi có đâm vô cơ hoành hay phổi không. Tổn thương bàng quang cũng ít xảy ra trong chấn thương bụng giữa. Ở vị trí này dao xuyên vô thành ngực hay cơ hoành dễ hơn. Do đó Xquang ngực vẫn có giá trị hơn TPTNT.

4. Trong các nguyên nhân chấn thương sau nguyên nhân nào nghiêm trọng nhất

A. Đạn bắn

☒ **B. Mìn nổ** Hỏa khí, nhiều mảnh nên tổn thương cũng nhiều và nặng nề hơn

C. Dao đâm

Trạm 4: BN nam 46t phát hiện khối u ở thượng vị 1 tháng. Gần đây BN xuất hiện buồn nôn, nôn ra thức ăn cũ. Ngày NV BN nôn ra máu bầm

Tiền căn: viêm loét dạ dày

Khám có dấu Bouverret...

1. Chief complaint

A. Nôn ói

B. U

☒ **C. Nôn ra máu**

2. Triệu chứng gì ko có giá trị trên BN này

A. Lỗm lòng thuyền

☒ **B. Dấu rắn bò** Dấu này của TR, bn này bị hẹp môn vị

3. CLS nào dùng để chẩn đoán nguyên nhân trên BN này?

☒ **A. Nội soi dạ dày**

B. XQ

C. SÂ bụng

4. Cái nào ko phải là dấu hiệu thiếu nước

A. Mạch nhanh

B. Khát nước

☒ **Dấu véo da mất nhanh**

D. Tri giác kích thích

5. CLS nào XN để đánh giá tình trạng thiếu nước

☒ **Hct tăng**

B. Ure giảm

C. Cre giảm

D. AST, ALT tăng