



NHI KHOA 1 (PEDIATRICS 1)

Dashboard ► My courses ► NK1 ► THẬN NIỆU ► Pretest CBL Thận 11092019

Question 1

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bất thường nào sau đây không phải là tác dụng phụ của corticoide?

Select one:

- ☐ a. Dễ nhiễm trùng
- ☐ b. Chậm phát triển chiều cao
- ☐ c. Rối loạn tâm thần
- ☒ d. Viêm bàng quang xuất huyết

Question 2

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh nhi nam 5 tuổi, cân nặng 26kg, nhập viện vì phù toàn thân 2 ngày nay. Bệnh nhân có HA: 90/60 mmHg, creatinin máu 0,8 mg/dl, tổng phân tích nước tiểu thấy có protein +++, Ery +. Chẩn đoán nào dưới đây là phù hợp nhất?

Select one:

- ☐ a. Viêm cầu thận cấp hậu nhiễm liên cầu trùng
- ☐ b. Nhiễm trùng tiểu trên
- ☒ c. Hội chứng thận hư
- ☐ d. Viêm cầu thận tiến triển nhanh

Question 3

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Biến chứng viêm phúc mạc nguyên phát trong hội chứng thận hư trẻ em thường do vi trùng nào sau đây gây ra?

Select one:

- ☐ a. Staphylococcus aureus
- ☐ b. Staphylococcus coagulase negative
- ☒ c. Streptococcus pneumoniae
- ☐ d. Pseudomonas aeruginosa

Question 4

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Chỉ định sinh thiết thận trong HCTH trẻ em, câu nào sau đây đúng?

Select one:

- ☐ a. Tiểu máu đại thể quá 3 tuần không hết
- ☐ b. Tăng huyết áp quá 2 tuần
- ☒ c. C3, C4 giảm
- ☐ d. Đạm niệu vượt ngưỡng thận hư

Question 5

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Chỉ định sinh thiết thận trong viêm cầu thận cấp là gì? Chọn câu sai:

Select one:

- ☐ a. Tiểu máu đại thể kéo dài quá 3 tuần
- ☐ b. C3 không trở về bình thường sau 8 tuần
- ☒ c. Huyết áp cao kéo dài trên 1 tuần
- ☐ d. Suy thận cấp

Question 6

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Điều trị cần thiết nhất cho bệnh nhân bị viêm cầu thận cấp hậu nhiễm trùng là gì?

Select one:

- ☐ a. Giảm phù
- ☒ b. Kiểm soát huyết áp
- ☐ c. Kháng sinh diệt liên cầu
- ☐ d. Prednisone

Question 7

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Định nghĩa một trường hợp HCTH kháng corticoide là gì?

Select one:

- ☒ a. Que nhúng nước tiểu màu xanh sau điều trị corticoide 8 tuần
- ☐ b. Tái phát 2 lần khi đang điều trị corticoide hay ngưng thuốc chưa quá 14 ngày
- ☐ c. Tái phát 2 lần trong thời gian 6 tháng
- ☐ d. Tái phát khi ngưng corticoide

Question 8

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Định nghĩa một trường hợp HCTH lệ thuộc corticoide là gì?

Select one:

- ☐ a. Không lui bệnh hoàn toàn dù đã điều trị corticoide quá 8 tuần
- ☒ b. Tái phát 2 lần khi đang điều trị corticoide hay ngưng thuốc chưa quá 14 ngày
- ☐ c. Tái phát 2 lần trong thời gian 6 tháng
- ☐ d. Tái phát 4 lần trong một năm

Question 9

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Định nghĩa trường hợp HCTH lui bệnh hoàn toàn (complete remission) là gì?

Select one:

- ☒ a. Bệnh nhi hết phù và protein niệu trên dipstick < 1+ trong 3 ngày liên tiếp
- ☐ b. Bệnh nhi còn phù rất nhẹ và đạm niệu/creatinin niệu > 2mg/mg
- ☐ c. Bệnh nhi hết phù và đạm niệu/creatinin niệu > 2 (mg/mg) 3 ngày liên tiếp
- ☐ d. Bệnh nhi hết phù và que thử nước tiểu chuyển sang màu xanh 3 ngày liên tiếp

Question 10

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Hội chứng thận hư nguyên phát trẻ em, sang thương xơ hóa cục bộ từng phần chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Select one:

- ☐ a. 15 – 20%
- ☐ b. 10 – 20%
- ☐ c. 5 – 7%
- ☐ d. 7 – 10%

Question 11

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Một bé trai 8 tuổi bị hội chứng thận hư sang thương tối thiểu, nhập viện vì đau bụng, sốt, ấn đau khắp bụng, kèm theo nước tiểu có protein 3+. Xét nghiệm máu : Bạch cầu (BC): 20 000/mm³ , đa nhân trung tính chiếm 80%. Bệnh nhi đã được chọc dò dịch ổ bụng, kết quả: BC: 2300/mm³, cấy chưa có kết quả. Tác nhân gây bệnh thường gặp nhất là tác nhân nào sau đây?

Select one:

- ☐ a. Candida albicans
- ☐ b. Streptococcus pneumonia
- ☐ c. Escherichia coli
- ☐ d. Staphylococcus aureus

Question 12

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Một trẻ trai 4 tuổi tiền sử khỏe mạnh, đến khám vì phù toàn thân, xét nghiệm: máu: Albumin: 1.8 g/l, Creatinin: 0.8mg/dl, Nước tiểu: Pro 3+, Blood: +. Nguyên nhân thường gặp nhất gây ra tình trạng này là gì?

Select one:

- ☐ a. Hội chứng thận hư nguyên phát sang thương tối thiểu (Minimal change disease)
- ☐ b. Xơ hóa cầu thận cục bộ khu trú từng vùng (FSGS)
- ☐ c. Bệnh cầu thận màng (Membranous neuphropathy)
- ☐ d. Viêm thận do Lupus (Lupus Nephritis)

Question 13

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Sang thương cầu thận tối thiểu khi quan sát trên kính hiển vi quang học sẽ thấy hình ảnh nào sau đây?

Select one:

- ☐ a. Dày nhẹ màng đáy, không có tăng sinh tế bào
- ☐ b. Tăng sinh tế bào trung mô
- ☒ c. Các tế bào chân bì dẹp xuống
- ☐ d. Các cầu thận bình thường

Question 14

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Tác nhân nào sau đây không phải là nguyên nhân gây ra hội chứng thận hư?

Select one:

- ☐ a. Viêm gan siêu vi B, C
- ☐ b. Giang mai
- ☒ c. Sởi
- ☐ d. HIV

Question 15

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Thuốc được ưa chuộng nhất hiện nay trong HCTH kháng corticoid ở trẻ em là gì?

Select one:

- ☐ a. Cyclophosphamide
- ☐ b. Levamisole
- ☒ c. Cyclosporine
- ☐ d. Methylprednisone

Question 16

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Tỉ lệ của triệu chứng tăng huyết áp trong viêm cầu thận cấp hậu nhiễm trùng là bao nhiêu?

Select one:

- ☐ a. 30%
- ☐ b. 100%
- ☒ c. 50-90%
- ☐ d. 40-50%

Question 17

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Tỉ lệ của triệu chứng tiểu máu đại thể trong viêm cầu thận cấp hậu nhiễm trùng là bao nhiêu?

Select one:

- ☒ a. 30%
- ☐ b. 100%
- ☐ c. 50-90%
- ☐ d. 10-20%

Question 18

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Tỉ lệ kháng corticoide trong hội chứng thận hư nguyên phát trẻ em là bao nhiêu?

Select one:

- ☐ a. 5%
- ☒ b. 10%
- ☐ c. 20%
- ☐ d. 30%

Question 19

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Tiên lượng của một trẻ bị HCTH nguyên phát dựa vào yếu tố nào sau đây?

Select one:

- ☐ a. Số lần tái phát
- ☒ b. Đáp ứng hay kháng corticoide
- ☐ c. Tuổi khởi phát
- ☐ d. Mức độ phù lúc nhập viện

Question 20

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Triệu chứng sớm của hội chứng thận hư tái phát là gì?

Select one:

- ☐ a. Trẻ phù mắt và lan toàn thân
- ☐ b. Trẻ tăng cân nhanh
- ☒ c. Que nhúng nước tiểu có đạm 3 ngày liên tiếp
- ☐ d. Mi mắt trẻ sưng nhẹ

Question 21

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Triệu chứng tiểu máu đại thể của bệnh nhân viêm cầu thận cấp hậu nhiễm liên cầu sẽ hết tối đa trong khoảng bao lâu?

Select one:

- ☐ a. 4-6 tuần
- ☐ b. 3-4 tuần
- ☒ c. 2-3 tuần
- ☐ d. Tùy đáp ứng với thuốc điều trị

Question 22

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Trong hội chứng thận hư, trẻ dễ bị nhiễm trùng là do nguyên nhân nào sau đây?

Select one:

- ☐ a. Mất yếu tố a properdin
- ☐ b. Giảm albumin máu
- ☐ c. Tăng hoạt tính của vi khuẩn
- ☒ d. Mất globulin miễn dịch

Question 23

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Trường hợp nào sau đây bổ thể C3 và C4 trong máu bình thường?

Select one:

- ☐ a. Viêm cầu thận cấp tăng sinh màng nguyên phát
- ☒ b. Bệnh Berger
- ☐ c. Hội chứng thận hư thứ phát sau lupus
- ☐ d. Viêm cầu thận cấp hậu nhiễm trùng

Question 24

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Viêm cầu thận cấp hậu nhiễm liên cầu trùng, điều nào sau đây đúng?

Select one:

- ☐ a. Thường gặp ở trẻ < 2 tuổi
- ☐ b. Tỷ lệ tấn công chung của streptococci chủng hướng thận là 25 %
- ☒ c. Kháng thể kháng liên cầu ASO trong máu dương tính trong 90-100 % trường hợp
- ☐ d. C3 máu có thể trở về bình thường sau 4-6 tuần

Question 25

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Xét nghiệm nào sau đây là cần thiết nhất để chẩn đoán hội chứng thận hư?

Select one:

- ☒ a. Đạm niệu 24 giờ
- ☐ b. Sinh thiết thận
- ☐ c. Điện di đạm trong nước tiểu
- ☐ d. Định lượng lipid máu

