


1. Quan điểm vi sinh học nào về kiểu trạng thái khuẩn hệ CST IV là chính xác?

- ☒ a. CST IV là kiểu khuẩn hệ sinh lý, có khả năng bảo vệ, dù thành phần khuẩn gần giống như bacterial vaginosis
- ☐ b. CST IV là kiểu khuẩn hệ bệnh lý, pH kiềm do thiếu hụt acid lactic. Tuy nhiên nó không có biểu hiện lâm sàng
- ☐ c. CST IV là kiểu khuẩn hệ bệnh lý, chủ yếu tạo bởi vi khuẩn kỵ khí. Tuy nhiên nó không có biểu hiện lâm sàng
- ☐ d. CST IV là kiểu khuẩn hệ bệnh lý, vắng mặt khuẩn *Lactobacillus* sp. Tuy nhiên nó không có biểu hiện lâm sàng

**Question 2**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

 Flag question


2. Trong các tình trạng kể sau, tình trạng nào có liên quan rõ rệt nhất đến bacterial vaginosis tái phát?

- ☐ a. Không tiến hành điều trị bằng probiotics
- ☐ b. Không định danh chính xác loại vi khuẩn
- ☐ c. Không tiến hành điều trị cho (các) bạn tình
- ☒ d. Không tìm cách xác định yếu tố thuận lợi

**Question 3**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

 Flag question


3. Trong các tình huống nghi là viêm âm hộ-âm đạo do nấm liệt kê sau, bạn sẽ chỉ định điều trị cho tình huống nào?

- ☐ a. Không có biểu hiện lâm sàng đặc hiệu, kết quả vi sinh có hiện diện sợi tơ nấm
- ☒ b. Có chỉ định dùng kháng nấm cho cả 3 trường hợp viêm âm hộ-âm đạo kể trên
- ☐ c. Biểu hiện lâm sàng huyết trắng đặc hiệu, kết quả vi sinh có hiện diện sợi tơ nấm
- ☐ d. Biểu hiện lâm sàng huyết trắng đặc hiệu, kết quả vi sinh không thấy sợi tơ nấm

**Question 4**

Not yet  
answered

Marked out of  
1.00

 Flag question

4. Trong các phát biểu sau liên quan đến tiến trình chẩn đoán nhiễm *Trichomonas vaginalis*, phát biểu nào là đúng

- ☐ a. Đa phần các trường hợp nhiễm sẽ có dịch tiết âm đạo điển hình
- ☐ b. Soi tươi thấy trùng roi di động là tiêu chuẩn bắt buộc cho điều trị
- ☐ c. Các khảo sát miễn dịch thường ít có giá trị để thiết lập chẩn đoán
- ☒ d. Soi tươi huyết trắng là công cụ chẩn đoán căn bản, dù độ nhạy thấp


**Question 5**

Not yet

answered

Marked out of

1.00

 Flag question

5. Khi điều trị viêm âm đạo, việc chọn đường dùng thuốc là đường âm đạo hay đường uống phải được căn cứ vào yếu tố nào?

- ☐ a. Thói quen trong các hành vi tình dục
- ☐ b. Ưu tiên cho đường âm đạo, nếu được
- ☐ c. Thói quen dùng thuốc của người bệnh
- ☒ d. Loại tác nhân gây bệnh, tình trạng bệnh


**Question 6**

Not yet

answered

Marked out of

1.00

 Flag question

6. Liên quan đến phòng tránh lây nhiễm, lời khuyên nào thích hợp cho một cặp vợ chồng có kết quả huyết thanh HIV dị biệt?

- ☐ a. Người chồng: luôn dùng bao cao su đúng cách mỗi khi thực hiện quan hệ tình dục
- ☒ b. Người có nhiễm: điều trị ARV đúng, duy trì tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện
- ☐ c. Người không nhiễm: dùng ARV dự phòng sau khi thực hiện quan hệ tình dục (PEP)
- ☐ d. Người không nhiễm: dùng ARV dự phòng trước khi thực hiện quan hệ tình dục (PrEP)


**Question 7**

Not yet

answered

Marked out of

1.00

 Flag question

7. Trong các phát biểu sau liên quan đến nhiễm *Treponema pallidum* và thai kỳ, phát biểu nào là đúng?

- ☒ a. Khuyến cáo tầm soát đại trà giang mai ít nhất là hai lần trong thai kỳ
- ☐ b. Nguy cơ lây truyền dọc giang mai là cao nhất trong giang mai tiềm ẩn
- ☐ c. *Treponema pallidum* chỉ có thể qua nhau kể từ sau tuần lễ thứ 16
- ☐ d. Do tần suất thấp, chỉ tầm soát giang mai cho thai phụ nhóm nguy cơ cao


**Question 8**

Not yet

answered

Marked out of

1.00

 Flag question

8. Trong các phát biểu sau liên quan đến điều trị nhiễm *Neisseria gonorrhoeae*, phát biểu nào là đúng?

- ☒ a. Luôn phối hợp hai kháng sinh với cơ chế tác động khác nhau
- ☐ b. Quinolone là kháng sinh được chọn như điều trị đầu tay
- ☐ c. Luôn điều trị như có *C. trachomatis* mà không cần bằng chứng nhiễm
- ☐ d. Chỉ điều trị khi có bằng chứng vi sinh của nhiễm *N. gonorrhoeae*


**Question 9**

Not yet

answered

Marked out of

1.00

 Flag question

9. Trong các phát biểu sau liên quan đến điều trị **nhiễm Chlamydia trachomatis** cấp (lần đầu), phát biểu nào là đúng?

- ☒ a. Có thể chọn Doxycyclin đa liều hay Azithromycin đơn liều vì có hiệu quả như nhau
- ☐ b. Nên dùng phối hợp 2 kháng sinh, nhằm mục đích hạn chế tình trạng kháng thuốc
- ☐ c. Chọn  $\beta$ -lactamin thay vì Doxycyclin nếu có nhiễm kép *N. gonorrhoeae* và *C. trachomatis*
- ☐ d. Điều trị cho bệnh tình được tiến hành bất cứ lúc nào, độc lập với điều trị cho người nhiễm

**Question 10**

Not yet

answered

Marked out of

1.00

 Flag question

10. Trong các phát biểu sau liên quan đến nguyên tắc điều trị viêm vùng chậu, phát biểu nào là đúng?

- ☐ a. Khi phối hợp kháng sinh, phải có một kháng sinh diệt vi khuẩn kỵ khí
- ☒ b. Mục tiêu điều trị là bảo toàn tính mạng/ngăn ngừa các biến chứng xa
- ☐ c. Áp-xe vòi trứng là một chỉ định bắt buộc của can thiệp ngoại khoa
- ☐ d. Luôn luôn bắt đầu bằng các kháng sinh mạnh và đường tĩnh mạch