



NỘI KHOA (INTERNAL MEDICINE Y6)

Dashboard ► My courses ► NOIY6 ► PRE-TEST - ĐỢT 1 - 2021 ►

Pretest -Tiếp cận điều trị bệnh lý tiêu hóa liên quan đến acid dịch vị - Đợt 1 - 10/11/2021

Started on Wednesday, 10 November 2021, 6:09 PM

State Finished

Completed on Wednesday, 10 November 2021, 6:24 PM

Time taken 14 mins 53 secs

Question 1

Complete

Marked out of

1.00

Bệnh nhân nam, 28 tuổi, than phiền triệu chứng ợ nóng 3 – 4 lần/tuần trong 4 tuần nay. Bệnh nhân mua antacid uống trong 2 tuần, triệu chứng không giảm. Nội soi tiêu hóa trên: Viêm thực quản trào ngược độ LA-A. Bệnh nhân nên được điều trị với PPI trong thời gian bao lâu?

- ☐ a. 2 tuần
- ☐ b. 4 tuần
- ☐ c. 6 tuần
- ☒ d. 8 tuần

Question 2

Complete

Marked out of

1.00

Bệnh nhân nam, 45 tuổi, viêm thực quản do trào ngược độ LA-A. Bệnh nhân được điều trị với PPI 1 lần/ngày trong 8 tuần. Sau ngưng thuốc 12 tuần, bệnh nhân xuất hiện lại triệu chứng ợ nóng và ợ trớ 3 – 4 lần/ngày. Điều trị nào sau đây thích hợp cho bệnh nhân này?

- ☒ a. PPI liều chuẩn 1 lần/ngày trong 8 tuần
- ☐ b. PPI liều thấp 1 lần/ngày duy trì trong 12 tuần
- ☐ c. PPI liều chuẩn 2 lần/ngày trong 4 tuần
- ☐ d. PPI liều chuẩn theo nhu cầu

Question 3

Complete

Marked out of

1.00

Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, mang thai 34 tuần, than phiền triệu chứng ợ nóng 3 lần/tuần. Điều trị nào sau đây phù hợp nhất?

- ☐ a. Nằm nghiêng phải
- ☐ b. Nên ăn bữa cuối trước khi ngủ đêm 1 giờ
- ☒ c. Sử dụng Alginate
- ☐ d. Sử dụng Sodium bicarbonate

Question 4

Complete

Marked out of

1.00

Bệnh nhân nữ, 38 tuổi đến khám vì triệu chứng ợ nóng. Nội soi ghi nhận viêm thực quản do trào ngược độ LA-C. Điều trị nào sau đây phù hợp cho bệnh nhân này?

- ☐ a. PPI liều chuẩn 1 lần/ngày phối hợp Alginate trong 4 tuần
- ☐ b. PPI liều chuẩn 2 lần/ngày trong 4 tuần
- ☒ c. PPI liều chuẩn 1 lần/ngày trong 8 tuần
- ☐ d. PPI liều thấp 1 lần/ngày duy trì trong 12 tuần

Question 5

Complete

Marked out of

1.00

Bệnh nhân nữ, 62 tuổi, tiền căn tăng huyết áp điều trị ổn định với Amlodipin và viêm dạ dày H. pylori dương tính đã điều trị. Đánh giá nguy cơ loét dạ dày tá tràng của bệnh nhân này nếu sử dụng thuốc kháng viêm không steroid?

- ☒ a. Nguy cơ thấp
- ☐ b. Nguy cơ trung bình
- ☐ c. Nguy cơ cao
- ☐ d. Nguy cơ rất cao

Question 6

Complete

Marked out of

1.00

Trường hợp bệnh trào ngược dạ dày thực quản nào sau đây cần **duy trì liên tục điều trị với PPI?**

- ☐ a. Viêm thực quản do trào ngược độ LA-B
- ☐ b. Triệu chứng trào ngược tái phát sau khi ngưng thuốc 14 tuần
- ☒ c. Thực quản Barrett
- ☐ d. Triệu chứng trào ngược 1 lần/tuần

Question 7

Complete

Marked out of

1.00

Trường hợp bệnh trào ngược dạ dày thực quản nào sau đây có chỉ định phẫu thuật chống trào ngược?

- ☐ a. Viêm thực quản trào ngược độ LA-C
- ☐ b. Thực quản Barrett
- ☐ c. Triệu chứng trào ngược không kiểm soát được với PPI liều chuẩn
- ☒ d. Thoát vị hoành gây hít sặc

Chỉ định PT chống trào ngược:
-Thoát vị hoành hít sặc, Hẹp thực quản, \$ về đêm dù PPI liều chuẩn x2
-KHông đáp ứng bằng thuốc.(có chứng minh chức năng)

Question 8

Complete

Marked out of

1.00

Trường hợp nào sau đây KHÔNG cần điều trị PPI duy trì lâu dài?

- ☐ a. Thực quản Barrett
- ☐ b. Viêm thực quản do trào ngược độ LA-C
- ☒ c. Triệu chứng trào ngược tái phát sau 12 tuần
- ☐ d. Biến chứng hẹp thực quản do trào ngược

tái phát muộn thì điều trị
khởi động lại 8 tuần như
ban đầu.

