



# THẦN KINH (Neurology) - TS. Lê Văn Tuấn: Trưởng Bộ môn - TS. Nguyễn Bá Thắng; ThS. Trần Thanh Hùng: Leader

Dashboard ► Courses ► Khoa Y ► CHƯƠNG TRÌNH MỚI ► Năm 5 ►  
Neurology ► Câu hỏi Pre-test ► PreTest CBL 1 Bệnh tủy Nhóm 1 Tổ 19-24

**Started on** Monday, 8 November 2021, 5:36 PM

**State** Finished

**Completed on** Monday, 8 November 2021, 5:41 PM

**Time taken** 4 mins 33 secs

**Grade** 5.00 out of 5.00 (100%)

## Question 1

Complete

Mark 1.00 out of  
1.00

Nếu bệnh nhân có triệu chứng giảm cảm giác từ ngang vú xuống thì tổn thương phần tủy sống nằm kế cận đốt sống nào?

- ☐ a. C7-T1
- ☒ b. T1-T2
- ☐ c. T9-T10
- ☐ d. T4-T5

**Question 2**

Complete

Mark 1.00 out of  
1.00

Tủy sống có đặc điểm nào sau đây?

- ☐ a. Xuất phát từ hành tủy và kết thúc ở đốt sống thắt lưng L4
- ☐ b. Dài khoảng 46 cm, hình oval, teo nhỏ ở vùng cổ và thắt lưng
- ☐ c. Chứa các con đường cảm giác đi xuống, con đường vận động đi lên
- ☒ d. Có 31 khoanh, rễ trước là rễ vận động, rễ sau là rễ cảm giác

**Question 3**

Complete

Mark 1.00 out of  
1.00

Bệnh nhân có triệu chứng liệt tứ chi kiểu trung ương và yếu cơ hoành. Định khu vị trí tổn thương nào phù hợp ở bệnh nhân này?

- ☐ a. Tủy cổ C8
- ☐ b. Tủy cổ C7
- ☐ c. Tủy cổ C5-6
- ☒ d. Tủy cổ C1-4

**Question 4**

Complete

Mark 1.00 out of  
1.00

Tổn thương cắt ngang tủy giai đoạn cấp tính có đặc điểm gì?

- ☐ a. Tăng PX gân cơ, tăng trương lực cơ, có dấu Babinski
- ☐ b. Giai đoạn choáng tủy kéo dài nhiều tháng đến nhiều năm
- ☒ c. Là giai đoạn choáng tủy, các chi liệt mềm
- ☐ d. Khiếm khuyết chức năng cảm giác cao hơn mức tổn thương

**Question 5**

Complete

Mark 1.00 out of  
1.00

Tổn thương ở đâu có thể gây ra hội chứng Horner?

- ☒ a. Tủy cổ
- ☐ b. Tủy ngực
- ☐ c. Chùm đuôi ngựa
- ☐ d. Nón tủy



Quảng Ngãi