

(ĐỢT 2 - 2021) PRE-TEST CBL RỐI LOẠN TRIỆU CHỨNG CƠ THỂ VÀ CÁC RỐI LOẠN LIÊN QUAN

GV Hướng dẫn: ThS. Bùi Xuân Mạnh

Thời gian làm bài: 05 phút (từ 8h00 ngày 25/11/21 đến 8h05 ngày 25/11/21)

Lưu ý: đúng 8h05 25/11/2021 tất cả sinh viên phải nộp bài, các bài nộp sau thời gian trên sẽ không được nhận

...

* Required

1. Họ và tên: *

(Viết HOA, có dấu, ví dụ: NGUYỄN VĂN A)

Enter your answer

2. Mã số sinh viên: *

(Ví dụ: 111160001; 111160060; ...)

Enter your answer

3. Tổ: *

☐ 19

☐ 20

☐

☐ 21

☐ 22

☐ 23

☐ 24

4. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về đặc điểm lâm sàng của rối loạn giả bệnh (factitious disorder) áp đặt lên bản thân theo DSM-5?

I. Các dấu hiệu, triệu chứng về thể chất hoặc tâm lý giả tạo, hoặc gây ra thương tích hoặc bệnh tật, liên quan đến sự lừa dối được xác định.

II. Yếu tố tâm lý hoặc hành vi ảnh hưởng xấu đến bệnh lý thực thể.

III. Bệnh nhân tự giới thiệu mình với người khác bị ốm, suy yếu hoặc bị thương.

IV. Hành vi lừa dối có sự tương thưởng bên ngoài rõ rệt nào.

V. Hành vi không được giải thích tốt hơn bởi một rối loạn tâm thần khác.

(1 Point)

☐ 4

☐ 3

☐ 1

☐ 2

5. Beverley Gail Allitt sinh ngày 4/10/1968 tại Grantham, Lincolnshire, Anh. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã có những hành vi khác thường so với những đứa trẻ cùng lứa. Cô thường xuyên quẩn bầy quanh người dù không hề bị thương, thích tự làm đau chính mình và muốn được vào bệnh viện. Allitt còn từng tìm kiếm sự chú ý từ các vị bác sĩ ở nhiều bệnh viện khác nhau. Thậm chí có lần Allitt còn thuyết phục được bác sĩ rằng mình bị đau ruột thừa và tiến hành cắt bỏ ruột thừa, trong khi cô hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường. Beverley Allitt được mệnh danh là "y tá tử thần" vì đã liên tục sát hại hơn chục đứa trẻ mà mình chăm sóc trong bệnh viện. Vụ giết người của Allitt diễn ra trong 59 ngày, kéo dài từ cuối mùa đông đến mùa xuân năm 1991. Phương pháp giết người của Allitt khiến nhiều người phải kinh hãi và không thể tin được, vì cô ta thích tiêm một lượng lớn insulin vào người nạn nhân khiến nạn nhân sốc và qua đời. Allitt được nhiều nhà tâm thần học cho rằng mắc hội chứng Munchausen. Hội chứng Munchausen lần đầu tiên được bác sĩ người Anh Richard Asher ghi nhận năm 1951. Ông đặt tên hội chứng theo tên một bá tước người Đức ở thế kỷ 18 Hieronymous Karl Friedrich von Munchausen - người huênh hoang với bạn bè về những chuyến phiêu lưu giả tạo của mình. Theo DSM-5, hội chứng Munchausen sẽ được xếp vào rối loạn tâm thần nào?

(1 Point)

- ☐ Các yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến bệnh lý y khoa (psychological factors affecting other medical conditions)
- ☐ Rối loạn lo âu bệnh tật (illness anxiety disorder)
- ☐ Rối loạn triệu chứng cơ thể (somatic symptom disorder)
- ☐ Rối loạn giả bệnh (factitious disorder)

6. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về đặc điểm lâm sàng của rối loạn triệu chứng cơ thể (somatic symptom disorder) theo DSM-5?

- I. Bệnh nhân tự giới thiệu mình với người khác bị ốm, suy yếu hoặc bị thương.
- II. Suy nghĩ, cảm nhận hoặc hành vi quá mức liên quan đến các triệu chứng cơ thể.
- III. Tình trạng có triệu chứng phải kéo dài (thường là hơn 6 tháng).
- IV. Bệnh nhân có một hoặc nhiều triệu chứng không giải thích được về mặt y khoa (medically unexplained symptoms).

(1 Point)

- ☐ 4
- ☐ 2

☐ 1

☐ 3

7. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về đặc điểm lâm sàng của rối loạn chuyển dạng (conversion disorder) theo DSM-5?

I. Một hoặc nhiều triệu chứng thay đổi chức năng vận động tự chủ hoặc chức năng cảm giác.

II. Rối loạn chuyển dạng cần được chẩn đoán phân biệt với các bệnh lý thực thể thần kinh.

III. Khởi phát của rối loạn chuyển dạng có thể liên quan đến stress hoặc sang chấn tâm lý.

IV. Hành vi lừa dối không có sự tương thưởng bên ngoài rõ rệt nào đó.

(1 Point)

☐ 4

☐ 2

☐ 3

☐ 1

8. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về đặc điểm lâm sàng rối loạn lo âu bệnh tật (illness anxiety disorder) theo DSM-5?

I. Mỗi bận tâm về bệnh tật đã xuất hiện ít nhất 6 tháng.

II. Một hoặc nhiều triệu chứng thay đổi chức năng vận động tự chủ hoặc chức năng cảm giác.

III. Các triệu chứng cơ thể không có hoặc nếu có, chỉ ở mức độ nhẹ.

IV. Bệnh nhân thực hiện các hành vi liên quan đến sức khỏe quá mức.

V. Mỗi bận tâm liên quan đến bệnh tật không được giải thích tốt hơn bởi một rối loạn tâm thần khác.

(1 Point)

☐ 2

☐ 3

☐ 1

☐ 4

Submit

Never give out your password. [Report abuse](#)

This content is created by the owner of the form. The data you submit will be sent to the form owner. Microsoft is not responsible for the privacy or security practices of its customers, including those of this form owner. Never give out your password.

Powered by Microsoft Forms |

The owner of this form has not provided a privacy statement as to how they will use your response data. Do not provide personal or sensitive information.

| [Terms of use](#)