## Pretest CBL sốc 11/10/22

• •

_		
Rec	II IIre	חנ
1100	Juli	·u
	Red	Require

1. Họ và tên \*

Dương Thị Thanh Tú

2. Tổ - lớp \*

Y17H-45

- 3. Triệu chứng lâm sàng nào là quan trọng nhất trong chẩn đoán sốc?(1 Point)
  - C. Giảm tưới máu
  - O. Chi mát
  - B. Huyết áp giảm
  - A. Mạch tăng
- 4. Tại sao bệnh nhi sốc cần thở oxy?(1 Point)
  - A. Bệnh nhân sốc có suy hô hấp kèm
  - O B. Tăng liên kết của hồng cầu với oxy
  - D Tăng oxy hoà tan

○ C. Tăng tưới máu
5. Trong các xét nghiệm sau, xét nghiệm nào giúp chẩn đoán sốc?(1 Point)
O D. Cấy máu có vi khuẩn
A. Công thức máu có bạch cầu tăng
C. Khí máu toan chuyển hoá anion gap tăng
○ B. CRP tăng
6. Trong chẩn đoán sốc ở trẻ em, yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất?(1 Point)
O D. Lactate tăng
B. Huyết áp giảm
○ A. Chi mát
○ C. CRT kéo dài
7. Bệnh nhi bị sốc nhiễm trùng - tiêu chảy cấp, loại dịch chống sốc trong giờ đầu nào tối ưu? (1 Point)
○ C. Albumin
O. Dextrose 5% in lactate
A. Natriclorua 0,9%

ig ony ito

○ B. Natriclorua 3%
8. Điều trị chính yếu ở bệnh nhi sốc tim là gì?(1 Point)
O D. Thở oxy
B. Tăng co bóp cơ tim
A. Dịch chống sốc
○ C. Tăng co mạch
<ol> <li>9. Bệnh nhi bị sốc nhiễm trùng, nồng độ hemoglobin cần duy trì tối thiểu bao nhiêu?</li> <li>(1 Point)</li> </ol>
○ C. 8 g/dL
○ B. 9 g/dL
○ D. 7 g/dL
• A. 10 g/dL
<ul><li>10. Bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng – nhọt da vùng cẳng chân (P), nhiễm từ cộng đồng, kháng sinh đầu tay thích hợp là gì?</li><li>(1 Point)</li></ul>
B. Vancomycin
○ C. Meropenem
O. Ceftazidim

<ul><li>○ A. Ceftriaxone</li></ul>
11. Bệnh nhi bị sốc nhiễm trùng - tiêu chảy cấp, loại dịch chống sốc trong giờ đầu nào tối ưu? (1 Point)
O D. Dextrose 5% in saline
A. Lactate Ringer
O B. Natriclorua 3%
C. Albumin
<ul><li>12. Bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng, xét nghiệm nào cần theo dõi sát để đánh giá tình trạng tưới máu?</li><li>(1 Point)</li></ul>
O B. Ure, creatinin
A. Công thức máu
D. Khí máu động mạch
○ C. AST, ALT
13. Triệu chứng nào sau đây cần nhập cấp cứu?(1 Point)
C. Tím trung ương
○ A. Thở nhanh

B. Thở co lõm
D. Ói nhiều không uống được
<ul><li>14. Bệnh nhi bị sốc xuất huyết, nồng độ hemoglobin cần duy trì tối thiểu bao nhiêu?</li><li>(1 Point)</li></ul>
○ C. 8 g/dL
• A. 10 g/dL
○ B. 9 g/dL
O D. 7 g/dL ×
15. Điều trị chính yếu ở bệnh nhi sốc nhiễm trùng là gì?(1 Point)  A. Đặt nội khí quản sớm
<ul><li>○ C. Tăng co mạch</li></ul>
O. Thở oxy
B. Tăng co bóp cơ tim
16. Ở bệnh nhi sốc, mục tiêu ScvO2 cần đạt được là bao nhiêu? (1 Point)
O D. 60% - 70%
O B. 80% - 90%
○ A. 90% - 100%

•	C. 70% - 80%
17. Tr	ong các trẻ sau, trẻ nào nên được nhập cấp cứu?(1 Point)
0	C. Trẻ bị gãy xương
•	D. Trẻ bị hóc dị vật đường thở
0	B. Trẻ bị bỏng ở bàn tay (P)
0	A. Trẻ 2 tuổi sốt co giật cách 1h, hiện hết giật còn sốt, ba trẻ lo lắng vì tiền căn có sốt co giật
18. Bé	ệnh nhi sốc phản vệ, vận mạch đầu tay là gì?(1 Point)
0	C. Dopamin
0	D. Dobutamin
•	A. Adrenalin
0	B. Noradrenaline
10 Đi	iều trị chính yếu ở bệnh nhi sốc giảm thể tích là gì?(1 Point)
19. DI	
0	B. Tăng co bóp cơ tim
0	C. Tăng co mạch
0	D. Thở oxy
0	A. Dịch chống sốc

20. Phân giai đoạn sốc dựa vào triệu chứng nào?(1 Point)
○ C. Huyết áp tâm trương
B. Huyết áp tâm thu
A. Mạch nhanh
O. Huyết áp trung bình
21. Ở bệnh nhi sốc, khí máu động mạch có bất thường sau là phù hợp tình trạng giảm tưới máu? (1 Point)
B. Toan chuyển hoá, anion gap tăng
O. Kiềm chuyển hoá
○ C. Toan hô hấp
A. Toan chuyển hoá, anion gap bình thường
22. Điều trị chính yếu ở bệnh nhi sốc phản vệ là gì?(1 Point)
O. Thở oxy
C. Tăng co mạch
A. Dịch chống sốc
B. Tăng co bóp cơ tim

## Submit

Never give out your password. Report abuse

This content is created by the owner of the form. The data you submit will be sent to the form owner. Microsoft is not responsible for the privacy or security practices of its customers, including those of this form owner. Never give out your password.

Powered by Microsoft Forms |

The owner of this form has not provided a privacy statement as to how they will use your response data. Do not provide personal or sensitive information.

Terms of use