
#### ĐÈ 2 - THỊ NGOẠI LẦN I

#### Y3 (NH 2013-2014) NGÀY 17/05/2014 (40 PHÚT)

#### Chon một câu phù hợp nhất. Không dùng bút chì, bút xóa và mưc đỏ

- Thần kinh ngồi (tọa) được tạo nên từ các rễ
  - A. L3, L4, L5, S1
  - B. L.3, L4, L5, S1, S2
  - C. L2, L3, L4, L5
  - D. L5, S1, S2, S3
  - £ L4, L5, S1, S2, S3
- 2. Phương pháp sinh thiết nào sau đây thường dùng cho hạch cổ
  - Sinh thiết trọn
  - B. Sinh thiết bằng kìm bấm
  - C. Sinh thiệt bằng kim khoan
  - D. Sinh thiết qua ngà nội soi
  - E. Sinh thiết một phần
- 3. Khi liệt dây giữa, CHON CÂU SAI
  - Không gấp ngón nhẫn và út được
  - B. Bantay có dáng "Bàn tay nhà tiên tri"
  - C. Ngón cái không làm động tác "đếm ngón tay" được
  - D. Gấp bàn tay khó khăn
  - E. Không gấp ngón chỏ được
- 4. Triệu chứng tắc ruột cơ học, CHON CÂU SAI
  - A. Bí trung và đại tiện là triệu chứng quyết định trong chấn đoán
  - B. Đau bụng quặn từng cơn, về sau khoảng cách các cơn đau ngắn lại và thời gian của cơn đau dài ra
  - C. Bung chướng là triệu chứng bao giờ cũng có
  - Nôn ói rất phổ biến, tắc ruột càng thấp nôn càng nhiều
    - E. Dấu hiệu rấn bò là triệu chứng thực thể quan trọng nhật
- 5. X quang vú
  - A. Hướng dẫn hữu ích cho sinh thiết
  - B. Không có hình ảnh giả trên phim
  - C. Là cận lâm sàng chính xác nhất trong chân đoán ung thư vú
  - D. Không có vai trở phụ giúp chấn đoán cắc u vú có kích thước nhỏ
  - E. Xêrô nhũ ký cho ít chi tiết hơn X quang
- 6. Cân lâm sàng nào có giá trị nhất trong chiến đoán ung thư tuy
  - A. Siêu àm
  - B. CA 19-9
  - C. Chụp động mạch
  - D. Chụp đường mật
  - Chụp cắt lớp vi tính 🗸
- 7. Bệnh giãn tĩnh mạch chi dưới có nguyên nhân bệnh sinh là
  - A. Thuyên tắc tĩnh mạch nông
  - B. Tổn thương van tĩnh mạch
  - C. Tổn thương hệ tĩnh mạch sâu
  - D. Tổn thương của hệ tĩnh mạch sâu
  - Tổn thương van tĩnh mạch và giảm trương lực của thành tĩnh mạch

Cách chọn: chọn A→ Bỏ A, chon D→



(chỉ được chọn tối đa 2 lần)

1

### ĐĖ 2 - THI NGOẠI LẬN 1 Y3 (NH 2013-2014) NGÀY 17/05/2014 (40 PHÚT)

	TO ITITE TO T	5 20-1		. 7:
Chon một câu n	phù hợp nhất	Không dùng bút	chì, bút xóa y	ia mirc ao

- 8. Khi liệt dây giữa, giảm hoặc mất cám giác ở. CHON CÂU SAI
  - A. Mặt mu các đốt 2, 3 ngón chỏ, giữa và nừa ngoài ngón nhẫn
  - B. Phần ngoài gan tay, từ đường của trục ngón nhẫn trở ra /
  - C. Mặt gan các ngón cái, chỏ và giữa /

Bờ ngoài gò cái

- E. Mặt gan nửa ngoài ngón nhẫn
- 9. Biến chứng thường gặp của ưng thư đại trang là
  - A. Rò từ khối u sang các tạng lân cận

🗗 Tắc ruột 🗸

- C. Viêm phúc mạc
- D. Nhiễm trùng khối u
- E. Xuất huyết tiêu hóa
- 10. Theo thể kinh điển, viêm túi mật cấp do sởi diễn tiến theo mấy giai đoạn
  - A. 3 A. 4
  - C. 2
  - D. 6
  - E. 5
- 11. Vai trò của X-quang đại tràng bằng thụt tháo baryt hoặc bơm hơi. CHON CÂU SAI
  - A. Có khả năng chân đóan nguyên nhân của lồng ruột
  - Chân đoán được khả năng tổn thương máu nuôi đoạn ruột bị lồng hay chưa
  - C. Giúp tháo lồng mà không cần mỏ
  - D. Chẩn đoán xác định lồng ruột
  - E. Giúp phân biệt lồng ruột với những nguyên nhân tắc ruột khác
- 12. Khi khám hệ thống động mạch, ngoài việc xác định tổn thương còn phải
  - A. Việc xác định nguyên nhân phải dựa vào các cận lâm sàng phức tạp và đất tiền
  - B. Việc điều trị không cần phải dựa vào nguyên nhân
  - C. Ở người trên 50 tuổi, nguyên nhân thường gặp nhất là tắc động mạch do xơ vữa. Ở người dưới 40, nên nghĩ đến bệnh Buerger
  - D. Cần sinh thiết động mạch để xác định chân doán
  - Xác định nguyên nhân của tổn thương
  - 13. Trong chấn đoán hẹp môn vị, người ta hút dịch dạ dày vào buổi sáng khi mới ngủ dây, Dịch dạ dày phải LON HON
    - (100ml

4 tiếng sau ăn >300ml

- B. 30ml
- dịch tiết dạ dày 12 tiếng > 750ml
- (C) 200ml
- dich qua hút dịch tồn đọng qua đêm > 200
- D. 50ml
- E. 150ml
- 14. Bệnh nhân nam, 25 tuổi, bị chấn thương bụng. Thăm khám thấy có hội chứng xuất huyết trong ổ bụng. Tạng có khả năng bị vỡ nhiều nhất là
  - A. Ruôt

Cách chọn: chọn  $A \rightarrow \bigcirc$  B C D

Bò A, chọn  $D \rightarrow \bigcirc$  B C

(chỉ được chọn tối đa 2 lần)

#### ĐĖ 2 - THI NGOẠI LÂN I Y3 (NH 2013-2014) NGÀY 17/05/2014 (40 PHUT)

Chọn một câu phù hợp nhất. Không dùng bút chi, bút xóa và mực đọ

- B. Gan
- C. Tuy
- D. Thân
- P. Lách
- 15. Thuyên tắc tĩnh mạch sâu hay xảy ra ở
  - Whững người nằm viện lâu ngày, ít vận động, ung thư giai đoạn cuối và kèm theo suy kiệt
    - B. Trè em
  - C. Những người béo phi và ít vận động
  - D. Bệnh lý mạch máu
  - E. Bệnh nhân bị chấn thương có gãy xương đủi
- 16. Chẩn đoán thoát vị bẹn đùi thường dựa vào
  - A. Chup cắt lớp vi tính
  - B. Siêu âm bong
  - C. Chup cản quang xoang phúc mạc
  - D: Chup cộng hưởng từ
  - Khám lâm sảng
- 17. Cơ thẳng bụng nổi hẳn rõ nhất trong
  - Viêm túi mật Thủng dạ dày
  - C. Sởi ống mật chủ
  - D. Tắc ruột
  - E. Viêm phúc mạc
  - 18. Vai trò của siêu âm Doppler trong chắn đoán bệnh lý của động mạch
    - A. Giúp xác định hình thái và huyết động học với độ chính xác cao
    - B. Chỉ có vai trò trong xử trí cấp cứu
    - (C) Là cận lâm sàng đầu tiên nên thực hiện trong chắn đeán bệnh lý của động mach
      - D. Không có giá trị gì và quá tồn kém
    - E. Có thể thay thế được các cận lâm sảng về hình thái học khác như chụp động mach, chup động mạch với cộng hưởng từ
  - 19. Triệu chứng của thoát vị ben đùi. CHON CÂU SAI
    - A. Thoát vị ket là khối thoát vị không đầy xẹp được và không đầu
    - B. Thoát vị nghẹt là khối thoát vị bị chèn ép ở cổ túi và thiếu máu nuôi tạng thoát
    - C. Thoát vị gián tiếp làm nghiệm pháp chặn lỗ ben sâu khối phống sẽ không xuất
    - Thoát vị ben trực tiếp làm nghiệm pháp chạm ngôn sẽ chạm đầu ngôn
    - E. Khối thoát vị đùi nằm dưới nếp ben
  - Dấu hiệu óc ách khi đói thấy trong
    - Hep môn vị
      - B. Tắc ruột
      - C. Viêm tụy cấp

Cách chọn: chọn A→ CDE (chỉ được chon tối đa 2 lắn)

# ĐỀ 2 - THI<sub>4</sub>NGOẠI LÀN I Y3 (NH 2013-2014) NGÀY 17/05/2014 (40 PHÚT) Chơn một câu phù hợp nhất. Không dùng bút chì, bút xóa và mực đỏ

D. Thủng dạ dày

	E. Viêm phúc mạc
21.	Khi khám hệ thống mạch máu, chúng ta phải chú ý đến. CHỌN CÂU SAI  A. Các vết loét rối loạn dinh dưỡng trên da  B. Các biểu hiện về tim mạch ở trung tâm  C. Đầu các chi  D. Các triệu chứng của thiếu máu vùng ngoại vi  Bắt mạch chi trên, chi dưới
22.	Khám vùng đầu mặt cổ  Nhìn và sở cho nhiều dữ kiện nhất trong việc thăm khám  B. Khi khám chỉ cần dùng tay không cần dùng phương tiện hỗ trợ nào  C. Quan trọng nhất là gõ và nghe  D. Không-cần phải theo thứ tự rõ ràng  E. Hỏi bệnh sử không cần quá chi tiết
23.	Khí nghi ngờ bệnh nhân bị viêm ruột thừa, ta cần làm cận lâm sàng gì để chẩn loán bệnh Công thức máu B. X-quang ngực thẳng C Chụp điện toán cắt lớp ổ bụng $\sim S \widehat{A}$ D. Tổng phân tích nước tiểu E. X-quang bụng đứng
24.	Dấu hiệu Howship Romberg thấy trong  A. Viêm phúc mạc  B. Tắc ruột  C. Thoát vị bẹn nghẹt  D. Thoát vị dùi nghẹt  Thoát vị bịt nghẹt
25.	Sinh lý bệnh của hẹp mốn vị. CHỌN CÂU SAI  A. Mất diện giải  B. Rối loạn dinh dưỡng  Toan chuyển hóa kiểu  D. Mất nước  E. Suy thận trước thận
26.	Triệu chứng lâm sảng làm ta nghĩ đến ung thư đại tràng là  Tiêu ra máu B. Táo bón C. Chán ăn D. Đạu bụng E. Tiêu chảy
	. Chẩn đoán xác định ung thư thực quản dựa vào cận lâm sàng nào là tốt nhất  A. X-quang ngực thẳng  B. Cộng hưởng từ  Nội soi thực quản – dạ dày  ich chọn: chọn A→  B C D E (chỉ được chọn tối đa 2 lần)  Bỏ A, chọn D→
	DO U) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (

CXE

#### ĐĖ 2 - THI NGOẠI LÀN 1 Y3 (NH 2013-2014) NGÀY 17/05/2014 (40 PHÚT)

Chọn một câu phù hợp nhất. Không dùng bút chì, bút xóa và mực đỏ

- D. Chup cắt lớp vi tính
- E. Chup thực quản cản quang
- 28. Nguyên nhân thường gặp nhất của viễm phúc mạc thứ phát là
  - A. Thùng hồi tràng
  - B. Thùng túi mật
  - C. Thủng khối u đại tràng
  - Thủng ruột thừa viêm
    - É. Thủng dạ dày tá tràng
- 29. Vai trò của siêu âm trong lồng ruột. CHỌN CÂU SAI
  - Chân đoán được nguyên nhân của lồng ruột trong đa số trường hợp
    - B. Xác định khối lồng có được tháo hay chưa
    - C. Giúp chẩn đoán xác định lồng ruột
    - D. Cho biết những dấu hiệu tháo lồng ít có khả năng thành công
    - E. Theo dõi tháo lồng
- 30. Cận lâm sàng để chấn đoán xác định thủng ổ loét đạ dày thường được sử dụng là
  - A. Định lượng Ure và Creatinine
  - Chup bung đứng không sửa soạn
  - C. Công thức máu
  - D. Chup ngực thẳng
  - E. Chup cắt lớp vi tính
- 31. Dây thần kinh giữa chi phối cảm giác. CHON CÂU SAI
  - A. Mặt gan nửa ngoài ngón nhẫn
  - B. Mặt gan các ngón cái, chỏ và giữa -
  - C. Nửa ngoài gan tay
  - D. Mặt mu đốt hai, ba ngón chỏ, giữa và nửa ngoài ngón nhẫn
  - Nửa trong gan tay /
- 32. Triệu chúng sớm của ung thư dạ dày là
  - A. Sờ được khối u ở thượng vị, di động, không đau
  - B. Da xanh do thiếu máu
  - C. Đau thượng vị âm i, về đêm
  - D. Phù chân
  - An không ngon, chán ăn, chậm tiêu
- 33. Cân lâm sàng tốt nhất để chẩn đoán xác định ung thư dạ dày là
  - A. Nội soi dạ dày
    - B. X-quang dạ dày cản quang
    - C. Siêu âm bụng
    - D. CEA
    - E. Chup cắt lớp vi tính
- 34. Khám chấn thương sọ não nhằm
  - Trả lời câu có phải mổ cấp cứu vì CHấN THƯƠNG SỌ NÃO hay không
    - B. Xem có lún sọ không
    - C. Theo dõi tình trạng bệnh nhân
    - D. Tim các dấu hiệu cho biết có thương tồn thần kinh

Cách chọn: chọn  $A \rightarrow B C D E$  (chỉ được chọn tối đa 2 lần)

Bỏ A, chọn  $D \rightarrow B C D E$ 

## ĐỂ 2 - THI NGOẠI LÀN I Y3 (NH 2013-2014) NGÀY 17/05/2014 (40 PHÚT)

Chọn một câu phù hợp nhất. Không dùng bút chì, bút xóa và mực đỏ

•			-			711				11
F	; ;	Đánh	giá	mírc	đô	năng/	nhe	sau	chan	thương

- 35. Chọc dò ổ bụng khi nghi ngờ
  - A. U bụng
  - B. Tắc ruôt
  - C. Xoắn đại tràng chậu hông
  - Ø Võ lách
    - E. Hẹp môn vị
- 36. Triệu chứng lâm sàng thường gặp trong ung thư tụy là
  - Vàng da, đau thượng vị, sụt cân
    - B. Đau thượng vị, sụt cân, nôn ói
    - C. Vàng da, sụt cân, chán ăn
    - D. Vàng da, đau thượng vị, ngứa
    - E. Đau thượng vị, sụt cân, yếu cơ

37. Siêu âm Doppler màu mạch máu (trong bệnh lý mạch máu) là

Quản trọng và là cận lâm sàng đầu tạy hướng dẫn cho công tác chân đoán và diễu trị

B. Tổn kém và không hữu ích

- C. Kết quả không chính xác và phụ thuộc vào trình độ người làm siêu âm
- D. Chi làm được ở các trung tâm lớn
- . E. Là cận lâm sàng rất quan trọng
- 38. Bệnh nhân nam, 30 tuổi, đau hố chậu phải 2 ngày, chán ăn, sốt 38,5 °C Khám: ấn đau nhiều kèm đề kháng vừa vùng hố chậu phải, hạ v) ấn đau vừa kẽm đề kháng nhẹ. Hố chậu trái ấn đau nhẹ. Bạch cầu đa 24,5 K/uL, Đa nhân trung tính 89,4%. Siêu âm có tụ dịch hố chậu phải và có dấu ấn hình bia ở hố chậu phải kích thước 12mm, Bệnh nhân này bị viêm ruột thừa thế gi
  - Niêm phúc mạc khu trú
  - B. Viêm mù
  - C) Viêm phúc mạc toàn thể
  - D. Đám quánh
  - E. Ap-xe
- 39. Cắt lạnh hay sinh thiết tức thì thường được chỉ định cho
  - A. Các trường hợp ung thư vú giai đoạn sớm
  - B. Các trường hợp chọc hút bằng kim nhỏ (FNA) là ung thư vú


C. Các trường hợp ung thư vú không còn chỉ định phẫu

Ocac trường hợp tồn thương nhỏ ở vú khó phân biệt lành ác trên lâm sàng

E. Tất cả các trường hợp u vú

- Chẩn đoán lâm sàng một hạch cổ dọc theo tĩnh mạch hầu trong cần phân biệt với.
  - A. Bướu tuyến giáp
  - B. Bướu tuyến cảnh
  - C. Nang khe mang
  - D. Bướu cực dưới tuyến mang tai
  - E. Bướu bao Schwann -

Cách chọn: chọn A→ Bỏ A; chọn D→



#### DÈ 2 - THI NGOẠI LẦN 1 Y3 (NH 2013-2014) NGÀY 17/05/2014 (40 PHÚT)

Chon một câu phù hợp nhất. Không dùng bút chì, bút xóa và mực đỏ

41.	Có	mây	điểm	niệu	quản
					-

- A. 4
- B. 1
- C 2
- D. 5
- 42. Các cận lâm sàng thường làm trong viêm túi mật do sởi. CHỌN CÂU SAI
  - A. Công thức máu
  - B) Chụp cắt lớp vi tính
    - C. Siêu âm bụng
    - D. Amylase
    - E. Bilirubin, men gan
- 43. Ung thư thực quản khởi phát từ tế bào lát tầng trên niêm mạc thực quản, có rất nhiều yếu tố nguy cơ. CHON CÂU SAI
  - A. Nghiện rượu, thuốc lá
  - B. Flội chúng Plummer-Vinson: thường có ở nam giới, tỉ lệ hóa ác 40%
    - C. Bồng thực quản do hóa chất
  - D. Có tiền sử xa trị vùng ngực
  - E. Thire quan Barrett
- 44. Cận lâm sàng nào có giá trị trong chấn đoán và theo dỗi ung thư tế bào gan. CHON CÂU SAI
  - A. Chụp động mạch gan
  - B. Chup cắt lớp vi tính
  - CEA
    - D. AFP
    - E. Siêu âm 👃
- 45. Ung thư gan nguyên phát phần lớn bắt nguồn từ tế bào gan (phần còn lại từ tế bào ống mật), có rất nhiều yếu tố nguy cơ. CHON CÂU SAI
  - A. Dioxin có thể gây ung thư gan
  - B. Nói chung, hơn 60% ung thư gan trên nên xơ gan
  - C. Aflatoxin B1 có thể gây ung thư gan
  - D. Kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HbsAg) chiếm tỉ lệ cao trong ung thư gan
  - Kháng thể chống viêm gan C chiếm tì lệ thấp hơn 50% trong ung thư gan
- 46. Chẩn đoán phân biệt thùng dạ dày với các bệnh sau đây. NGOẠI TRÙ
  - A. Viêm phúc mạc ruột thừa
  - B. Viêm phúc mạc do viêm túi mật
  - C. Thủng ruột non
  - D. Yiêm tụy
  - E Viêm dạ dày
- 47. Triệu chứng nào có giá trị nhất trong viêm phúc mạc
  - A. Bung trưởng
  - B. Lắc óc ách

Cách chọn: chọn  $A \rightarrow B C D E$ Bò A, chọn  $D \rightarrow B C D E$ 

## ĐỂ 2 - THI NGOẠI LẦN 1 Y3 (NH 2013-2014) NGÀY 17/05/2014 (40 PHÚT)

Chọn một cấu phù hợp nhất. Không dùng bút chì, bút xóa và mực đọ

- C. Quai ruột nổi
- D. Dấu hiệu rắn bò
- Đề kháng thành bụng
- 48. Điểm McBurney đau trong bệnh
  - A Viêm túi mật
  - B. Viêm ruột thừa
    - C. Viêm tuy cấp
  - D. Sỏi ống mật chủ
  - E. Loét da dày tá tràng
- 49. Khám chấn thương sọ não gồm các nội dung

A. Tri giác, các dây thần kinh sọ, phản xạ gần xương từ chỉ, các dấu hiệu sinh tổn, các dấu màng não

B. Khám tổng quát (lưu ý về thần kinh như: dấu hiệu vỡ sản sọ, gãy xương mặt, chấn thương cột sống,...), khám thần kinh (các dây thần kinh sọ, tri giác, vận dống cảm giác và phản xạ...)

Tri giác, dấu hiệu sinh tồn, mắt-đồng tử, vận động, thương tích ở đầu mặt


- D. Tim các thương tích ở đầu mặt, khẩm dấu hiệu chấn thương cột sống, các dấu hiệu sinh tồn và dấu thần kinh, khám tri giác, vận động, cảm giác, phản xạ, tiểu não
  - E. Khám theo vùng: Đầu, ngực, bụng, cột sống và từ chi
- 50. Sờ nắn tuyến vú, CHON CÂU SAI

Khả năng phát hiện ung thư vú qua sờ nắn là dưới 50%

- B. Thực hiện kĩ thuật Velpeau khi thâm khám: lỏng bản tay phẳng, ép nhẹ vào tuyến vú
- C. Khám ở cả hai tư thể: ngôi và năm
- D. Phải biết mật độ bình thường, rất đặc biệt của mô vù
- E. Đôi khi nên theo sự hướng dẫn của bệnh nhân để dễ tim rấ tổn thương
- 51. Điểm Mayo Robson đau trong bệnh
  - A. Viêm túi mật
  - B. Viêm tụy cấp
  - C. Loét da dày tá tràng
  - D. Sôi niệu quản
  - E. Sói ông mật chủ
- 52. Dấu hiệu cơ thăn thấy trong
  - Viêm ruột thừa sau manh tràng .
    - B. Sòi niệu quản phải
    - C. Việm túi mật
    - D. Viêm ruột thừa đười gan
    - E. Viêm ruột thừa trong tiểu khung
- 53. Triệu chứng X-quang của tắc ruột non. CHỌN CÂU SAI
  - A. Mực nước hơi nằm giữa bụng
  - B. Mực nước hơi chênh nhau trên cùng một quai ruột

Có vòm cao

Bỏ A, chọn D→



#### ĐỂ 2 - THI NGOẠI LẦN 1 Y3 (NH 2013-2014) NGÀY 17/05/2014 (40 PHÚT)

Chọn một câu phù hợp nhất. Không dùng bút chỉ, bút xóa và mực đỏ

- Nếp niêm mạc thường nắm sát nhau
- E. Có chân rộng
- 54. Khám chấn thương sọ não
  - A. Lưu ý đến khám mạch, huyết áp
  - Phải khám toàn diện
    - Ć. Đặc biệt lưu ý đến khám cột sống và bụng
    - D. Chỉ khám thần kinh
    - E. Rất quan tâm đến tinh trạng hô hấp
- 55. Chụp cắt lớp vi tính sọ não trong chấn thương khi. CHỌN CÂU SAI
  - A. Xem có lún so
  - B. Nghi ton thương não
  - Chân thượng dầu
    - D. Khảo sát não khi có vết thương sọ não
    - E. Nghi ngờ có tụ máu trong sọ
- 56. Bệnh nhân nam, 30 tuổi, vào viện vì đau bụng dưới sườn phải 3 ngày, sốt 39°C. Khám: Mạch 90lần/phút, Huyết áp 120/70mmHg, Vàng mắt. Ân đau dưới sườn phải vừa, không đề kháng, thượng vị và dưới sườn trái đau ít. Cần cho bệnh nhân này làm các cận lâm sàng nào. NGOẠI TRỦ
  - X-quang bung
  - B. Amylase
  - C. Siêu âm bụng
  - D. Công thức máu
  - E. Bilirubin, men gan
- 57. Bệnh nhân sỏi đường mật bị biến chứng viêm đường mật, sau đó rơi vào tình trạng nhiễm trùng huyết sốc nhiễm trùng, ngoài tam chứng Charcot, bệnh nhân còn có biểu hiện điển hình là
  - A. Tụt huyết áp và xuất huyết tiêu hóa
  - B. Tụt huyết áp và da nổi bông
  - C. Tut huyết áp và báng bụng
  - Tụt huyết áp và rối loạn tri giác
  - E. Tụt huyết áp và bụng để kháng
- 58. Thủ thuật thăm âm đạo hoặc thăm trực tràng cần thiết trong các bệnh cảnh nào sau đây, CHON CÂU SAI
  - A. Tiêu ra máu
  - R Bón
  - Viêm ruột thừa cấp thể thường gặp
  - D. Viêm phúc mạc chậu do viêm phần phụ
  - E. Bí tiểu
- 59. Các nguyên nhân gây viêm ruột thừa bao gồm. CHỌN CÂU SAI
  - A Phì đại các nang bạch huyết
  - Viêm manh tràng
  - C. Ú đọng sởi phân
  - D. U thành ruột thừa

Cách chọn: chọn A→ ABCDE
Bò A, chọn D→

(chỉ được chọn tối đạ 2 lần)

# DÈ 2 - THI NGOẠI LÂN 1 Y3 (NH 2013-2014) NGÀY 17/05/2014 (40 PHÚT)

Chon một cấu phù hợp nhất. Không dùng bút chỉ, bút xóa và mực độ

E. Vật lạ như hạt chanh

60. Bệnh nhân nam, 28 tuổi, bị chấn thương bung. Thăm khám thấy có hội chứng viêm phúc mạc. Tạng có khả năng bị võ nhiều nhất là

A. Da dày B. Ruột non C. Tá tràng

D. Đại trùng /

E. Gan