



Y16 - Đợt 1

NỘI KHOA Y4 (INTERNAL MEDICINE Y4)

Dashboard ► My courses ► NOI4 ► TIÊU HÓA ►
Pretest - Tiếp cận chẩn đoán xơ gan và biến chứng - Đợt 1

Question 1

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh nhân nam 43 tuổi, nhập viện vì **bụng to**. Cách nhập viện 1 tháng, bệnh nhân phát hiện bụng to tăng dần, sau đó bị phù nhẹ đối xứng 2 mu bàn chân. Khám bệnh: bệnh nhân tỉnh, niêm hồng, kết mạc mắt vàng, phù nhẹ 2 chân. Bụng mềm, báng bụng toàn thể độ 3, **lách to độ 1**. Ở bệnh nhân này, **hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa được xác lập dựa vào các triệu chứng nào ?**:

Select one:

- ☐ a. Phù chân, báng bụng
- ☒ b. **Báng bụng, lách to**
- ☐ c. Báng bụng, vàng da
- ☐ d. Vàng da, báng bụng, phù chân

A. Triệu chứng lâm sàng

1. Triệu chứng liên quan đến sự suy giảm nhiều mặt chức năng tế bào gan:
 - Tổng trạng suy giảm: mau mệt, mờ cơ, giảm khả năng tập trung, giảm khả năng lao động
 - Rối loạn giấc ngủ
 - Rối loạn tiêu hóa: ăn kém, chậm tiêu nhất là thức ăn có nhiều mỡ
 - Rối loạn đông máu: chảy máu mũi, nướu răng, chảy máu ống tiêu hóa, xuất huyết dưới da dạng chấm và mảng, xuất huyết não và nội tạng
 - Nam giới: giảm khả năng sinh dục, vô sinh, liệt dương, vú to; phụ nữ: không rụng trứng, rối loạn kinh nguyệt
 - Lông tóc móng: lông thưa, tóc khô dễ gãy, dấu hiệu móng Terry, Muehrcke
 - Vàng da, vàng mắt
 - Hồng ban thường có ở gò má và mô lòng bàn tay (lòng bàn tay son)
 - Sao mạch ở mặt, ngực, cổ và lưng trên
- Báng bụng
- Phù chi dưới
2. Triệu chứng do tăng áp lực tĩnh mạch cửa:
 - Báng bụng
 - Lách to
 - Tuần hoàn bàng hệ kiểu cửa chủ
 - Dẫn tĩnh mạch thực quản, tâm phình vị có thể vỡ, gây xuất huyết tiêu hóa trên
 - Dẫn tĩnh mạch trực tràng gây trĩ, có thể vỡ gây xuất huyết tiêu hóa dưới
 - Các triệu chứng của cường lách (thiếu máu, xuất huyết do giảm tiểu cầu...)

Question 2

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Bệnh nhân nam, 42 tuổi, nhập viện vì **đau bụng**. Bệnh nhân được chẩn đoán bị xơ gan do rượu cách đây 5 năm. Cách nhập viện 2 ngày, bệnh nhân phát hiện bụng to dần kèm đau âm ỉ quanh rốn, sau đó lan khắp bụng kèm sốt lạnh run 39°C, tiêu phân vàng lỏng 3 lần/ngày. Bệnh nhân tự mua thuốc lợi tiểu và giảm đau uống nhưng không giảm. Khám bệnh: **bảng bụng độ 3**, bụng mềm, **đau khắp bụng**. **Biến chứng** nào được nghĩ đến nhiều nhất ở bệnh nhân này ?:

Select one:

- ☒ a. **Viêm phúc mạc nhiễm khuẩn nguyên phát**
- ☐ b. Tiêu chảy cấp do nhiễm trùng
- ☐ c. Nhồi máu mạc treo biến chứng hoại tử ruột
- ☐ d. Bảng bụng kháng trị với thuốc lợi tiểu

Question 3

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Bệnh nhân nam, 45 tuổi, nhập viện vì vàng da. Bệnh nhân được chẩn đoán bị xơ gan. Bệnh nhân uống khoảng **2 xi rượu đế/ ngày trong 20 năm**, đã ngưng cách đây 1 năm, không tiền sử bệnh lý nội-ngoại khoa, không dùng thuốc gì trước đó. Kết quả xét nghiệm: ALT: 42 U/L; AST: 106 U/L; bilirubin toàn phần: 3,6 mg/dl; bilirubin trực tiếp: 2,4 mg/dl; **HBsAg: âm tính; Anti-HCV: âm tính**. Siêu âm bụng: xơ gan, bảng bụng lượng ít. Ở bệnh nhân này, **nguyên nhân gây xơ gan** được nghĩ đến nhiều nhất là gì ?:

Select one:

- ☐ a. Xơ gan ứ mật nguyên phát
- ☐ b. Xơ gan ứ mật thứ phát
- ☒ c. **Xơ gan do rượu**
- ☐ d. Xơ gan do viêm gan virus mạn

Question 4

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Bệnh nhân nam, 50 tuổi, nhập viện vì **vàng da**. Một tháng trước, bệnh nhân bị vàng da vàng mắt ngày càng tăng dần, nước tiểu sậm màu. Khám bệnh: bệnh nhân tỉnh, niêm hồng, kết mạc mắt vàng, **bầm máu dưới da**, nhiều **sao mạch** ở ngực và lưng, **vú to** 2 bên, bụng mềm, **báng bụng** toàn thể độ 2, tuần hoàn bàng hệ cửa-chủ vùng trên rõ. Ở bệnh nhân này, **hội chứng suy tế bào gan** được xác lập dựa vào các triệu chứng nào ?:

Select one:

- ☐ a. Vàng da, sao mạch, bầm máu dưới da, báng bụng
- ☒ b. Vàng da, sao mạch, bầm máu dưới da, báng bụng, vú to
- ☐ c. Vàng da, bầm máu dưới da, vú to, tuần hoàn bàng hệ cửa-chủ
- ☐ d. Tất cả các triệu chứng trên



E-learning
ĐẠI HỌC Y DƯỢC
HÀ NỘI



NỘI KHOA Y4 (INTERNAL MEDICINE Y4)

Dashboard ► My courses ► NOI4 ► TIÊU HÓA ►
Pretest - Tiếp cận chẩn đoán xơ gan và biến chứng - Đợt 2

Question 1

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh nhân bị xơ gan, được chẩn đoán bệnh **não gan độ III**. Triệu chứng lâm sàng nào phù hợp nhất với phân độ bệnh não gan ở bệnh nhân này ?

Select one:

- ☐ a. Lú lẫn nặng (I, II)
- ☐ b. Ngủ gà
- ☐ c. Run vẩy (I, II)
- ☐ d. Hôn mê (IV)

I	Thay đổi CK giấc ngủ	Hồi lú lẫn	Đề bị kích thích	Run vẩy
II	Ngủ lịm	Mất định hướng	Thái độ bất thường	
III	Lú lẫn	Lú lẫn nặng	Hung hăng	
IV	Hôn mê			

• Độ nặng

I: thay đổi chu kỳ ngủ, hồi lú lẫn, dễ bị kích thích, run vẩy

II: ngủ lịm, mất định hướng, thái độ bất thường, run vẩy

III: lơ mơ, lú lẫn nặng, hung hăng

IV: hôn mê

Question 2

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh nhân mới được chẩn đoán bị xơ gan. Đánh giá giai đoạn xơ gan còn bù hay mất bù dựa vào yếu tố nào ?

Select one:

- ☐ a. Điểm số Child-Pugh
- ☐ b. Triệu chứng lâm sàng có bụng bụng và xuất hiện các biến chứng
- ☐ c. Phân độ xơ hóa gan theo Fibroscan
- ☐ d. Phân độ theo METAVIR

Lấn bù		Mất bù			
1	2	3	4	5	6
Kết quả TAP TAP là K ^o K ^o lấn bù	Giảm TAP	XMT do TAP	ĐH nội đầu tiên K ^o Lú lẫn	ĐH nội bù 2	Bất ổn mạch; - Nổi gan - Vàng da - Nổi u - Bụng không - Bụng không - Bụng không +

Question 3

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh nhân nam, 50 tuổi, có các triệu chứng: da và kết mạc mắt vàng, sao mạch, phù chân, lòng bàn tay son, báng bụng, lách to. Phương pháp cận lâm sàng nào phù hợp nhất để đánh giá giai đoạn xơ hóa gan ở bệnh nhân này ?:

Select one:

- ☐ a. Chụp X quang cắt lớp điện toán vùng bụng có cản quang
- ☒ b. Đo độ đàn hồi gan bằng Fibroscan
- ☐ c. Chụp cộng hưởng từ vùng bụng có chất tương phản từ
- ☐ d. Sinh thiết gan

Question 4

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh nhân nam, 53 tuổi, có các triệu chứng: da và kết mạc mắt vàng, báng bụng, sao mạch, phù chân, lòng bàn tay son, gan to, lách to, tuần hoàn bàng hệ cửa-chủ vùng bụng, nội soi dạ dày có dẫn tĩnh mạch tâm vị, nội soi trực tràng có bị trĩ. Triệu chứng lâm sàng nào của bệnh nhân là do tăng áp lực tĩnh mạch cửa ?:

Select one:

- ☐ a. Dẫn tĩnh mạch tâm vị, sao mạch
- ☐ b. Vàng da, báng bụng
- ☐ c. Gan to, lách to
- ☒ d. Dẫn tĩnh mạch tâm vị, lách to, tuần hoàn bàng hệ cửa-chủ



Flourish
ĐẠI HỌC Y DƯỢC
THÀNH PHỐ HÀ NỘI



Y16 - Đợt 3

NỘI KHOA Y4 (INTERNAL MEDICINE Y4)

Dashboard ► My courses ► NOI4 ► TIÊU HÓA ►
Pretest - Tiếp cận chẩn đoán xơ gan và biến chứng - Đợt 3

Question 1

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh nhân nam, 53 tuổi, có các triệu chứng: sao mạch, phù chân, lòng bàn tay son, **báng bụng**, gan to, lách to, tuần hoàn bàng hệ cửa-chủ vùng bụng, nội soi dạ dày có dẫn tĩnh mạch tâm vị⁽²⁾, nội soi trực tràng có trĩ. Bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù. Triệu chứng nào giúp chẩn đoán bệnh nhân ở **giai đoạn mất bù**?:

Select one:

3. Chẩn đoán giai đoạn

- Xơ gan còn bù: triệu chứng lâm sàng còn kín đáo
- Xơ gan mất bù: khi xuất hiện triệu chứng hoặc biến chứng: xuất huyết tiêu hóa, báng bụng, vàng da, nhiễm trùng, bệnh não gan, hội chứng gan thận

- ☐ a. Sao mạch
- ☐ b. Tuần hoàn bàng hệ cửa-chủ
- ☒ c. Báng bụng
- ☐ d. Dẫn tĩnh mạch tâm vị

Lớn bù			Mất bù		
1	2	3	4	5	6
K' gan to TAC K' to lớn sưng	Gan to	XHH do TAC	DH mất bù đổi trên k' là XHH	DH mất bù thứ 2	Gạt mất bù muốn: - Não gan - Vàng da - NKhôn - Báng bụng không trị - Rối loạn huyết cơ quan ≠

Question 2

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh nhân nam, 59 tuổi, có các triệu chứng: da và kết mạc mắt vàng, sao mạch, phù chân, tuần hoàn bàng hệ cửa-chủ vùng bụng, báng bụng, gan to, lách to, nội soi dạ dày có dẫn tĩnh mạch tâm vị. Triệu chứng lâm sàng nào của bệnh nhân được nghĩ nhiều là do suy tế bào gan ?:

Select one:

- ☐ a. Gan to, lách to
- ☒ b. Vàng da, phù chân, báng bụng, sao mạch
- ☐ c. Dẫn tĩnh mạch tâm vị, sao mạch
- ☐ d. Lách to, tuần hoàn bàng hệ cửa-chủ

Question 3

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh nhân nữ, bị xơ gan, nhập viện vì người nhà phát hiện nằm ngủ nhiều, khi nói chuyện có nhầm lẫn về thời gian trong ngày. Sau khi làm một số xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán Bệnh não gan. Bệnh não gan của bệnh nhân này thuộc tít nào?

Select one:

- ☐ a. D
- ☒ b. C
- ☐ c. B
- ☐ d. A

B

- Type A: BNG do suy gan cấp
- Type B: BNG do thông nối cửa chủ
- Type C: BNG do xơ gan

Question 4

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh nhân nữ, đang điều trị ngoại trú bệnh xơ gan báng bụng. Vài ngày gần đây, bệnh nhân có cảm giác ớn lạnh, đau bụng âm ỉ. Kết quả xét nghiệm nào sau đây phù hợp nhất với tình trạng bệnh hiện nay của bệnh nhân?

Select one:

- ☐ a. Số lượng Bạch cầu máu 9.000 G/L
- ☒ b. Bạch cầu đa nhân trung tính trong dịch báng 280/mm³
- ☐ c. Cấy dịch màng bụng dương tính với nhiều loại vi khuẩn
- ☐ d. Số lượng tế bào trong dịch báng 350/mm³

Viêm phúc mạc nhiễm khuẩn nguyên phát

Là tình trạng nhiễm khuẩn dịch báng mà không có bất kỳ ổ nhiễm trùng cần xử lý ngoại khoa trong ổ bụng

• Triệu chứng

- có thể không có triệu chứng

- triệu chứng viêm phúc mạc: đau bụng, chướng bụng, nôn ói, tiêu chảy, liệt ruột
- phân cứng viêm phúc mạc: sốt hay hạ thân nhiệt, lạnh run, thay đổi số lượng bạch cầu

- triệu chứng do biến chứng: bệnh não gan, chức năng gan xấu hơn, suy thận, XHTH, sốc

• Tiêu chuẩn chẩn đoán

Chẩn đoán	Bạch cầu đa nhân trung tính	Cấy dịch báng
Viêm phúc mạc (+)	> 250/mm ³	(+)
Viêm phúc mạc (-)	> 250/mm ³	(-)
Đau phúc mạc	< 250/mm ³	(+)



Elearning
HÀNG TRƯỜNG PHARMACEUTICAL
ĐẠI HỌC Y DƯỢC
HÀNG TRƯỜNG PHARMACEUTICAL



NỘI KHOA Y4 (INTERNAL MEDICINE Y4)

Dashboard ► My courses ► NOI4 ► TIÊU HÓA ►

Pretest - Tiếp cận chẩn đoán xơ gan và biến chứng - Đợt 4

Question 1

Answer saved

Marked out of

1.00

Bệnh nhân nữ, đang điều trị ngoại trú bệnh xơ gan. Hôm nay, người nhà phát hiện bệnh nhân **ngủ nhiều**, **khi nói chuyện bị nhầm lẫn thời gian trong ngày**. Sau khi làm một số xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán Bệnh não gan. Vậy, bệnh nhân này bị **bệnh não gan ở giai đoạn nào** ?:

→ Một định hướng thời gian?

- ☐ a. I
 - Độ nặng
 - I: thay đổi chu kỳ ngủ, hơi lú lẫn, dễ bị kích thích, rung vẩy
- ☒ b. II
 - II: ngủ lịm, mất định hướng, thái độ bất thường, rung vẩy
- ☐ c. III
 - III: lơ mơ, lú lẫn nặng, hung hăng
- ☐ d. IV
 - IV: hôn mê

Question 2

Answer saved

Marked out of

1.00

Bệnh nhân nữ, đang điều trị ngoại trú vì xơ gan. **Xét nghiệm nào không cần thiết khi theo dõi định kỳ** ở bệnh nhân này ?:

- ☐ a. AFP, ALT, AST, Albumin, Bilirubin, TQ
- ☐ b. Chụp X quang cắt lớp điện toán vùng bụng ?
- ☐ c. Nội soi dạ dày
- ☒ d. Sinh thiết gan

Chắc CT coi được xơ hoá với ung thư

Question 3

Answer saved

Marked out of

1.00

Bệnh nhân xơ gan bị biến chứng viêm phúc mạc nhiễm khuẩn nguyên phát vừa được xuất viện. Xét nghiệm nào cần thực hiện trong quá trình theo dõi ngoại trú ở bệnh nhân này ?:

- ☐ a. Xét nghiệm transaminase mỗi tháng
- ☒ b. Siêu âm bụng mỗi 6 tháng
- ☐ c. Xét nghiệm dịch báng mỗi 3 tháng *AFP, Siêu âm mỗi 6m.*
- ☐ d. Nội soi thực quản - dạ dày mỗi 3 tháng

Question 4

Answer saved

Marked out of

1.00

Bệnh nhân xơ gan có kết quả thăm khám và xét nghiệm như sau: ^{2đ}ngủ ^{2đ}gà, ^{2đ}bảng bụng nhẹ, ^{2đ}bilirubin toàn phần: 2,8 mg/dl; thời gian ^{2đ}Prothrombin: 16 giây; ^{2đ}albumin máu: 2,9 g/L. ^{2đ}Điểm số theo phân loại Child-Pugh ở bệnh nhân này là bao nhiêu ?:

- ☐ a. 7
- ☐ b. 8
- ☐ c. 9
- ☒ d. 10

Não gan { ngủ ngày thức đêm → đ. I
ngủ gà → đ. II



Hanoi
University of Pharmacy
ĐẠI HỌC DƯỢC
HÀ NỘI



NỘI KHOA Y4 (INTERNAL MEDICINE Y4)

Dashboard ► My courses ► NOI4 ► TIÊU HÓA ►
Pretest - Tiếp cận chẩn đoán xơ gan và biến chứng - Đợt 5

Question 1

Answer saved

Marked out of
1.00

Bệnh nhân nam, 52 tuổi, được chẩn đoán bị **xơ gan do viêm gan virus B** mạn cách đây 5 năm. Bệnh nhân đi **tái khám và uống thuốc đều đặn**. Để **tầm soát biến chứng ung thư gan**, cần thực hiện định kỳ các xét nghiệm nào sau đây ?:

- ☒ a. Siêu âm bụng và AFP mỗi 6 tháng
- ☐ b. Chụp X quang cắt lớp điện toán vùng bụng mỗi 6 tháng
- ☐ c. Siêu âm bụng và AFP mỗi tháng
- ☐ d. Siêu âm bụng và AFP mỗi 3 tháng

Question 2

Answer saved

Marked out of

1.00

Bệnh nhân nam, 55 tuổi, nhập viện vì lơ mơ. Bệnh nhân được chẩn đoán bị xơ gan do viêm gan virus C mạn cách đây 5 năm. Khám bệnh: bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc chậm. Kết quả xét nghiệm: bilirubin toàn phần: 3,8 mg/dl; albumin máu: 2,9 mg/dl; INR: 2,3. Siêu âm bụng: xơ gan, bàng bụng lượng ít. Điểm số phân độ Child-Pugh ở bệnh nhân này là bao nhiêu?

- ☐ a. 13
- ☐ b. 11
- ☒ c. 12
- ☐ d. 14

Question 3

Answer saved

Marked out of

1.00

Bệnh nhân nam, 55 tuổi, nhập viện vì lơ mơ. Bệnh nhân được chẩn đoán bị xơ gan cách đây 5 năm. Khám bệnh: bệnh nhân mở mắt tự nhiên, không tiếp xúc, kích thích đau đáp ứng không chính xác, thỉnh thoảng la hét, nói lảm nhảm, dấu run vẩy dương tính. Bệnh nhân được chẩn đoán bị bệnh não gan ở giai đoạn nào ?:

- ☐ a. Độ III
- ☐ b. Độ IV
- ☐ c. Độ I
- ☒ d. Độ II

- Độ nặng

I: thay đổi chu kỳ ngủ, hơi lú lẫn, dễ bị kích thích, rung vẩy

II: ngủ lịm, mất định hướng, thái độ bất thường, rung vẩy

III: lơ mơ, lú lẫn nặng, hung hăng

IV: hôn mê

Question 4

Answer saved

Marked out of

1.00

Bệnh nhân nam, 55 tuổi, nhập viện vì lơ mơ. Bệnh nhân được chẩn đoán bị xơ gan cách đây 5 năm. Cách nhập viện 1 tuần, bệnh nhân mất ngủ, sau đó nói lảm nhảm rồi lơ mơ dần. Khám lúc nhập viện: bệnh nhân mê sâu, kích thích đau không đáp ứng. Bệnh nhân được chẩn đoán bị bệnh não gan và được làm xét nghiệm NH₃ máu. Giá trị của xét nghiệm này trong chẩn đoán bệnh não gan như thế nào ?:

- ☒ a. Độ nhạy và độ đặc hiệu thấp
- ☐ b. Độ nhạy thấp và độ đặc hiệu cao
- ☐ c. Độ nhạy và độ đặc hiệu cao
- ☐ d. Độ nhạy cao và độ đặc hiệu thấp

* Triệu chứng:

Biểu hiện đa dạng:

Thay đổi tâm - thần kinh từ kín đáo, nhẹ → hôn mê

Run vẩy

Hơi thở mùi gan

EEG: sóng ba pha, chậm, biên độ cao

Nồng độ NH₃ /máu: không nhạy và không đặc hiệu**Question 2**

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Bệnh nhân mới được chẩn đoán bị xơ gan. Đánh giá giai đoạn xơ gan còn bù hay mất bù dựa vào yếu tố nào ?:

- ☐ a. Phân độ theo METAVIR
- ☒ b. Triệu chứng lâm sàng có bàng bụng và xuất hiện các biến chứng
- ☐ c. Điểm số Child-Pugh
- ☐ d. Phân độ xơ hóa gan theo Fibroscan

Y17 - đợt 1

Question 3

Not yet answered

Marked out of

1.00

Flag question

Bệnh nhân nữ, 50 tuổi, được chẩn đoán bị xơ gan. Bệnh nhân không uống rượu, không tiền sử bệnh lý nội-ngoại khoa, không dùng thuốc gì trước đó. Kết quả xét nghiệm: ALT: 82 U/L; AST: 76 U/L; bilirubin toàn phần: 2,8 mg/dl; bilirubin trực tiếp: 1,8 mg/dl; HBsAg (+); HBeAg (-); AntiHCV (-). Siêu âm bụng: xơ gan lách to. Ở bệnh nhân này, nguyên nhân gây xơ gan được nghĩ đến nhiều nhất là gì ?:

- ☐ a. Xơ gan ứ mật nguyên phát
- ☐ b. Viêm gan thoái hóa mỡ không do rượu
- ☒ c. Viêm gan virus B mạn
- ☐ d. Viêm gan virus C mạn

Y17 - đợt 2

Question 4

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh nhân nữ, 60 tuổi, nhập viện vì tiểu ít. Bệnh nhân được chẩn đoán bị xơ gan do viêm gan virus C mạn cách đây 10 năm. Bệnh nhân đi tái khám và uống thuốc đều đặn. Cách nhập viện 2 ngày, bệnh nhân tiểu ít hơn so với bình thường (khoảng 400 ml/ 24 giờ). Kết quả xét nghiệm: BUN: 30 mg/dl; creatinin: 2,1 mg/dl; albumin máu: 2,5 mg/dl. Siêu âm bụng: xơ gan, bàng quang lượng trung bình. Bệnh nhân được chẩn đoán: theo dõi hội chứng gan-thận. Xét nghiệm nào cần làm tiếp theo để xác định chẩn đoán hội chứng gan thận?

- ☐ a. Công thức máu
- ☐ b. Tổng phân tích nước tiểu
- ☐ c. X quang cắt lớp điện toán vùng bụng không cản quang
- ☐ d. Bilirubin toàn phần, trực tiếp, gián tiếp

Hội chứng gan thận – Hepatorenal Syndrome (HRS)

HRS: là tình trạng suy thận không có tổn thương cấu trúc thận trên bệnh nhân Xơ gan

HRS Type 1: HRS-AKI

HRS Type 2: non-AKI-HRS hay NAKI

(AKI: Acute Kidney Injury – Tổn thương thận cấp)

• Tiêu chuẩn chẩn đoán HRS:

- xơ gan kèm bàng quang

- có tổn thương thận cấp theo tiêu chuẩn ICA

- không đáp ứng sau 2 ngày liên tục ngừng thuốc lợi tiểu và tăng thể tích huyết tương bằng truyền albumin 1 g/kg cân nặng

- không sốt

- không sử dụng các thuốc độc thận (NSAID, aminoglycoside, thuốc cản quang...)

- không có dấu hiệu của tổn thương cấu trúc thận như không có protein niệu (>500 mg/ngày), không tiểu máu vi thể (>50 HC/quang trường phóng đại), siêu âm thận bình thường

Y17 - đợt 4

Question 3

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh nhân nữ, 52 tuổi, nhập viện vì đau bụng. Bệnh nhân được chẩn đoán bị xơ gan cách đây 7 năm. Cách nhập viện 4 ngày, bệnh nhân phát hiện bụng to dần kèm đau âm ỉ quanh rốn, sốt lạnh run không rõ nhiệt độ. Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi viêm phúc mạc nhiễm khuẩn nguyên phát và được chọc dịch màng bụng. Xét nghiệm nào giúp xác định chẩn đoán viêm phúc mạc nhiễm khuẩn nguyên phát ?:

- ☐ a. Bạch cầu đa nhân trung tính dịch màng bụng > 250/ mm³
- ☐ b. Tỷ lệ albumin huyết tương- albumin dịch màng bụng > 1,1 g/dl
- ☐ c. Đạm trong dịch màng bụng < 1 g/dl
- ☐ d. Cấy dịch màng bụng dương tính với nhiều loại vi trùng

Question 3

Complete

Marked out of
1.00

Y17 - đợt 5

Bệnh nhân nữ, 60 tuổi, nhập viện vì bụng to. Bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm gan virus B cách đây 10 năm, được điều trị thuốc kháng virus 5 năm, sau đó tự ngưng điều trị. Khám bệnh: Bệnh nhân tỉnh, niêm hồng nhạt, kết mạc mắt vàng, nhiều sao mạch ở ngực, cánh tay; phù mềm, đối xứng ở 2 cẳng chân; bàng quang độ 2, lách to, tuần hoàn bàng hệ cửa-chủ trên rốn. Ở bệnh nhân này, chẩn đoán được nghĩ nhiều nhất là gì?

- ☐ a. Đợt bùng phát viêm gan virus B mạn
- ☐ b. Viêm gan do thuốc trên nền xơ gan do viêm gan virus B mạn
- ☒ c. Xơ gan mất bù do viêm gan virus B mạn
- ☐ d. Xơ gan còn bù do viêm gan virus B mạn