

CHẨN THƯƠNG CHỈNH HÌNH (ORTHOPEDICS)

Dashboard ► My courses ► CTCH ► LÝ THUYẾT ►

Pretest bài 5: Biến chứng gãy xương, trật khớp

Question 1

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Trong tổn thương thần kinh loại Axonotemesis, loại tổn thương nào sao đây là đúng?

Select one:

- a. Mất liên tục về dẫn truyền nhưng không có tổn thương giải phẫu
- b. Tổn thương vỏ bao thần kinh
- c. Tổn thương tế bào Schwann
- d. Tổn thương sợi trục

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Theo phân loại của Seddon, thần kinh bị đứt hoàn toàn trong loại tổn thương nào?

Select one:

- a. Neuropathy
- b. Neuropraxia
- c. Neurotmesis
- d. Axonotmesis

Question 3

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Thứ tự đúng trong xử trí ban đầu bệnh nhân đa thương có chấn thương đầu là?

Select one:

- a. Đường thở, tuần hoàn, hô hấp, xử trí chấn thương sọ não
- b. Đường thở, hô hấp, tuần hoàn, xử trí chấn thương sọ não
- o. Xử trí chấn thương sọ não, đường thở, hô hấp, tuần hoàn
- od. Tuần hoàn, đường thở, hô hấp, xử trí chấn thương sọ não

Question 4

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Điều nào sau đây là đúng khi nói về hội chứng chèn ép khoang cấp tính?

Select one:

- a. Đau là dấu hiệu có độ nhạy cao nhất
- o b. Chi lạnh là dấu hiệu sớm của chèn ép khoang
- c. Xảy ra trong vòng 3 giờ đầu sau chấn thương
- d. Chi bị thương sưng và nổi bóng nước là dấu hiệu chẩn đoán xác
 định

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Khi nghi ngờ tổn thương mạch máu, chụp CT mạch máu có chỉ định trong trường hợp nào sau đây?

Select one:

- a. Gãy nhiều xương trên 1 chi
- b. Có dấu thiếu máu chi rõ
- c. Gãy thân xương dài phức tạp
- d. Trong tất cả các trường hợp

Question **6**

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Trong chấn thương gãy nhiều xương, điều nào sau đây là xử trí quan trọng nhất?

Select one:

- a. Truyền dịch điện giải
- b. Truyền máu
- oc. Duy trì đường thở

Question 7

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Biểu hiện lâm sàng trong giai đoạn sớm của hội chứng rối loạn dinh dưỡng là

Select one:

- a. Tóc cứng, xoắn, không đều trong khi móng lõm, có sọc, dễ gãy và đổi màu nâu.
- b. Tăng cảm với nhiệt và da ẩm mồ hôi.
- o. Da mỏng, mất nếp gấp vùng khớp và mất lớp mỡ dưới da.
- d. Cứng khớp.

giai đoạn muộn: RL vận mạch, giảm phù nề, Teo mòn xuất hiện!

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Tam chứng kinh điển trong hội chứng tắc mạch máu do mỡ gồm các triệu chứng nào?

Select one:

- a. Thiểu niệu, lơ mơ, xuất huyết võng mạc
- b. Suy hô hấp, bất thường thần kinh, đốm xuất huyết
- oc. Đau ngực, ban vàng, mất mạch
- d. Sốt, tăng nhịp tim, vàng da

Question 9

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Triệu chứng nào là quan trọng nhất để chẩn đoán sớm chèn ép khoang cấp?

Select one:

- a. Sưng nề
- b. Mất cảm giác
- o. Không bắt được mạch
- d. Đau bất thường

Question 10

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Bệnh nhân nhập viện vì gãy xương đùi sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng, điều đầu tiên cần phải làm là gì?

Select one:

- a. Khám lâm sàng tỉ mỉ
- b. Chụp X quang
- c. Nep bất động
- d. Bảo vệ đường thở

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Trong các dấu hiệu sau, dấu hiệu nào là chỉ điểm tổn thương mạch máu cần

4 hard sign: xử trí khẩn cấp?

+6p

+VT chảy máu nhiều

+chảy máu vọt theo mạch đập

+hematoma lớn, có âm thôi/rung miêu

b. Mach yếu

Select one:

c. Hematoma lớn có rung miêu

d. Vết thương trên đường đi động mạch

a. Tổn thương thần kinh lớn của chi

5 dấu soft sign:

+BS:có chảy máu nhiều:

+CRT>2s

+Tổn thương thần kinh đi kèm

+mạch yếu hơn đối bên

+hematoma nhỏ ko âm thổi/rung miêu

Question 12

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Dấu hiệu tổn thương thần kinh quay sau gãy xương cánh tay là gì?

Select one:

- a. Mất sấp cẳng tay
- b. Bàn tay rũ
- c. Cổ tay mất gấp
- d. Mất cảm giác vùng lòng bàn tay

Question 13

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Theo tiêu chuẩn chẩn đoán lâm sàng Veldman, có bao nhiêu triệu chứng thì giúp chẩn đoán hội chứng rối loạn dinh dưỡng

Select one:

a. ≥ 4

b. ≥ 3

c. ≥ 5

d. ≥ 2

5 tiêu chuẩn của Veldmna:

+đau lan tỏa

+phù nề

+màu sắc da thay đổi 2 bên

+nhiệt độ 2 bên thay đổi

+hạn chế vận động CHỦ ĐỘNG

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Xử trí ban đầu nào sau đây hữu ích nhất giúp cải thiện bệnh cảnh chèn ép khoang cấp?

Select one:

- a. Thở oxy
- b. Chườm lạnh
- o. Điều trị sốc
- d. Kê chi cao

Question 15

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Triệu chứng nào sau đây không thuộc nhóm triệu chứng chẩn đoán hội chứng rối loạn dinh dưỡng theo Veldman

Select one:

a. Giới hạn vận động thụ động.

Giới hạn vận động chủ động mới đúng!

- b. Đau lan tỏa không giải thích được
- o. Phù nề lan tỏa
- od. Khác biệt màu sắc da so với bên lành

