# NỘI KHOA Y4 (INTERNAL MEDICINE Y4)

Dashboard ► My courses ► NOI4 ► TIM MACH ► PRETEST ĐỢT 4 SUY TIM

### Question 1

Not yet answered

Marked out of 1.00

Bệnh nhân nam, 30 tuổi, nhập viện vì khó thở. Bệnh nhân không có tiền căn bệnh lý tim mạch. Hút thuốc lá thỉnh thoảng vài điếu, uống rượu 3-4 lon bia mỗi khi có đám tiệc. 1 năm nay bệnh nhân bắt đầu khó thở khi đi chạy bộ buổi sáng và phải chuyển sang đi bộ nhưng đi khoảng 500 mét là khó thở. Khám thực thể ghi nhận huyết áp 100/70 mmHg, mạch đều 100 lần/phút, nhiệt độ 37 độ C, nhịp thở 22 lần/phút. Mỏm tim ở khoang liên sườn VI, lệch ra đường nách trước. Có dấu Harzer và dấu nảy trước ngực. Tim đều, tần số 100 lần/phút, có T3 ở mỏm tim. Phổi không rale. Thông tin nào trên siêu âm tim KHÔNG phù hợp với tình huống trên?

- a. Hở van hai lá mức độ nhẹ
- b. Phân suất tổng máu thất trái 32%
- o. Giãn lớn 4 buồng tim
- d. Thông liên nhĩ

## Question 2

Not yet answered

Marked out of 1.00

Bệnh nhân nam, 30 tuổi, nhập viện vì khó thở. Bệnh nhân không có tiền căn bệnh lý tim mạch. Hút thuốc lá thỉnh thoảng vài điếu, uống rượu 3-4 lon bia mỗi khi có đám tiệc. 1 năm nay bệnh nhân bắt đầu khó thở khi đi chạy bộ buổi sáng và phải chuyển sang đi bộ nhưng đi khoảng 500 mét là khó thở. Khám thực thể ghi nhận huyết áp 100/70 mmHg, mạch đều 100 lần/phút, nhiệt độ 37 độ C, nhịp thở 22 lần/phút. Mỏm tim ở khoang liên sườn VI, lệch ra đường nách trước. Có dấu Harzer và dấu nảy trước ngực. Tim đều, tần số 100 lần/phút, có T3 ở mỏm tim. Phổi không rale. Phân độ NYHA trên bệnh nhân này là gì?

- a. NYHA III
- O b. NYHA I
- O c. NYHA IV
- d. NYHA II

# Question 3

Not yet answered

Marked out of 1.00

Bệnh nhân nam, 30 tuổi, nhập viện vì khó thở. Bệnh nhân không có tiền căn bệnh lý tim mạch. Hút thuốc lá thỉnh thoảng vài điểu, uống rượu 3-4 lon bia mỗi khi có đám tiệc. 1 năm nay bệnh nhân bắt đầu khó thở khi đi chạy bộ buổi sáng và phải chuyển sang đi bộ nhưng đi khoảng 500 mét là khó thở. Khám thực thể ghi nhận huyết áp 100/70 mmHg, mạch đều 100 lần/phút, nhiệt độ 37 độ C, nhịp thở 22 lần/phút. Mỏm tim ở khoang liên sườn VI, lệch ra đường nách trước. Có dấu Harzer và dấu nảy trước ngực. Tim đều, tần số 100 lần/phút, có T3 ở mỏm tim. Phổi không rale. Phân giai đoạn theo ACC/AHA trên bệnh nhân này là gì?

- a. Giai đoạn C
- b. Giai đoạn A
- c. Giai đoạn D
- d. Giai đoạn B

### Question 4

Not yet answered

1.00

Marked out of

Bệnh nhân nam, 30 tuổi, nhập viện vì khó thở. Bệnh nhân không có tiền căn bệnh lý tim mạch. Hút thuốc lá thỉnh thoảng vài điếu, uống rượu 3-4 lon bia mỗi khi có đám tiệc. 1 năm nay bệnh nhân bắt đầu khó thở khi đi chạy bộ buổi sáng và phải chuyển sang đi bộ nhưng đi khoảng 500 mét là khó thở. Khám thực thể ghi nhận huyết áp 100/70 mmHg, mạch đều 100 lần/phút, nhiệt độ 37 độ C, nhịp thở 22 lần/phút. Mỏm tim ở khoang liên sườn VI, lệch ra đường nách trước. Có dấu Harzer và dấu nảy trước ngực. Tim đều, tần số 100 lần/phút, có T3 ở mỏm tim. Phổi không rale. Nguyên nhân suy tim nghĩ nhiều nhất trên bệnh nhân này?

- a. Bệnh cơ tim giãn nở
- b. Tăng huyết áp
- c. Hở van động mạch chủ
- d. Nhồi máu cơ tim cũ

