

Yếu tố tiên lượng xấu trong ung thư vú, ngoại trừ :

- A. Tuổi trẻ
- B. Còn kinh nguyệt
- ☒ C. Thụ thể ER, PR dương tính ✓
- D. Biểu hiện quá mức thụ thể HER2
- E. Tất cả đều sai

3. Loại giải phẫu bệnh nào sau đây ~~không~~ xuất nguồn từ tế bào nang giáp?

- a. Carcinôm tuyến giáp dạng nhú
- b. Carcinôm tuyến giáp dạng nang
- ☒ c. Carcinôm tuyến giáp dạng tủy ✓
- d. Carcinôm tuyến giáp không biệt hóa
- b. Carcinôm tuyến giáp dạng nhú biến thể nang

8. Ung thư nào sau đây có thể phòng ngừa nguyên nhân, NGOẠI TRỪ

- A. Ung thư phổi
- ☒ B. Ung thư vú ✓
- C. Ung thư gan
- D. Ung thư cổ tử cung
- E. Tất cả đều đúng

9. Dấu hiệu nào sau đây cho thấy loại ung thư có thể tầm soát tốt

- A. Có nguyên nhân được xác định rõ
- B. Có giai đoạn tiền ung thư kéo dài
- C. Có thể điều trị hiệu quả các tổn thương tiền ung thư
- D. Câu B và C đúng ✓
- ☒ E. Tất cả đều đúng

E. Ung thư dạ dày và ung thư gan

11. Loại ung thư nào sau đây có thể phòng ngừa hiệu quả, tầm soát và phát hiện sớm hiệu quả

- A. Ung thư tuyến giáp
- B. Ung thư đại tràng
- C. Ung thư phổi
- D. Ung thư gan

☒ E. Ung thư cổ tử cung ✓

12. Yếu tố nguy cơ của ung thư buồng trứng

17. Loại giải phẫu bệnh thường gặp nhất trong ung thư cổ tử cung là

- A. Carcinôm tuyến
- ☒ B. Carcinôm tế bào gai ✓
- C. Carcinôm tế bào nhỏ
- D. Carcinôm tế bào chuyển tiếp
- E. Carcinôm tế bào sáng

19. Đặc điểm ung thư vú, chọn câu sai

- A. Bướu thường ở vị trí $\frac{1}{4}$ trên ngoài vú 1/4 trên trong??
 - B. Carcinôm tiểu thùy ít gặp hơn carcinôm ống tuyến vú ✓ so với câu 63 đề
 - C. Carcinôm tuyến vú có thể cho di căn hạch thượng đòn ✓ 20-07-2016 thì là E
 - D. Di căn hạch trung thất được xếp vào di căn xa
 - ☒ E. Phổi là cơ quan di căn xa thường gặp do nằm kế cận mô vú Xương thường gặp nhất
20. Biểu hiện nào sau đây cho biết sự hiện diện của ung thư vú giai đoạn IV:

- A. Thay đổi viêm trong tuyến vú
- B. Di căn hạch trên đòn cùng bên
- C. Bướu xâm lấn lan đến cơ ngực
- ☒ D. Bướu xâm nhiễm núm vú
- E. Tất cả đều sai

22. Các yếu tố làm tăng nguy cơ phát triển ung thư vú, ngoại trừ:
- A. Có kinh sớm hoặc mãn kinh muộn
 - B. Không sinh con
 - C. Tuổi > 30 lúc mang thai đầu tiên
 - ☒ D. Sảy thai ở 3 tháng đầu hay 3 tháng giữa thai kỳ ✓
 - E. Tiền căn xạ trị vùng ngực

23. Ung thư vú, chọn câu SAI

- A. Là ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ tính chung trên toàn thế giới.
- B. Thường gặp ở những nước công nghiệp phát triển hơn những nước đang phát triển
- ☒ C. Khó phát hiện sớm do không có triệu chứng lâm sàng
- D. Có liên quan đến yếu tố gia đình.
- E. Tình huống thường gặp nhất là sờ thấy một khối trong vú.

24. Một phụ nữ 59 tuổi đã mãn kinh 4 năm, đến bác sĩ khám vì tự sờ thấy một mảng trong vú trái khoảng 1 tháng nay, không triệu chứng khó chịu gì. Không tiền căn bệnh nội ngoại khoa. Khám: sờ thấy một khối 2 cm, tròn, giới hạn không rõ, 1/4 trên trong vú trái, ít di động trong mô vú và di động tốt so với thành ngực, không dính da. Hạch nách và trên đòn không sờ thấy. Siêu âm phát hiện bướu 2cm trên vú (T) nghi ác tính. Bước xử trí tiếp theo thích hợp trên bệnh nhân này?

- A. Chụp MRI vú 2 bên.
- B. Chụp nhũ ảnh 2 bên
- ☒ C. FNA bướu vú trái ✓✓
- D. Sinh thiết lõi kim bướu vú trái
- E. Tất cả đều sai

25. Mục đích của việc xét nghiệm ER, PR, HER-2/neu trong ung thư vú nhằm:

- A. Phân loại bướu dưới góc độ sinh học phân tử ✓
- B. Giúp chọn lựa phương pháp điều trị thích hợp ✓
- C. Giúp đánh giá tiên lượng bệnh ✓
- ☒ D. Tất cả các câu đều đúng
- E. Chỉ có A, C đúng

26. Phụ nữ 30 tuổi đến khám vì đau vú (T), triệu chứng đau nặng lên trước hành kinh và sau sạch kinh 1 tuần. Bệnh nhân không dùng thuốc, không bệnh lý gì khác. Khám lâm sàng phát hiện một mảng dày 3cm nhạy đau, ở 1/4 trên ngoài vú (T), sang thương giảm kích thước sau hành kinh. Cảm nghĩ chẩn đoán trường hợp này?

- A. Ung thư vú
- ☒ B. Thay đổi sợi bọc ✓✓
- C. Bướu sợi tuyến

D. Bướm điệp thê
E. Bướm nhú
27. Una th...

41. Carcinôm tuyến giáp dạng nhú, chọn câu đúng:

- A. Khàn tiếng là tình huống lâm sàng thường gặp nhất
- B. Là loại giải phẫu bệnh gặp hàng thứ 2 trong ung thư tuyến giáp.
- ☒ C. Rất nhiều trường hợp có tính đa ổ trên vị thể
- D. Tiên lượng bệnh rất xấu khi đã di căn hạch vùng
- E. Câu B và D đúng

42. Loại ung thư nào sau đây thường cho di căn não?

- A. Ung thư gan và ung thư đại tràng
- B. Ung thư đại tràng và ung thư tụy
- C. Ung thư tụy và ung thư phổi
- ☒ D. Ung thư phổi và ung thư vú
- E. Ung thư vú và ung thư gan

43. Bệnh nhân nữ, 35 tuổi khám sức khỏe định kỳ phát hiện một nhân giáp thùy trái; không có tiền căn xạ trị và gia đình không ai bị ung thư giáp. Siêu âm cổ phát hiện nhân giáp thùy trái 2cm, echo kém, vi vôi hóa và hạch cổ nhóm III (T) 0.8 cm, echo kém, mất rốn hạch. Xét nghiệm máu TSH, FT3, FT4 bình thường. Xét nghiệm cần làm tiếp:

- A. CT-scan vùng cổ có cản quang
- ☒ B. FNA nhân giáp và hạch cổ
- C. Xạ hình tuyến giáp
- D. Câu A và B đúng
- E. Câu A, B, C đúng

so với câu 5/12 của đề cuối kỳ elearning có cần MSCT trước mổ?

! EMERGENCY

44. Chẩn đoán lâm sàng: Carcinôm tuyến giáp dạng nhú di căn hạch cổ (T). Xếp giai đoạn bệnh trên bệnh nhân này?

- ☒ A. Giai đoạn I
- B. Giai đoạn II
- C. Giai đoạn III
- D. Giai đoạn IV
- E. Tất cả đều sai

45. Điều trị cho bệnh nhân trên:

- ☒ A. Cắt giáp toàn phần, nạo hạch cổ trái

VERIFIED

B. Một loại chọn khác

13. *Mol. Biol. Evol.* 1996

- C. 3 năm sau lần quan hệ tình dục đầu tiên, không trẻ hơn 21 tuổi.
D. 26 tuổi, bất kể tình trạng quan hệ tình dục
E. 26 tuổi, ở những đã có quan hệ tình dục

50. Cho biết độ nhạy của xét nghiệm Pap truyền thống trong phát hiện bất thường tế bào cổ tử cung là 60%. Xác suất có ít nhất 1 lần xét nghiệm Pap bất thường qua 3 lần liên tiếp làm xét nghiệm Pap ở một người có tế bào bất thường ở cổ tử cung là.

- A. 95,3%
B. 96,3%
C. 93,6%
D. 90,6%
E. 85,4%

$$1 - (0.4)^3$$

MANG MÁY TÍNH KHI ĐI THI

51. Xét nghiệm Pap có tế bào bất thường có nghĩa là:

- A. Cần làm thêm các xét nghiệm chẩn đoán sớm ung thư cổ tử cung
B. Bệnh nhân có thể có ung thư cổ tử cung
C. Bệnh nhân có thể chỉ có tổn thương tiền ung thư cổ tử cung
D. Câu A và B đúng

E. Tất cả các câu trên đều đúng

52. Nguyên nhân ung thư cổ tử cung

- A. Herpes-Simplex virus (HSV)
B. Human Papilloma virus (HPV)
C. Sinh đẻ nhiều
D. Lập gia đình sớm
E. Quan hệ tình dục với nhiều người

53. Tổn thương tiền ung thư cổ tử cung

- A. Xuất độ cao nhất là 40-45 tuổi
B. CIN 2 có nghĩa là các tế bào dị dạng chiếm 2/3 trên bề dày của lớp biểu mô nhưng chưa xâm lấn màng đáy
C. CIN 3 có nghĩa là các tế bào dị dạng chiếm toàn bộ bề dày của lớp biểu mô nhưng chưa xâm lấn màng đáy
D. Khả năng diễn tiến thành ung thư cổ tử cung xâm lấn đối với CIN3 là 80% sau 10 năm
E. Câu C,D đúng

54. Tình huống thường gặp nhất của ung thư cổ tử cung xâm lấn trên lâm sàng là:

- A. Không có triệu chứng và được phát hiện qua xét nghiệm tầm soát định kỳ
B. Xuất huyết âm đạo bất thường
C. Huyết trắng kéo dài
D. Đau nhức vùng hạ vị
E. Tiểu khó, tiểu buốt, tiểu máu

55. Xét nghiệm nào sau đây là quan trọng nhất trong chẩn đoán xác định ung thư cổ tử cung

- A. Siêu âm bụng chậu
B. Chụp CT scan bụng chậu
C. Soi cổ tử cung
D. Sinh thiết cổ tử cung bằng kèm bấm
E. Khoét chóp cổ tử cung

56. Bệnh nhân nam, 42 tuổi, được chẩn đoán carcinôm tuyến giáp không biệt hóa. Siêu âm có hạch cổ (P) 1 cm nghi ngờ di căn. Các xét nghiệm khác chưa phát hiện di căn xa. Xếp giai đoạn trên bệnh nhân này, chọn câu đúng:

- A. Cần xác định giải phẫu bệnh của hạch cổ mới xếp giai đoạn được
B. Cần biết thêm thông tin về kích thước bướu giáp
C. Cần biết thêm thông tin bướu có xâm lấn dây thần kinh quặt ngược hay chưa
D. ☒ Đã đủ dữ kiện xếp giai đoạn IV cho bệnh nhân ✓
E. Câu A và B đúng

58. Phụ nữ, 30 tuổi, đã sinh 2 đứa con. Cô đến khám bệnh vì muốn tầm soát ung thư.
Anh/ chị tư vấn cho cô thực hiện những xét nghiệm nào?

- A. Chụp nhũ ảnh
B. ☒ Làm PAP smear ✓
C. Siêu âm màu vùng cổ và bụng
D. Xét nghiệm máu CEA, CA15-3, CA125
E. Câu A, B và D đúng

66. Ung thư vú được xem là có di căn hạch vùng khi có sự hiện diện tế bào ác tính ở các nhóm hạch sau đây, NGOẠI TRỪ

- ⌘
- a. Hạch trên đòn
 - b. Hạch nách
 - c. Hạch vú trong
 - d. Hạch Rotter
 - ☒ e. Hạch trung thất ✓