

1. Xuất huyết tiêu hóa (full)

1. Giống đề kì 1
2. Giống đề kì 1
3. Giống đề kì 1

2. Viêm tụy cấp (5 câu – full)

4. Động học amylase
 - a. Bắt đầu tăng sau 1h và giảm về bình thường sau 3 – 5 ngày
 - b. ...
5. Giảm đau trong VTC dùng thuốc nào
 - a. Meperidine
 - b. Acetaminophen
 - c. Morphine
 - d. ...
6. Tiên lượng nặng CRP
 - a. 150 sau 48h
 - b. ...
7. Viêm tụy cấp thời gian truyền dịch tốt nhất trong bao lâu?
 - a. 12-24h
8. 2 – 3 ngày đầu tiên truyền đường bn?
 - a. 100 – 150
 - b. ...

3. Tăng huyết áp

9. 67t, PAD, tăng huyết áp, huyết áp mục tiêu?
 - a. 130-140/70-80
10. Cơ chế ho UCMC
 - a. Bradykinine
11. BN THA + gout đang dùng thuốc, bỏ thuốc nào ra
 - a. LT
 - b. ACEI
 - c. CCB
 - d. BB
12. BN đang dùng BB + thuốc ức chế hệ Renin??? Không nhớ

4. Suy tim

13. Suy tim NYHA III + CKD 3a đang dùng enalapril, biso, aldatone (liều???), M 86, gan mấp mé bờ sườn. để tối ưu hóa ĐT cần thay đổi ntn?
 - a. Nâng liều Biso

- b. Nâng liều Aldactone
 - c. Thêm LT
 - d. Thêm ivabradine
14. BN 7x tuổi, Suy tim sau NMCT + CKD 3b dùng thuốc nào được
- a. Nebivolol
 - b. Atenolol
 - c. Acebutolol
 - d. Labetalol

5. Bệnh vành mạn

15. BN 5x tuổi TC gđ có người thân chết vì BL tim mạch, BMI = 18 vừa phát hiện THA và BMVM và CKD. Mục tiêu trên BN này
- a. Giảm CN < 5 %
 - b. LDL < 100
 - c. HA < 140 – 130/ 70 - 80
 - d. HbA1C < 6%
16. ĐT gì
- a. Ator
 - b. ...
17. XN nào cần tầm soát hàng năm cho BN trên
- a. Glucose máu
 - b. Đạm niệu 24h
 - c. BUN/acid uric...
 - d. ...

6. Hội chứng vành cấp

18. ECG/NMCT bao nhiêu phút
- a. 10
 - b. 20
 - c. 30
 - d. ...
19. BN đau ngực lúc 7h sáng; vào viện lúc 20h; STEMI làm gì tốt nhất cho BN?
- a. TSH
 - b. CABG
 - c. PCI cứu vãn
 - d. PCI tiên phát
20. CĐ BC cơ học trong NMCT bằng
- a. Siêu âm tim
 - b. ECG...

7. RỐI LOẠN NHỊP – THĂM DÒ CN TIM MẠCH

21. Lâm sàng cái nào ko phải loạn nhịp hoàn toàn
- A. Rung nhĩ
 - B. Cuồng nhĩ

- C. Nhịp nhanh nhĩ đa ổ
- D. Rung nhĩ có block AV hoàn toàn

22. Những năm gần đây ECG 12 CĐ nghiên cứu về vấn đề gì?

- a. (RL) dẫn truyền AV
- b. Bất thường kênh ion trên màng TB
- c. Bất thường cấu trúc/TMCT/suy tim
- d. ...

23. Cơ chế gây RLN của thuốc CRLN nhóm 1 là gì

- a. Thay đổi mô cơ tim bt thành block dẫn truyền 1 chiều
- b. Thay đổi thời gian trơ có hiệu quả

24. 1 câu cơ chế của điều trị RLN thất hay trên thất gì đó quên rồi; đáp án hình như na ná câu 23

25. Tại sao nút xoang là nút chủ nhịp (giống đề TN)

- a. Phát xung nhanh nhất

8. Xơ gan

26. 1 câu tính child ra 13

27. VPM, truyền albumin để làm gì

- a. Phòng ngừa HCGT
- b. ĐT xơ gan
- c. Phòng ngừa BNG

9. Suy thận cấp

28. ĐT nào sau đây có hiệu quả nhất trong phòng ngừa CKD do thuốc cản quang

- a. Truyền NS trước và sau
- b. Uống NAC trước và sau
- c. LT trước và sau
- d. ...

29. AKI K 7.x. ĐT gì phòng ngừa rung thất

- a. Ca
- b. Ins + đường
- c. HCO₃
- d. Kayexalate

30. Bí tiểu + AKI cre 8.x, BUN 99 + CKD 3a. Phù toàn thân. ĐT nào đầu tiên thích hợp nhất

- a. Sonde tiểu
- b. CTNT
- c. Furosemide
- d. Truyền NS

10. HẸP 2 LÁ

31. Trong BTTMCB tiến triển có thể nghe được âm thổi nào

- a. Decrescendo thì tâm trương
- b. Crescendo – decrescendo thì tâm thu
- c. Decrescendo thì tâm trương + nhấn mạnh tiền tâm thu
- d. AT ở mỏm 2 thì lan nách

32. Ibuprofen (2 lá – giống đề FDA)

33. Chọn câu sai hẹp 2 lá:

- a. VNTM là biến chứng thường gặp của hẹp 2 lá
- b. THA là biến chứng thường gặp hẹp 2 lá
- c. Không còn chỉ định dùng KS dự phòng cho BN hẹp 2 lá khi có can thiệp nha khoa

34. Hẹp 2 lá một khi gắng sức, ưu tiên chọn gì (giống đề)

- a. BB
- b. CCB
- c. Digoxin

11. PHÙ PHỔI CẤP

35. BN phù phổi cấp, HA 70/40, chọn thuốc gì

- a. Dopamine
- b. Dobutamine

36. PPC hỏi liều NTG (gài chỗ có 10ug/kg/ph hay 10ug/ph. Đáp án là 10ug/ph ko có per kg)

37. PPC điều trị gì đầu tiên: Furosemide/...

38. PPC chọn câu sai:

- a. XQ mờ rốn phổi
- b. Có thể tăng men gan
- c. TMC nổi
- d. Áp lực đm phổi <18

12. HỒI SỨC NỘI KHOA – ĐIỀU TRỊ ĐIỆN

39. Vị trí đầu catheter tm trung tâm:

- a. TMC trên cách 1cm nhĩ P
- b. Tùy bn
- c. TM cảnh trong hoặc TM dưới đòn
- d. Trong nhĩ (P)

40. Câu nào về bóng đối xung k đúng

- a. Bóng rộng/lớn và ngắn đặt trong ĐMC
- b. Giúp tăng tưới máu ĐMV thì tâm trương và tăng cung lượng tim thì tâm thu
- c. Phình ra thì tâm trương và xẹp thì tâm thu
- d. CCĐ phình bóc tách

41. HT nào thường gặp trên BN nôn ói

- a. Toàn + tăng K
 - b. Toàn + hạ K
 - c. Kiểm + tăng K
 - d. Kiểm + hạ K
42. Sonde blakemore giống để TN (chọn chụp XQ sau đặt)
43. Đặt catheter TM cảnh trong sợ BC gì
- a. Sợ đâm trúng ĐM
 - b. ...
44. Đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn thường đặt đường nào?
- a. TM dưới đòn
 - b. TM cảnh trong
 - c. TM cảnh ngoài
 - d. TM nách
45. Máy tạo nhịp tạm thời tính mạch: chọn câu sai:
- a. đặt ở nhĩ P → thất phải mới đúng (đổi dựa trên đề xấp đồng bắc)

13. NGỘ ĐỘC THỨC ĂN

46. Khái niệm ngộ độc thức ăn bao gồm
- a. TA chứa vi khuẩn
 - b. TA chứa độc chất
 - c. ...
 - d. Tất cả đều đúng
47. Dựa trên tác nhân, chia ngộ độc thức ăn thành mấy nhóm theo tổ chức y tế
- A. 2 nhóm: nhiễm khuẩn và nhiễm độc
 - B. 3 nhóm: Vi sinh, độc chất và hóa chất bảo quản
 - C. 4 nhóm: tác nhân gây tiêu chảy, tác nhân gây nhiễm trùng xâm lấn, ký sinh trùng, hóa chất và độc chất
 - D. 5 nhóm: vi khuẩn, vi rút, kst, độc chất, hóa chất

14. SHH CẤP

48. Cơ chế nào sau đây vừa gây SHH giảm O₂ vừa tăng CO₂
- a. Giảm thông khí
 - b. ...
49. Tím + không SHH
- a. Đa HC
 - b. Thiếu máu
 - c. Suy tim P
 - d. TBS

50. BN thở qua mask ko túi dự trữ 7.5 L/ph, VO₂ dự trữ là 50ml, nhịp thở 24 lần/phút, hít vào: thở ra=1:1.5, VT=500ml, tính FiO₂
- A. 56%
- B. 52%

15. RL điện giải – toan kiềm

51. Cho case có KMĐM → tính ra Toan chuyển hóa tăng AG + kiềm HH bù trừ
52. Làm tiếp CLS nào để chẩn đoán nguyên nhân: 3 cái kia đều hướng tới acid không bay hơi → chọn NH₃ niệu
53. (lặp lại câu trên)

16. Áp xe gan (4 – 5 câu)

54. AXG do VK, ĐT thuốc nào
- a. Metro
- b. Ceft + metro
- c. Ceft + levo
- d. Cả 3
55. AXG do VK không thể do nn nào sau
- a. CT gan trực tiếp
- b. Lỵ cấp
- c. Viêm đường mật cấp
- d. NT chỗ khác trong ổ bụng (?)
56. BC nào ko cần PT của AXG VK
- a. Vỡ ổ áp xe gây VPM toàn thể
- b. AX dưới hoành
- c. Chảy máu đường mật k cầm được
- d. AX đa ổ nhỏ

17. Viêm đại tràng mạn

57. BN viêm đại tràng xuất huyết → hỏi thời gian nội soi đại tràng lại để tầm soát K là sau bao lâu kể từ lần đầu nội soi? 8 năm