



GÂY Mê HỒI SỨC (Anesthesiology Resuscitation) - PGS.TS. Nguyễn Trung Tín: Trưởng Bộ môn - ThS Hà Ngọc Chi : Leader

Dashboard ► Courses ► Khoa Y ► CHƯƠNG TRÌNH MỚI ► Năm 5 ►

Anesthesiology Resuscitation ► Pre-test ►

Pre-test - Bài 1: Khám tiền mê - Chuẩn bị bệnh nhân trước phẫu thuật

Started on Sunday, 13 November 2022, 6:03 PM

State Finished

Completed on Sunday, 13 November 2022, 6:06 PM

Time taken 2 mins 8 secs

Grade 10.0 out of 10.0 (100%)

Question 1

Complete

Mark 2.0 out of 2.0

Người bệnh nam 50 tuổi, có chỉ định mổ cắt túi mật nội soi, người bệnh bị tăng huyết áp đang điều trị liên tục với bisoprolol 2,5 mg (sáng) và amlodipin 5 mg (sáng). Hiện tại, mạch 70 lần/phút, huyết áp 130/70 mmHg. Khi khám tiền mê cho người bệnh này:

Bạn quan tâm đến? (**Chọn NHIỀU câu đúng**)

Select one or more:

- ☒ A. Các bệnh lý kèm theo
- ☒ B. Các thuốc đang sử dụng
- ☒ C. Tiền sử mổ
- ☒ D. Các yếu tố liên quan thông khí khó

Question 2

Complete

Mark 2.0 out of
2.0

Người bệnh nam 50 tuổi, có chỉ định mổ cắt túi mật nội soi, người bệnh bị tăng huyết áp đang điều trị liên tục với bisoprolol 2,5 mg (sáng) và amlodipin 5 mg (sáng). Hiện tại, mạch 70 lần/phút, huyết áp 130/70 mmHg. Khi khám tiền mê cho người bệnh này:

Bạn tư vấn chế độ thuốc hạ áp sáng ngày mổ như thế nào? **(chọn 01 câu đúng)**

- ☐ A. Ngưng bisoprolol
- ☒ B. Tiếp tục uống như ngày thường
- ☐ C. Theo y lệnh bác sĩ tim mạch
- ☐ D. Ngưng thuốc amlodipin

Question 3

Complete

Mark 2.0 out of
2.0

Người bệnh nam 50 tuổi, có chỉ định mổ cắt túi mật nội soi, người bệnh bị tăng huyết áp đang điều trị liên tục với bisoprolol 2,5 mg (sáng) và amlodipin 5 mg (sáng). Hiện tại, mạch 70 lần/phút, huyết áp 130/70 mmHg. Khi khám tiền mê cho người bệnh này:

Nếu ngưng các thuốc tim mạch vào ngày mổ, người bệnh có thể có nguy cơ gì? **(Chọn 01 câu đúng)**

- ☐ A. Không vấn đề gì
- ☐ B. Hạ huyết áp
- ☐ C. Mạch chậm hơn
- ☒ D. Mạch nhanh hơn

Question 4

Complete

Mark 2.0 out of
2.0

Người bệnh nam 50 tuổi, có chỉ định mổ cắt túi mật nội soi, người bệnh bị tăng huyết áp đang điều trị liên tục với bisoprolol 2,5 mg (sáng) và amlodipin 5 mg (sáng). Hiện tại, mạch 70 lần/phút, huyết áp 130/70 mmHg. Khi khám tiền mê cho người bệnh này:

Phương pháp vô cảm bạn đề nghị trên người bệnh này (chọn 1 câu đúng)

- ☐ A. Mê tĩnh mạch
- ☒ B. Mê toàn diện qua nội khí quản
- ☐ C. Mê toàn diện qua nội phế quản
- ☐ D. Mê tủy sống

Question 5

Complete

Mark 2.0 out of
2.0

Người bệnh nam 50 tuổi, có chỉ định mổ cắt túi mật nội soi, người bệnh bị tăng huyết áp đang điều trị liên tục với bisoprolol 2,5 mg (sáng) và amlodipin 5 mg (sáng). Hiện tại, mạch 70 lần/phút, huyết áp 130/70 mmHg. Khi khám tiền mê cho người bệnh này:

Khi tư vấn các nguy cơ liên quan gây mê cho người bệnh này, bạn cần tư vấn các nguy cơ nào? (Chọn NHIỀU câu đúng)

Select one or more:

- ☒ A. Trào ngược dạ dày - thực quản khi khởi mê
- ☒ B. Rối loạn huyết động trong mổ
- ☐ C. Nôn ói nhiều trong và sau mổ
- ☐ D. Thức tỉnh trong mổ

