

TIẾT NIỆU (Urology) - PGS.TS. Ngô Xuân Thái: Trưởng BM - TS. Đỗ Anh Toàn: Leader

Dashboard ► My courses ► TN ► Pre-test ► PRE-TEST Các triệu chứng đường tiết niệu

Question 1

Not yet

answered

1.00

Marked out of

Bí tiểu được phân loại thành:

- a. Bí tiểu do bế tắc và không do bế tắc đường tiết niệu trên
- b. Bí tiểu cấp và mạn.
- O c. Bí tiểu hoàn toàn và không hoàn toàn.
- d. Bí tiểu nhẹ, trung bình, nặng.

Question 2 Not yet answered Marked out of	Các triệu chứng dưới đây thuộc nhóm triệu chứng kích thích đường tiết niệu dưới, NGOẠI TRÙ:
1.00	○ a. Tiểu ngắt quãng
	o b. Tiểu đêm
	○ c. Tiểu nhiều lần
	○ d. Tiểu gấp
Question 3 Not yet answered	Chỉ số PSA huyết thanh là chất đặc hiệu cho:
Marked out of	○ a. Viêm tuyến tiền liệt
1.00	 b. Ung thư tuyến tiền liệt
	o c. Tuyến tuyền liệt
	O d. Một số loại ung thư ống tiêu hóa
Question 4 Not yet answered	Điều nào sau đây không cần thiết trong chẩn đoán và điều trị ban đầu Bàng quang tăng hoạt (OAB)?
Marked out of 1.00	 a. Siêu âm khảo sát thận, bàng quang, tuyến tiền liệt
1.00	b. Soi bàng quang chẩn đoán
	c. Đo nước tiểu tồn lưu trong bàng quang
	d. Niệu động học

Question 5 Not yet answered	Điều trị chờ đợi thận trọng (Watchful waiting) có thể sử dụng trên bệnh nhân tăng sinh lành tính TTL nào sau đây:
Marked out of 1.00	 a. Triệu chứng nhẹ đến trung bình không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống
	 b. Triệu chứng nặng, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống nhưng nguy cơ phẫu thuật cao
	o. Kích thước TTL < 50ml
	 d. Triệu chứng trung bình-nặng nhưng có chống chỉ định sử dụng các loại thuốc ức chế alpha
Question 6	Nguyên nhân thường gặp gây ra triệu chứng đường tiết niệu dưới bao gồm:
Not yet	
answered	 a. Tất cả đều đúng
Marked out of 1.00	
1.00	b. Nhiễm khuẩn đường tiết niệu
	 c. Sôi đường tiết niệu
	 d. Tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt
Question 7 Not yet answered	Nói về bí tiểu mạn, CHỌN CÂU SAI:
Marked out of	 a. Thường không có cảm giác mắc tiểu.
1.00	 b. Ít khi có cầu bàng quang
	 c. Bệnh nhân có thể không biết mình bí tiểu.
	○ d. Tiểu do tràn đầy

Question 8 Not yet answered	Tác dụng phụ thường gặp của thuốc ức chế thụ thể alpha, NGOẠI TRỪ:
Marked out of	a. Đau thắt ngựcb. Rối loạn xuất tinhc. Đau đầu
	od. Hạ huyết áp tư thế
Question 9 Not yet answered	Triệu chứng đường tiết niệu dưới bao gồm các nhóm triệu chứng:
Marked out of	 a. Bế tắc và tống xuất b. Chứa đựng, tống xuất và sau đi tiểu
1.00	 b. Chứa đựng, tổng xuất và sau đi tiểu c. Chứa đựng và kích thích d. Trước đi tiểu và sau đi tiểu
Question 10 Not yet answered	Về hoạt động đi tiểu, CHỌN CÂU ĐÚNG:
Marked out of	 a. Thần kinh phó giao cảm ức chế sự đi tiểu. b. Thần kinh phó giao cảm vừa kích hoạt, vừa ức chế đi tiểu dựa theo hai đường dẫn truyền thần kinh khác nhau
	 c. Chi phối bởi hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm. d. Thần kinh giao cảm gây co thắt cơ bàng quang, giúp đi tiểu.

