



SẢN KHOA (OBSTETRICS)

Nhà của tôi ► Các khoá học của tôi ► SK ►

CHUYÊN ĐỀ 2: QUẢN LÝ THAI KỲ NỬA ĐẦU THAI KỲ ► PRETEST 4.2 PHAN 3 28/12/2020

Câu hỏi 1

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

1. Trong các thông tin tư vấn sau cho thai phụ về tầm soát nhiễm human Immunodeficiency Virus (HIV) trong thai kỳ, phát biểu nào là chính xác?

- ☒ a. Tầm soát HIV cho thai phụ nhằm phát hiện HIV, để chỉ định ARV sớm giúp giảm lây truyền dọc mẹ-con
- ☐ b. Phải test HIV ít nhất hai lần trong thai kỳ: một lần trong quá trình khám thai, một lần khi vào chuyển dạ
- ☐ c. Tầm soát HIV trong thai kỳ là một nội dung bắt buộc, được thực hiện thường qui, và không có ngoại lệ
- ☐ d. Nếu thai phụ từ chối việc thực hiện tầm soát HIV, thì cơ sở y tế có quyền từ chối tiếp nhận sinh

Câu hỏi 2

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

2.CDC khuyến cáo gì về chỉ định điều trị nhiễm HIV nói chung, và cho phụ nữ mang thai nói riêng?

- ☐ a. Quyết định bắt đầu điều trị được dựa trên tải lượng virus
- ☐ b. Quyết định bắt đầu điều trị được dựa đếm bạch cầu CD4
- ☐ c. Ở thai phụ, có thể tạm ngưng ARV khi đếm CD4 ≥ 400
- ☒ d. Điều trị cho mọi trường hợp đã xác định có nhiễm HIV

Câu hỏi 3

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

3.Thai phụ có kết quả tầm soát HBsAg [+] ở ba tháng đầu thai kì phải được thực hiện thêm ngay test nào?

- ☒ a. Khảo sát kháng nguyên HBeAg
- ☐ b. Khảo sát kháng thể HBsAb
- ☐ c. Định tải lượng của virus
- ☐ d. Men gan, chức năng gan

Câu hỏi 4

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

4.Việc quyết định điều trị bằng thuốc kháng virus viêm gan B cho thai phụ được căn cứ vào yếu tố nào?

- ☐ a. Kết quả HBeAg ở thai phụ là dương tính hay là âm tính
- ☐ b. Kết quả khảo sát chức năng gan qua men gan, bilirubin
- ☒ c. Kết quả tải lượng HBV ở thai phụ qua khảo sát PCR
- ☐ d. Điều trị ngay khi có một trong các bất thường trên

Câu hỏi 5

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

5. Nguy cơ thai mắc giang mai bẩm sinh sẽ thấp nhất trong giai đoạn nào của nhiễm *Treponema pallidum*?

- ☐ a. Giang mai sơ nhiễm, có tổn thương "săng" và hạch
- ☐ b. Giang mai kì II, biểu hiện bằng sẩn và hồng ban
- ☒ c. Giang mai thời kì tiềm ẩn, không dấu lâm sàng
- ☐ d. Giang mai kì III, thể hiện qua "gôm giang mai"

Câu hỏi 6

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

6. Cần lưu ý gì khi thực hiện tư vấn test huyết thanh tầm soát Rubella cho thai phụ?

- ☐ a. Tầm soát Rubella cho thai phụ bằng test huyết thanh là thường qui, không có ngoại lệ
- ☒ b. Tầm soát Rubella cho thai phụ bằng test huyết thanh phải được thực hiện càng sớm càng tốt
- ☐ c. Khi tầm soát Rubella cho thai phụ, phải thực hiện đủ bộ ba Rubella IgM, IgG & IgG avidity
- ☐ d. Trong thai kì, phải lặp lại test huyết thanh Rubella định kỳ, bất chấp kết quả đã có trước đó

Câu hỏi 7

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

7. Trong thai kì, thời điểm mà người mẹ bị nhiễm Rubella có ảnh hưởng ra sao đến tần suất xảy ra của hội chứng nhiễm Rubella bẩm sinh?

- ☒ a. Suốt thai kì, mẹ bị nhiễm càng sớm thì tần suất xảy ra hội chứng nhiễm Rubella bẩm sinh càng cao
- ☐ b. Suốt thai kì, mẹ bị nhiễm càng muộn thì tần suất xảy ra hội chứng nhiễm Rubella bẩm sinh càng cao
- ☐ c. Hội chứng nhiễm Rubella bẩm sinh chỉ có thể xảy ra trong trường hợp mẹ bị nhiễm trong 3 tháng đầu
- ☐ d. Tần suất xảy ra hội chứng nhiễm Rubella bẩm sinh không chịu ảnh hưởng của thời điểm mẹ bị nhiễm

Câu hỏi 8

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

8. Vì sao người ta không chủ trương thực hiện tầm soát đại trà nhiễm CMV ở thai phụ?

- ☐ a. Vì vấn đề nhiễm CMV bẩm sinh không gây hệ quả nghiêm trọng
- ☐ b. Vì hiện không có phương tiện hiệu quả cho điều trị nhiễm CMV
- ☐ c. Vì về mặt dịch tễ, nhiễm CMV là bệnh có tần xuất nhiễm thấp
- ☒ d. Vì đặc điểm vi sinh và tính phức tạp của huyết thanh học CMV

Câu hỏi 9

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

9. Ở Việt Nam, việc sàng lọc đại trà (universal screening) thiếu máu ở thai phụ là nhằm vào bệnh lí mục tiêu nào?

- ☒ a. Thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắc
- ☐ b. Thiếu máu đẳng sắc, đẳng bào
- ☐ c. Thiếu máu thiếu sắt
- ☐ d. α và β Thalassemia

Câu hỏi 10

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

10. Trong chiến lược sàng lọc đại trà (universal screening) thiếu máu ở thai phụ Việt Nam, các test nào sẽ được dùng trong tiếp cận bước hai sau khi test sàng lọc sơ cấp cho kết quả dương tính với sàng lọc đại trà?

- ☐ a. Điện di hemoglobin vợ và điện di hemoglobin chồng
- ☐ b. Ferritin huyết thanh vợ và điện di hemoglobin vợ
- ☐ c. Điện di hemoglobin vợ và huyết đồ chồng
- ☒ d. Huyết đồ chồng và ferritin huyết thanh vợ

Câu hỏi 11

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

11. Khi nào có thể nói rằng kết quả khảo sát Thalassemia là dương tính, để chuyển đến đơn vị tư vấn chuyên biệt cho Thalassemia?

- ☐ a. Thai phụ và chồng cùng có thiếu máu nhược sắc hồng cầu nhỏ, cùng có ferritin bình thường/tăng
- ☒ b. Thai phụ và chồng cùng mang đột biến gene liên quan đến Thalassemia, cùng hay khác genotype
- ☐ c. Thai phụ có thiếu máu nhược sắc hồng cầu nhỏ, ferritin bình thường/tăng, kết quả điện di bất thường
- ☐ d. Thai phụ và chồng cùng có thiếu máu nhược sắc hồng cầu nhỏ, và cùng có kết quả điện di bất thường

Câu hỏi 12

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

12. Tính tin cậy (accuracy) của sàng lọc lệch bội dựa trên combined test bị ảnh hưởng bởi yếu tố nào?

- ☐ a. Chất lượng mọi mặt của siêu âm hình thái
- ☐ b. Số lượng thai là một thai hay là nhiều thai
- ☐ c. Có thai với noãn tự thân hay với noãn hiến
- ☒ d. Accuracy của test lệ thuộc cả ba yếu tố trên

Câu hỏi 13

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

13. Khi đã nghĩ rằng thai nhi có thể có Thalassemia, thì siêu âm sẽ đóng vai trò quan trọng trong theo dõi thai nhi ở trường hợp thiếu máu bào thai cụ thể nào?

- ☐ a. $\alpha\beta$ Thalassemia phối hợp
- ☐ b. β^0 Thalassemia đồng hợp tử
- ☒ c. α^0 Thalassemia đồng hợp tử
- ☐ d. HbE/ β -Thalassemia

Câu hỏi 14

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

14. Thái độ thực hành nào là hợp lý, có tính ưu tiên khi nguy cơ tính toán của combined test thuộc vùng xám?

- ☒ a. Thực hiện thêm xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn (NIPS)
- ☐ b. Thực hiện sinh thiết gai nhau sau khi tư vấn và đạt sự đồng thuận
- ☐ c. Chờ siêu âm soft-markers, dùng nó để hiệu chỉnh nguy cơ từ combined test
- ☐ d. Chờ thực hiện thêm triple test và soft-markers, đối sánh với nguy cơ từ combined test

Câu hỏi 15

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

15. Hãy xác định cách dùng kết quả siêu âm "khảo sát soft-markers" để hiệu chỉnh nguy cơ huyết thanh của lệch bội?

- ☐ a. Nguy cơ hiệu chỉnh = (nguy cơ huyết thanh) x (tích của các likelihood ratio của các marker bất thường)
- ☐ b. Nguy cơ hiệu chỉnh = (nguy cơ huyết thanh) x (tổng của các likelihood ratio của các marker bất thường)
- ☒ c. Nguy cơ hiệu chỉnh = (nguy cơ huyết thanh) x (tích của tất cả các likelihood ratio)
- ☐ d. Nguy cơ hiệu chỉnh = (nguy cơ huyết thanh) x (tổng của tất cả các likelihood ratio)

Câu hỏi 16

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

16. Làm gì khi khám phát hiện một sang thương loét mang đủ các đặc tính điển hình của một tổn thương săng giang mai nguyên phát ở một thai phụ, đồng thời có kết quả non-treponemal test [-]. Có cần thực hiện thêm một treponemal test (TPPA) không?

- ☒ a. Có, nhưng dù kết quả TPPA ra sao, thì quản lý vẫn là như nhau
- ☐ b. Có, vì phải có thêm TPPA [+] mới cho phép xác định có nhiễm
- ☐ c. Không, kết quả VRDL [-] đã có cho phép loại trừ giang mai
- ☐ d. Không, vì đã thấy săng điển hình của giang mai nguyên phát

Câu hỏi 17

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

17. Tính tin cậy (accuracy) của sàng lọc lệch bội dựa trên cell-free DNA lệ thuộc vào yếu tố nào?

- ☐ a. Tần suất của loại lệch bội đó là cao hay thấp
- ☐ b. Số lượng thai là một thai hay là nhiều thai
- ☐ c. Có thai với noãn tự thân hay với noãn hiến
- ☒ d. Accuracy của test lệ thuộc cả ba yếu tố trên

Câu hỏi 18

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

18. Một thai phụ có thiếu máu hồng cầu hình bìa, do đột biến HbE đồng hợp tử. Genotype của chồng bình thường. Hãy dự đoán mức độ thiếu máu của thai nhi?

- ☐ a. Không thiếu máu
- ☒ b. Nhẹ
- ☐ c. Trung bình
- ☐ d. Nặng

Câu hỏi 19

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

19. Khi siêu âm cho song thai, cần "gắn nhãn định danh" cho mỗi thai, nhằm dễ dàng nhận định thay đổi ở mỗi thai trong các lần khảo sát sau đó. Cách "gắn nhãn định danh" nào có độ tin cậy kém nhất (thấp nhất)?

- ☐ a. Dựa vào giới tính của mỗi thai nếu hai thai không cùng giới tính (nhận diện theo trai-gái)
- ☐ b. Dựa vào kích thước thai nếu hai thai có khác nhau về sinh trắc (nhận diện theo to-nhỏ)
- ☐ c. Dựa vào tọa độ trên/dưới, phải/trái trong tử cung của mỗi thai (nhận diện theo vị trí)
- ☒ d. Dựa vào ngôi thai nếu hai thai có kiểu trình thai khác nhau (nhận diện theo ngôi)

Câu hỏi 20

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

20. Nếu hai thai trong song thai có sự khác biệt tương đối nhiều về CRL, thì tuổi thai được tính ra sao?

- ☐ a. Nên tính theo CRL của thai có số đo CRL nhỏ hơn (không dùng CRL của thai lớn)
- ☒ b. Nên tính theo CRL của thai có số đo CRL lớn hơn (không dùng CRL của thai nhỏ)
- ☐ c. Chọn tính theo CRL trung bình khi biết chắc chắn rằng đó là song thai cùng trứng
- ☐ d. Không dùng CRL nữa, mà nên chọn thông số khác (BPD...), ở thời điểm muộn hơn

